

Math. Phys.
637⁵

Math. P. 637 hh

Wiegand

Die
höheren bürgerlichen Rechnungsarten.

Von

Dr. August Wiegand.

August Wiegand,

Halle,

Verlag von Hermann Bornert.

1856.

qu. 8^{1/2}.

höheren bürgerlichen Rechnungsarten.

Dr. August Wiegand.

Dr. Wiegand

Die höheren bürgerlichen Rechnungsarten.

Eine praktische Unterweisung

für

Beamte bei Sparkassen, Sterbekassen, Schuldentilgungskassen, Pensionsinstituten, Wittwenkassen, Stadt- und Staatsbanken, für Buchhalter, Kassirer und Agenten bei Lebensversicherungs-, Leibrenten-, Altersversorgungs-Gesellschaften und anderen Assekuranz- und Geld-Instituten, sowie für Vormünder, Pupillencollegien, Banquiers, Capitalisten, Fabrikunternehmer u. dergl.,

insbesondere auch

für

Lehrer der Mathematik an Real- und Gewerbeschulen.

*Mit zahlreichen vollständig ausgerechneten Beispielen
und vielen Tabellen*

herausgegeben

von

August Wiegand,

Doctor der Philosophie, Oberlehrer und erstem Collegen an der Realschule in den Francke'schen Stiftungen zu Halle, Mitgliede des naturwissenschaftlichen Vereins daselbst.

H a l l e,

Verlag von Hermann Berner.

1850.

94=BK.

Bürgerlichen Rechnungsrarten.

Die höheren

Eine praktische Unterweisung

für

Beamte bei Sparkassen, Sterbekassen, Schuldenrückstellungen, Pen-
sionsanstalten, Wittwenkassen, Stadt- und Landbanken, für Buch-
halter, Kassierer und Agenten bei Lebensversicherungs-, Leihrenten-,
Altenversorgung-, Gesellschaften und anderen Anstalten, und Geld-
instituten, sowie für Vermögender, Papiereinsamler, Handwerker,
Caputisten, Fabrikanten u. dergl.

insbesondere auch

für

Lehrer der Mathematik an Real- und Gewerbeschulen.

Mit zahlreichen vollständig ausgearbeiteten Beispielen
und vielen Tabellen



Heft 10

Verlag von Hermann Pöschel

1850

V o r w o r t.

Mit äusserst wenigen Ausnahmen findet sich die Kenntniss der im Nachfolgenden behandelten, in das bürgerliche Leben so tief eingreifenden, Rechnungsarten zur Zeit nur bei den Mathematikern von Fach. Die Schuld davon tragen eines Theils die darüber handelnden Schriften, die durch ihre Darstellungsweise sich allen denjenigen verschliessen, denen nur dürftige mathematische Kenntnisse zur Seite stehen; anderen Theils aber auch die für den höheren Bürgerstand vorbildenden Real- und Gewerbeschulen, indem diese im Ganzen nur wenig auf jene Rechnungsarten eingehen. So kann es nicht bleiben! Das Geschäftsleben braucht und fordert diese Rechnungen, deshalb muss deren Kenntniss ein Gemeingut des höheren Bürgerstandes, insbesondere der auf dem Titel näher bezeichneten Klasse desselben werden. Es ist freilich war, diese Rechnungsarten haben ihren Boden in mathematischen Lehren, deren Kenntniss bei

Wenigen vorausgesetzt werden darf; allein es giebt auch einen Weg, auf welchem jene Schwierigkeiten umgangen werden, den aber, bis jetzt wenigstens, keine der mir bekannten Schriften gefunden hat. Ob es der vorliegenden gelungen, ihn zu finden, wird der Gebrauch derselben lehren; das Zeugniß wenigstens kann ich mir geben, daß ich eifrig darnach gesucht habe. Der Anblick mathematischer Formeln dürfte Manche schrecken, drum sei diesen hier gleich zum Troste gesagt, daß sie den Schlüssel, mit welchem die Eröffnung so leicht ist, stets dabei finden werden.

Eine Hauptschwierigkeit dürfte für Viele wohl noch der Gebrauch der Logarithmen bilden. Um auch diese zu heben, habe ich in einem Nachtrage eine gemeinverständliche Anweisung zum Gebrauch der, in den meisten Fällen vollkommen ausreichenden, vierstelligen Logarithmen auf Tafel VI. gegeben. Aber auch denen, welche diese, übrigens keineswegs grosse, Schwierigkeit nicht zu überwinden vermöchten, ist die Ausführung der behandelten Rechnungsarten noch möglich gemacht worden durch Darbietung der Tafeln I. bis IV. Die anschaulichste Erläuterung dürfte Jeder in dieser Beziehung in den zahlreichen, vollständig berechneten, Beispielen finden.

Was nun den theoretischen Theil betrifft, so bin ich nicht, wie sonst geschieht, vom Allgemei-

nen zum Speziellen, sondern von diesem zu jenem, mithin vom Leichterem zum Schwierigeren übergegangen. Man wird dies dem Zwecke, den ich verfolgte, vollkommen angemessen finden.

Bei den Versicherungsrechnungen habe ich die Aussteuerversicherung vorzugsweise einer durchgreifenden Berechnung, deren sie bis jetzt noch gänzlich ermangelte, unterworfen, und darf ich namentlich hoffen, dass die Lebensversicherungs-Banken mir wegen der ihnen dargebotenen Tabellen ihren Dank nicht versagen werden. Es wäre mir nicht möglich gewesen, die darin verborgenen, ungemein umfänglichen, Rechnungen zu überwältigen und überhaupt die Schrift mit so zahlreichen Beispielen auszustatten, wenn mir nicht die Primaner und Obersecundaner der hiesigen Realschule hülfreich zur Seite gestanden hätten. Die Lust und Freudigkeit, mit welcher dieselben mir ihre freie Zeit gewidmet haben, verdient öffentlich anerkannt zu werden. Die S. 131 aufgestellte Leibrententabelle ist ebenfalls von zweien meiner Schüler, den Primanern B ä n t s c h und D a n n e n b e r g berechnet worden. Ganz besonderen Dank bin ich endlich noch einem meiner früheren Schüler, Herrn Albert Protze (jetzt bei der Artillerie in Cöln) schuldig, der nach ehrenvoll bestandnem Maturitätsexamen an hiesiger Realschule mir fast zwei volle Monate hindurch mit seinen schönen mathematischen Kenntnissen hülfreich zur Seite gestanden hat.

Möchte vorliegende Schrift dieselbe freundliche Aufnahme, namentlich auch bei meinen Collegen, finden, denen meine früheren Schriften, insbesondere die vor Kurzem in vierter Auflage erschienene Schrift: „Die Vortheile und Garantien der Lebensversicherungs-Banken,“ in so reichem Maasse sich zu erfreuen hatten; möchten namentlich auch angehende Mathematiker hierin die Brücke zum Studium grösserer theoretischer Werke, wie Grunert's „Politische Arithmetik“ u. dgl. finden; möchte diese Schrift endlich überhaupt dazu beitragen, dass die in ihr vorgetragenen Lehren in grösserem Maasse ein Gemeingut aller Gebildeten würden, als es bis jetzt leider! der Fall gewesen ist.

Halle, den 5. September 1850.

Der Verfasser.

Erstes Kapitel.

Zinseszins - Rechnung.

§. 1.

Theorie dieser Rechnungsart.

Ist ein Kapital so angelegt, dass dessen Zinsen nicht erhoben, sondern mit dem Kapital vereinigt und später ebenfalls mit verzinst werden, so sagt man, das Kapital stehe auf Zinseszinsen *). In diesem Falle wächst also das Kapital alljährlich und es ist sein Endwerth (S) ausser vom Anfangswerthe (C) noch abhängig vom Zinsfusse ($p\%$) und der Anzahl Jahre (n), während welcher es ausstand.

Wird ein Kapital C zu $p\%$ angelegt, so tragen 100 (Thaler, Gulden u. s. w.) in jedem Jahre p (Thaler, Gulden u. s. w.) ein, d. h. also bei Zinseszinsen wachsen 100 (Thaler, Gulden u. s. w.) in jedem Jahre an zu $100 + p$ (Thaler, Gulden etc.) Bezeichnet demnach S_1 die Summe, zu welcher das Anlagekapital nach dem ersten Jahre angewachsen ist, so hat man die Proportion

$$C : S_1 = 100 : 100 + p,$$

mithin zur Berechnung von S_1 die Formel

$$S_1 = C \cdot \frac{100 + p}{100} \dots (1).$$

*) Nach dem preuss. Landrechte wird der *Anatocismus* oder die Entnahme von Zinseszinsen von einer und derselben Person als Wucher geahndet. Dessenungeachtet ist es nicht nur erlaubt, sondern auch ganz natürlich und vernünftig, dass Jemand sein Kapital in der Weise benutzen kann, dass er die erhobenen Zinsen immer wieder an eine zweite Person ausleiht oder etwa in einer Sparkasse zinsbar anlegt und sich hierdurch doch den Genuss von Zinseszinsen sichert.

Bezeichnen $S_2, S_3, \dots S_n$ bezüglich die Summen, zu welchen das Kapital C nach 2, 3, $\dots n$ Jahren angewachsen ist, so ist, wie

$$\begin{aligned} C : S_1 &= 100 : 100 + p, \\ \text{entsprechend } S_1 : S_2 &= 100 : 100 + p, \\ S_2 : S_3 &= 100 : 100 + p, \\ &: : : : : \\ S_{n-1} : S_n &= 100 : 100 + p. \end{aligned}$$

Durch Zusammensetzung dieser Proportionen erhalten wir aber

$$C : S_n = 100^n : (100 + p)^n$$

oder

$$S_n = C \cdot \left(\frac{100 + p}{100} \right)^n \dots (2),$$

welches die Formel für die Zinseszins-Rechnung ist.

Der Ausdruck $\frac{100 + p}{100}$, welchen wir der Kürze wegen im Folgenden stets mit dem Buchstaben e bezeichnen wollen, lässt sich immer sehr leicht durch einen Decimalbruch ausdrücken. So ist bei 3, 4, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{3}$ u. s. w. Procent der Werth e bezüglich gleich 1,03; 1,04; 1,045; 1,0475; 1,05333 $\dots$ u. s. w.

Die Formel (2), welche, wenn wir e einführen und der Kürze halber den Zeiger n von dem S weglassen, die einfache Form

$$S = C \cdot e^n \dots (3)$$

annimmt, kann offenbar dazu dienen, irgend eine der vier Grössen C, S, p, n zu berechnen, wenn die drei übrigen gegeben sind. Man erhält nämlich aus ihr

$$C = \frac{S}{e^n} \dots (4),$$

$$e = \sqrt[n]{\frac{S}{C}} \dots (5),$$

$$n = \frac{\log S - \log C}{\log e} \dots (6).$$

Die Formeln unter (3), (4), (5) und (6) enthalten die Lösung aller auf die Zinseszins-Rechnung Bezug habenden Aufgaben.

§. 2.

Bestimmung des Endwerthes.

1. Beispiel.

Die Anwendung der Zinseszinsrechnung findet überall Statt, wo Gelder angelegt werden, die keine unmittelbaren Zinsen tragen. — *Legt z. B. Jemand einen Kohlenschacht an und verwendet darauf eine Summe von 12000 Thalern, so hat er, wenn der Schacht vielleicht erst nach 5 Jahren einen Ertrag gewährt, nach dieser Zeit nicht 12000 Thaler aufgewendet, sondern (bei 4%) die Summe*

$$S = 12000 \cdot 1,04^5.$$

Ausrechnung.

$$\log S = \log 12000 + 5 \log 1,04.$$

$$\log 12000 = 4,0791812$$

$$\log 1,04 = 0,0170333$$

$$5 \log 1,04 = 0,0851665 \quad (5)$$

$$\log S = 4,1643477$$

$$S = 14599,83 \text{ Thlr.}$$

Ausserdem findet die Zinseszins-Rechnung ihre Anwendung bei Geldern, die zu Fabrikanlagen, Eisenbahn- und Strassenbauten u. s. w. verwendet werden; ferner auch beim sogenannten Discontiren. Unter Disconto versteht man nämlich den Abzug, welchen sich der Empfänger gefallen lassen muss, wenn er ein erst später fälliges Kapital schon jetzt hebt. Endlich kommt auch die Zinseszins-Rechnung in Anwendung beim Holzertrage mehrjährig geschonter Forste, beim Wachsen der Bevölkerung eines Ortes u. dergl.

2. Beispiel.

Ein Vater will seinem Sohne gleich bei der Geburt ein Kapital sichern, welches dem letzteren im 24sten Lebensjahre ausgezahlt wird. Zu dem Ende legt er jetzt gleich ein Kapital von 350 Thlr. in eine Sparkasse, welche 3½% giebt. — Welche Summe wird die Sparkasse, wenn die Zinsen jährlich zum Kapital geschlagen worden sind, dem Sohne auszuzahlen haben?

Es ist hier $C = 350$, $e = 1,035$, $n = 24$, folglich nach (3)

$$S = 350 \cdot 1,035^{24}$$

$$\log S = 24 \log 1,035 + \log 350.$$

$$\log 1,035 = \frac{0,0149403}{0,0597612} \quad (4)$$

$$24 \log 1,035 = \frac{0,3585672}{0,3585672} \quad (6)$$

$$\log 350 = 2,5440680$$

$$\log S = 2,9026352$$

$$S = 799,16 \dots \text{Thlr.}$$

Anmerkung. *Tafel I.* enthält den künftigen Werth des Kapitels 1. (1 Thlr., 1 Fl. u. s. w.) nach 1 bis 100 Jahren für verschiedene Procentsätze. Will man mittelst dieser Tafel nun z. B. berechnen, zu welcher Summe 20 Thlr. in 23 Jahren bei $4\frac{1}{2}\%$ anwachsen, so sucht man in der zu 23 Jahren gehörigen Querspalte die Zahl, über welcher $4\frac{1}{2}\%$ steht, es ist dies 2,752166, und multiplicirt diese noch mit 20, so dass man also erhält: 55,04332 Thlr.

§. 3.

Bestimmung des Anfangswerthes.

3. Beispiel.

Wenn ein Vater seinem Kinde im 20sten Jahre eine Aussteuer von 1000 Thlr. dadurch sichern will, dass er gleich bei der Geburt in eine Bank eine bestimmte Summe einlegt, wie hoch wird diese Summe sein müssen, wenn die Bank $3\frac{3}{4}\%$ Zinsen berechnet?

Setzen wir in die Formel

$$C = \frac{S}{e^n},$$

$S = 1000$, $e = 1,0375$, $n = 20$ ein, so erhalten wir

$$\log C = \log 1000 - 20 \log 1,0375.$$

$$\log 1000 = 3,0000000$$

$$\log 1,0375 = 0,0159881$$

$$20 \log 1,0375 = \frac{0,319762}{0,319762} \quad (20)$$

$$\log C = 2,680238$$

$$C = 478,89 \text{ Thaler.}$$

4. Beispiel.

Jemand hat seinem jüngeren Bruder bei dessen Grossjährigkeit im 24. Lebensjahre dessen Erbantheil von 12750 Thalern auszusahlen, letzterer will aber im 19ten Jahre

auswandern und verlangt deshalb sein Erbe. Wie viel hat der ältere Bruder auszusahlen, wenn 4 $\frac{9}{10}$ als landesübliche Zinsen angesehen werden?

Wir haben hier $S = 12750$, $e = 1,04$, $n = 5$, also

$$\log C = \log 12750 - 5 \log 1,04.$$

$$\log 12750 = 4,1055102$$

$$\log 1,04 = 0,0170333$$

$$5 \log 1,04 = 0,0851665 \quad (5)$$

$$\log C = 4,0203437$$

$$C = 10479,5 \text{ Thaler.}$$

Anmerkung. *Taf. II.* enthält den gegenwärtigen Werth des nach 1 bis 100 Jahren zahlbaren Kapitals von 1 Thaler. Soll z. B. berechnet werden, wie viel 20 Thlr., die nach 15 Jahren zahlbar sind, heute werth sind, wenn 4 $\frac{9}{10}$ Zinsen berechnet werden, so sucht man in der Tafel für 1 Thlr. ähnlich wie vorher den Werth 0,5552645 und multiplicirt denselben mit 20, wodurch man 11,105290 Thlr. erhält.

§. 4.

Bestimmung der Procente.

5. Beispiel.

Wenn man bei der Geburt eines Kindes an die Lebensversicherungsbank Janus in Hamburg die Summe von 33 Thlr. 8 Sgr. 3 Pf. ein für allemal entrichtet, so bekommt das Kind nach vollendetem 18. Lebensjahre die Summe von 100 Thlr. ausgezahlt. Wie hoch hat sich jene Einlage, falls das Kind das 18. Jahr wirklich erreicht, verinteressirt?

Es ist hier $S = 100$ Thaler, $C = 33$ Thlr. 8 Sgr.

3 Pf. = $\frac{1331}{40}$ Thaler, $n = 18$, welche Werthe in die

Formel

$$e = \sqrt[n]{\frac{S}{C}}$$

einzusetzen sind. Wir erhalten also

$$e = \sqrt[18]{\frac{100}{\frac{1331}{40}}} = \sqrt[18]{\frac{4000}{1331}},$$

$$\log e = \frac{1}{18} (\log 4000 - 1331)$$

$$\log 4000 = 3,6020600$$

$$\log 1331 = 3,1241781$$

$$18) \frac{0,4778819}{}$$

$$\log e = 0,0265490$$

$$e = 1,06304.$$

$$\text{Nun ist } e = \frac{p + 100}{100}, \text{ also } p = 100 \cdot e - 100 = 6,304 \text{ } \frac{\text{g}}{\text{}}.$$

6. Beispiel.

Bei der Lübecker Lebensversicherungs-Gesellschaft sichert man einem Kinde nach erreichtem 18ten Lebensjahre eine Aussteuer von 100 Thlr., wenn man bei der Geburt des Kindes die Summe von 37 Thlr. 17 Sgr. einzahlt. Wie hoch verzinst sich dort das Anlagekapital?

$$\text{Hier ist } C = 37 \text{ Thlr. } 17 \text{ Sgr.} = \frac{1027}{30} \text{ Thaler, das}$$

Uebrige ist wie vorher, wir haben also

$$e = \sqrt[18]{\frac{100}{\frac{1027}{30}}} = \sqrt[18]{\frac{3000}{1027}}.$$

$$\log 3000 = 3,4771213$$

$$\log 1027 = 3,0115704$$

$$18) \frac{0,4655509}{}$$

$$\log e = 0,0258639$$

$$e = 1,0616, \text{ also } p = 6,136 \text{ } \frac{\text{g}}{\text{}}.$$

7. Beispiel.

In einer Stadt stieg die Bevölkerung in einem Zeitraume von 4 Jahren von 12325 auf 18045 Seelen. Um den wievielsten Theil nahm die Bevölkerung jährlich zu?

Es ist hier

$$e = \sqrt[4]{\frac{18045}{12325}}.$$

$$\log 18045 = 4,2563569$$

$$\log 12325 = 4,0907869$$

$$4) \frac{0,1655700}{}$$

$$\log e = 0,0413925$$

$$e = 1,10, \text{ also } p = 10 \text{ } \frac{\text{g}}{\text{}}.$$

Die Bevölkerung nahm also um den 10ten Theil jährlich zu. —

Anmerk. Fallen die gesuchten Procente in das Bereich der in Taf. I. zu Grunde gelegten, so kann auch diese Tafel zur angenäherten Berechnung derselben benutzt werden. — Beispiel: *Wenn 100 Thaler nach 10 Jahren zu 150 R_h. angewachsen sind, wie hoch haben sich dieselben verzinst?* Man dividire mit 100 in 150, giebt 1,50 und suche diese Zahl in der zu 10 Jahren gehörigen Querspalte. Man findet daselbst 1,48 bei $4\frac{0}{8}$ und 1,55 bei $4\frac{1}{2}\frac{0}{8}$. Die 100 haben sich also c. zu $4\frac{1}{4}\frac{0}{8}$ verzinst.

§. 5.

Berechnung der Jahre.

8. Beispiel.

Ein Sterbender setzt zum Neubau der Kirche seines Ortes ein Legat von 18000 Thalern aus. Nach der Veranschlagung des Baues kostet derselbe 24738 Thaler, man will daher, da das Kapital bei einer Bank Zins auf Zins zu $4\frac{1}{2}\frac{0}{8}$ untergebracht werden kann, den Bau so lange verschieben, bis jenes auf die erforderliche Höhe gestiegen ist. Nach wie viel Jahren wird dies der Fall sein?

Wir rechnen hier nach der Formel

$$n = \frac{\log S - \log C}{\log e},$$

wo $S = 24783$, $C = 18000$ und $e = 1,0425$ ist.

$$\log 24783 = 4,3942415$$

$$\log 18000 = 4,2552725$$

$$\hline 0,1389690$$

$$\log 1,0425 \quad 0,0180761,$$

$$\text{also } n = \frac{0,1389690}{0,0180761} = \frac{1389690}{180761} = 7,68 \dots *).$$

Der Bau wird also nach ungefähr 8 Jahren beginnen können.

9. Beispiel.

Wenn man beim Janus in Hamburg für ein Kind, welches im 4ten Lebensjahre steht, die Summe von 42 Thaler

*) Da die Zinsen angenommenermaassen nur alljährlich zum Kapitale geschlagen werden, so können die Bruchtheile der Jahre nicht als gültig betrachtet werden. Der Controle beim Rechnen wegen, werden wir sie aber stets mit angeben.

14 Sgr. bezahlt, so erhält das Kind nach erreichtem 24sten Lebensjahre die Summe von 100 Thlr. ausgezahlt. Nach wie viel Jahren würde jene Einlage in einer Sparkasse, die $2\frac{3}{4}\%$ giebt, zu 100 Thlr. anwachsen.

Wir haben hier $S = 100$, $C = 42$ Thlr. 15 Sgr. = $\frac{83}{2}$ Thlr., $e = 1,0275$, also

$$n = \frac{\log 100 - \log \frac{83}{2}}{\log 1,0275}$$

$$= \frac{\log 100 - \log 83 + \log 2}{\log 1,0275}.$$

$$\log 100 = 2,0000000$$

$$\log 2 = 0,3010300$$

$$\hline 2,3010300$$

$$\log 83 = 1,9190781$$

$$\hline 0,3819519$$


$$\log 1,0275 = 0,0117818,$$

$$\text{also } n = \frac{0,3819519}{0,0117818} = \frac{3819519}{117818}$$

$$= 32,4 \dots$$

Das Kind würde von der Sparkasse erst nach 34 Jahren, also in seinem 38sten Lebensjahre die Summe von 100 Thaler ausgezahlt erhalten.

Anmerk. Stehen die angenommenen Procente in Taf. I., so kann man auch die gesuchten Jahre mittelst dieser Tafel finden, indem man mit C in S dividirt und die Zahl in der zu den gegebenen Procenten gehörigen Vertikalreihe sucht. Die davorstehenden Jahre sind die gesuchten. Wählen wir das letzte Beispiel, so ist $\frac{S}{C} = \frac{200}{83} = 2,409$. Suchen wir diese Zahl unter $2\frac{3}{4}\%$, so fällt sie zwischen 2,38.. und 2,44..., wozu die Jahre 32 und 33 gehören.



Zweites Kapitel.

Sparkassen-Rechnung und verwandte Rechnungsarten.

§. 6.

Theorie dieser Rechnungsart.

Wenn Jemand n Jahre hinter einander C Thlr. zinsbar anlegt und die Zinsen zu $p\%$ zum Kapital schlägt, was wird er nach dieser Zeit erspart haben, wenn die alljährlichen Kapitalzahlungen am Ende jedes Jahres geschehen sind?

Wird, wie angegeben, am Ende des n ten Jahres die Berechnung angestellt, so hat die erste Kapitalzahlung ($n-1$) Jahre ausgestanden, weil sie erst am Ende des ersten, d. h. am Anfange des zweiten Jahres erfolgte; sie ist demnach nach §. 1. angewachsen zu

$$C \cdot e^{n-1},$$

wenn e wieder die frühere Bedeutung hat. Man sieht ohne Weiteres ein, dass die nachfolgenden Einzahlungen bezüglich zu

$$C \cdot e^{n-2}, \quad C \cdot e^{n-3}, \quad C \cdot e^{n-4} \dots$$

angewachsen sind. Die vorletzte Einzahlung steht nur ein Jahr aus und vermehrt sich deshalb zu Ce , die letzte hingegen, welche am Ende des letzten Jahres erfolgte, hat noch gar keine Zinsen getragen und ist unverändert C Thlr. geblieben.

Hiernach sind die sämtlichen Einzahlungen angewachsen zu der Summe

$$S = Ce^{n-1} + Ce^{n-2} + Ce^{n-3} + \dots + Ce^3 + Ce^2 + Ce + C \dots (7)$$

Um einen einfachen Ausdruck für S zu finden, multipliciren wir beide Seiten mit e und erhalten hierdurch

$$eS = Ce^n + Ce^{n-1} + Ce^{n-2} + \dots + Ce^4 + Ce^3 + Ce^2 + Ce \dots (8).$$

Subtrahiren wir jetzt (7) von (8), so heben sich von (7) sämtliche Glieder ausser dem letzten gegen sämtliche in (8) auf das erste folgende, so dass wir haben

$$eS - S = Ce^n - C \dots (9)$$

$$\text{oder } (e-1) S = C (e^n - 1)$$

oder endlich

$$S = C \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1} \dots (10)$$

Sind von den Werthen S , C , e , n drei gegeben, so lässt sich mit Hülfe der Formel (10) der vierte berechnen. Ist C , e , n gegeben, so giebt die Formel in ihrer jetzigen Form unmittelbar den Werth für S an; ist hingegen S , e , n gegeben, so ergibt sich leicht

$$C = S \cdot \frac{e - 1}{e^n - 1} \dots (11).$$

Wäre S , C und e gegeben, und sollte n bestimmt werden, so hat man aus (10)

$$\frac{S (e - 1)}{C} + 1 = e^n$$

$$\log \left\{ \frac{S (e - 1)}{C} + 1 \right\} = n \log e,$$

$$n = \frac{\log \left\{ \frac{S (e - 1)}{C} + 1 \right\}}{\log e} \dots (12).$$

Wäre endlich S , C und n gegeben, und sollten die Procente durch e gefunden werden, so hat man aus (9)

$$Ce^n - Se + S - C = 0$$

$$\text{oder } e^n - \frac{S}{C} \cdot e + \frac{S - C}{C} = 0 \dots (13).$$

Der Werth von e wäre demnach durch eine Gleichung vom n ten Grade zu bestimmen. Wir werden jedoch bei den späteren Beispielen für diesen Fall die Lösung nicht nach den Regeln der höheren Algebra ausführen, sondern dadurch, dass wir den gesuchten Werth zwischen immer engere und engere Grenzen einschliessen.

§. 7.

Bestimmung der Gesamttersparniss.

10. Beispiel.

Jemand legt zu Ende jedes Jahres 20 Jahre hinter einander 5 Thlr. in eine Sparkasse, welche 3 % Zinsen giebt, wie gross ist seine Ersparniss nach dieser Zeit?

Wir haben nach (10)

$$S = \frac{5 \cdot 1,03^{20} - 1}{0,03} = \frac{500 (1,03^{20} - 1)}{3}.$$

Da der zu berechnende Ausdruck nicht logarithmisch ist, so hat man erst $1,03^{20}$ für sich durch Logarithmen zu berechnen, davon 1 zu subtrahiren und den nunmehrigen Ausdruck für S mit Hülfe der Logarithmen zu berechnen.

$$\log 1,03 = 0,0128372 \quad (20)$$

$$\log 1,03^{20} = 0,256744$$

$$1,03^{20} = 1,8061, *)$$

$$\text{also } S = \frac{500 \cdot 0,8061}{3} = 500 \cdot 0,2687$$

$$\log 500 = 2,6989700$$

$$\log 0,2687 = 0,4292677 - 1$$

$$\log S = 2,1282377$$

$$S = 134,35.$$

11. Beispiel.

Jemand, der sich bei einem Eisenbahnunternehmen theiligt hat, hat auf seine 7 Aktien à 100 Thlr. am Ende jedes Jahres in 4 Raten jedesmal 175 Thlr. einzahlen müssen. Nach vollendetem Bau, welcher 6 Jahre gedauert hat, geht die Bahn gegen eine dem Kostenbetrage gleichkommende Entschädigungssumme an den Staat über. Was hat der Mann eingebüsst, wenn 4 % gerechnet werden.

Am Ende des vierten Jahres beläuft sich seine Leistung

$$\text{auf } S = 175 \cdot \frac{1,04^4 - 1}{0,04} = 4375 \cdot (1,04^4 - 1).$$

Dazu kommen noch die Zinsen für anderweite zwei Jahre, folglich seine Gesamtleistung

*) Kann auch mittelst der Taf. I. gefunden werden.

$$S \cdot 1,04^2 = 4375 \cdot (1,04^4 - 1) \cdot 1,04^2.$$

Als Entschädigung bekommt er nur seine baare Einzahlung im Betrage von 700 Thlr. wieder, er verliert also, wenn wir seinen Verlust mit V bezeichnen:

$$V = 4375 \cdot (1,04^4 - 1) \cdot 1,04^2 - 700.$$

$$\log 1,04 = 0,0170333$$

$$4\log 1,04 = 0,0681332$$

$$1,04^4 = 1,16985,$$

$$\text{also } V = 4375 \cdot 0,16985 \cdot 1,04^2 - 700.$$

$$\log 4375 = 3,6409781$$

$$\log 0,16985 = 0,2300656 - 1$$

$$2 \log 1,04 = 0,0340666$$

$$2,9051103.$$

Hierzu ist der

$$\text{Numerus} = 803,73$$

$$\text{davon } 700$$

$$\text{bleibt } V = 103,73 \text{ . . Thlr.}$$

§. 8.

Bestimmung der jährlichen Einzahlung.

12. B e i s p i e l.

Eine Stadt nimmt in einer Bank ein Kapital von 42000 Thaler auf, unter der Bedingung, dasselbe durch eine am Ende jedes Jahres aus den Ueberschüssen der Stadtkasse zu zahlende Rate in 20 Jahren zu tilgen. Wie hoch wird sich die Rate belaufen müssen, wenn die Bank verausgabte Gelder mit 4 $\frac{1}{2}$ $\%$, vereinnahmte dagegen mit 3 $\frac{3}{4}$ $\%$ in Rechnung bringt?

Es ist hierbei zunächst zu erwägen, dass die Summe, zu welcher das geliehene Kapital in 20 Jahren anwächst, gleich sein muss der Summe, zu welcher die zu zahlenden Raten in dieser Zeit anwachsen.

Da die 42000 Thaler, als von der Bank verausgabte Gelder mit 4 $\frac{1}{2}$ $\%$ berechnet werden, so wachsen dieselben an zu

$$42000 \cdot 1,04^{20} \text{ (14)}$$

Bezeichnet ferner C den jährlichen Tilgungsbetrag, so steigt dieser bei 3 $\frac{3}{4}$ $\%$ in 20 Jahren zu der Summe von

$$S \cdot \frac{1,0375^{20} - 1}{0,0375} \dots (15).$$

Da nun (14) und (15) gleich sein müssen, so haben wir

$$42000 \cdot 1,04^{20} = C \cdot \frac{1,0375^{20} - 1}{0,0375} \dots$$

$$\log 1,0375 = 0,0159881$$

$$\log 1,0375^{20} = 0,319762 \quad (20)$$

$$1,0375^{20} = 2,08815,$$

mithin ist

$$42000 \cdot 1,04^{20} = C \cdot \frac{1,08815}{0,03750} = C \cdot \frac{108815}{3750}$$

folglich $C = \frac{42000 \cdot 1,04^{20} \cdot 3750}{108815}$

$$\log 1,04 = 0,0170333$$

$$\log 1,04^{20} = 0,3406660 \quad (20)$$

$$\log 42000 = 4,6232493$$

$$\log 3750 = 3,5740313$$

$$\hline 8,5379466, \text{ davon}$$

$$\log 108815 = 5,0366888,$$

$$\log C = 3,5012578,$$

wozu der Numerus ist:

$$C = 3171,45 \text{ Thlr.}$$

13. B e i s p i e l.

Jemand entschliesst sich in seinem 26. Lebensjahre durch eine am Ende jedes Jahres in eine Sparkasse, die $3\frac{1}{2}\%$ Zinsen giebt, zu machende Einlage so viel zu ersparen, dass er zu Anfange des 40. Lebensjahres sich bei der Janusgesellschaft in Hamburg mit 3695 Thlr. eine vom 50sten Lebensjahre an beginnende Pension von 400 Thlr. versichern kann. Welche jährliche Einlage hat derselbe in die Sparkasse zu machen?

Da am Ende des 39sten Lebensjahres das Geld erspart sein muss, so hat er im Ganzen 14 Einlagen zu machen, es ist deshalb in der Formel

$$S = C \frac{e^n - 1}{e - 1} \quad \text{oder} \quad \frac{S(e - 1)}{e^n - 1} = C$$

$S = 3695$, $e = 1,035$, $n = 14$ und C gesucht. Wir haben also:

$$C = \frac{3695 \cdot 0,035}{1,035^{14} - 1}.$$

$$\log 1,035 = 0,0149403 \quad (14)$$

$$\log 1,035^{14} = 0,2091642$$

$$1,035^{14} = 1,61869,$$

$$\text{mithin } C = \frac{3695 \cdot 0,035}{0,61869} = \frac{3695 \cdot 35}{618,69}.$$

$$\log 3695 = 3,5676144$$

$$\log 35 = 1,5440680$$

$$\hline 5,1116824$$

$$\log 618,69 = 2,7914731$$

$$\log C = 2,3022093,$$

$$C = 209,03 \dots \text{Thlr.}$$

§. 9.

Bestimmung der Jahre.

14. Beispiel.

Ein Vater will seinem Kinde vom zweiten Lebensjahre ab bei der Lübecker Bank eine im 18. Lebensjahre zahlbare Aussteuer von 400 Thlr. gegen eine jährliche Prämie von 18 Thlr. sichern. Es wird ihm gerathen, die 18 Thlr. lieber in eine Sparkasse, welche $3\frac{1}{3} \%$ giebt zu legen, deshalb möchte er wissen, in welchem Lebensjahre dem Kinde von der Sparkasse 400 Thlr. ausgezahlt werden würden, wenn er in letztere am Ende jedes Jahres 18 Thlr. einzahlte?

Wir haben hier $S = 400$, $C = 18$, $e = 1,0333\dots$ und n ist gesucht, also ist

$$400 = 18 \frac{(1,033\dots^n - 1)}{0,0333\dots}$$

$$\text{oder } \frac{400 \cdot 0,0333\dots}{18} + 1 = 1,0333\dots^n.$$

$$\log 400 = 2,6020600$$

$$\log 0,0333\dots = 0,5228783 - 2$$

$$\hline 3,1249383 - 2$$

$$\log 18 = 1,2552725$$

$$\hline 0,8696658 - 1$$

Der Numerus hierzu ist

$$0,74074,$$

wir haben demnach

$$1,0333 \dots^n = 1,74074$$

$$n = \frac{\log 1,74074}{\log 1,0333}$$

$$= \frac{0,2407339}{0,0142390}$$

$$= 16,9 \dots$$

Die Sparkasse würde also dem Kinde nach ungefähr 17 Jahren, d. h. also im 19ten Lebensjahre die Summe von 400 Thaler auszahlen.

15. Beispiel.

Beim Janus in Hamburg werden Jemandem, für welchen von dessen Geburt ab alljährlich 6 Thlr. entrichtet werden, im 50 Lebensjahre 1000 Thlr. ausgezahlt. Nach wie viel Jahren würde ein am Ende jedes Jahres in eine Sparkasse, welche 3 % Zinsen berechnet, gelegter Beitrag von 6 Thlr. zu 1000 Thlr. anwachsen?

Wir haben hier $S = 1000$, $C = 6$, $e = 1,03$ und n ist gesucht, also

$$1000 = \frac{6 (1,03^n - 1)}{0,03}$$

$$5 = 1,03^n - 1$$

$$6 = 1,03^n$$

$$n = \frac{\log 6}{\log 1,03}$$

$$= \frac{0,7781513}{0,0128372} = 60,6.$$

Die Sparkasse würde also ungefähr im 61. Lebensjahre die besagte Summe zahlen können.

§. 10.

Berechnung der Zinsen.

Sind in der Formel

$$S = \frac{C (e^n - 1)}{e - 1}$$

S , C und n gegeben und ist e gesucht, so kann letzteres

mit Hülfe einer Gleichung vom $(n-1)$ ten Grade gefunden werden. Nach den Regeln der algebr. Division ist nämlich

$$\frac{e^n - 1}{e - 1} = e^{n-1} + e^{n-2} + \dots + e^3 + e^2 + e + 1,$$

$$\text{also } e^{n-1} + e^{n-2} + \dots + e^2 + e + 1 = \frac{S}{C}.$$

Die Lösung einer solchen Gleichung ist zwar unter allen Umständen möglich, wird aber um so schwieriger, je höher der Grad der Gleichung, d. h. also je grösser n ist.

16. Beispiel.

Bei einem Hausverkaufe wird dem Käufer frei gestellt, jetzt gleich 3000 Thlr. zu erlegen, und das zweite und dritte Jahr zu derselben Zeit eine gleiche Summe, oder zur Zeit des letzten Termins in einer Summe 9500 Thlr. zu entrichten. Da der Käufer seine Gelder in seinem Geschäfte mit 8 % Nutzen verwenden kann, so möchte er wissen, auf welche der Bedingungen er, um seinen Vortheil zu wahren, eingehen müsse?

Es ist hier zu ermitteln, was die Partial-Einzahlungen für Zinsen tragen. Es ist demnach in der Formel

$$S = \frac{C (e^n - 1)}{e - 1}$$

$S = 9500$, $C = 3000$, $n = 3$ und e gesucht, also

$$9500 = 3000 \cdot \frac{e^3 - 1}{e - 1},$$

$$\frac{19}{6} = e^2 + e + 1,$$

$$\frac{13}{6} = e^2 + e,$$

$$e = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{13}{6}} \quad *)$$

$$= -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{87}{36}}$$

*) S. mein Lehrbuch der Arithmetik. 2. Aufl. §. 194. III.

$$\sqrt[87]{\frac{87}{36}} = \sqrt{\frac{87}{6}} = \frac{9,3273791}{6}$$

$$= 1,5545632$$

$$e = 1,5545632 - \frac{1}{2}$$

$$= 1,5545632 - 0,5$$

$$= 1,0545632.$$

Bezeichnen demnach p die Procente, so ist

$$p = 5,45632.$$

Die Partial-Einzahlungen tragen demnach $c \cdot 5\frac{1}{2}\%$, deshalb wird der Käufer die Zahlung in einer Summe vorzuziehen haben.

17. B e i s p i e l.

Jemand hat 4 Eisenbahnaktien à 100 Thlr. in 4 Jahren hinter einander einzeln bezahlt, und verkauft dieselben nach der letzten Einzahlung für 464 Thlr. Wie viel Procent hat sein Geld getragen?

In der Formel

$$S = C \cdot \frac{e^4 - 1}{e - 1}$$

ist $S = 464$, $C = 100$, $n = 4$ und e gesucht, also haben wir

$$464 = 100 \frac{e^4 - 1}{e - 1},$$

$$\text{oder } 4,64 = e^3 + e^2 + e + 1$$

$$\text{oder } e^3 + e^2 + e - 3,64 = 0.$$

Bringen wir diese Gleichung auf die reducirte Form, indem wir

$$e = y - \frac{1}{3}$$

einsetzen, so haben wir

$$e^3 = y^3 - y^2 + \frac{1}{3}y - \frac{1}{27}$$

$$e^2 = y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{9}$$

$$e = y - \frac{1}{3}$$

$$- 3,64 = - 3,64$$

$$0 = y^3 + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 1\right)y - \frac{1}{27} + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} - 3,64,$$

$$\text{oder } y^3 + \frac{2}{3}y - \frac{10528}{2700} = 0 \dots (16).$$

Wir haben also eine Gleichung von der Form

$$y^3 + py - q = 0$$

und mithin nach der Cardanischen Formel *)

$$y = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \quad (17)$$

Wählen wir die Lösung mittelst goniometrischer Functionen, so haben wir zunächst einen Hülfswinkel φ zu berechnen mittelst der Formel

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2}{q} \left(\sqrt{\frac{p}{3}} \right)^3 \dots (18),$$

hierauf einen zweiten ψ mittelst der Formel

$$\operatorname{tg} \psi = \sqrt[3]{\operatorname{tg} \frac{1}{2} \varphi} \dots (19),$$

und endlich den Werth für y nach der Formel

$$y = 2 \cot 2 \psi \sqrt{\frac{p}{3}} \dots (20).$$

In unserem Falle ist nun

$$p = \frac{2}{3} \text{ und } q = \frac{10528}{2700},$$

$$\text{also } \frac{2}{q} = \frac{2700}{5264} \dots (21),$$

$$\frac{p}{3} = \frac{2}{9},$$

$$\sqrt{\frac{p}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3},$$

$$\left(\sqrt{\frac{p}{3}} \right)^3 = \frac{(\sqrt{2})^3}{27} = \frac{2\sqrt{2}}{27} \dots (22).$$

Setzen wir die Werthe (21) und (22) in (18) ein, so erhalten wir

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2700 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}}{5264 \cdot 27} = \frac{5400 \cdot \sqrt{2}}{5264 \cdot 27}.$$

*) Vergl. mein *Lehrb. d. algebr. Analysis*. §. 102. II.

$$\begin{aligned} \log 5400 &= 3,7323938 \\ \log \sqrt{2} &= \frac{1}{2} \log 2 = 0,1505150 \\ \hline &3,8829088 \dots (23) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log 5264 &= 3,7213159 \\ \log 27 &= 1,4313638 \\ \hline &5,1526797 \dots (24) \end{aligned}$$

Zählen wir in (23) behufs der Anwendung der trigonometrischen Tafeln 10 zu und subtrahiren dann (24), so haben wir

$$\begin{aligned} &13,8829088 \\ &5,1526797 \\ \hline \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log \operatorname{tg} \varphi &= 8,7302291 - 10 \\ \varphi &= 3^\circ 4' 32'', 3. \\ \frac{1}{2} \varphi &= 1^\circ 32' 16'', 1 \dots (25) \end{aligned}$$

Setzen wir den Werth aus (25) in (19) ein, so haben wir

$$\operatorname{tg} \psi = \sqrt[3]{\operatorname{tg} 1^\circ 32' 16'', 1}.$$

$$\log \operatorname{tg} 1^\circ 32' 16'', 1 = 8,4288829 - 10.$$

Zählen wir, da noch durch 3 dividirt werden muss, 20 zu, so erhalten wir

$$\begin{aligned} &3) \frac{28,4288829}{9,4762943} - 30 \\ \log \operatorname{tg} \psi &= 9,4762943 - 10 \\ \psi &= 16^\circ 40' 9'', 2 \\ 2\psi &= 33^\circ 20' 18'', 4 \dots (26). \end{aligned}$$

Setzen wir endlich (26) in (20) ein und berücksichtigen, dass

$$\sqrt{\frac{p}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

ist, so erhalten wir

$$y = \frac{2\sqrt{2} \cdot \cot 33^\circ 20' 18'', 4}{3} \dots (27).$$

$$\begin{aligned} \log 2 &= 0,3010300 \\ \log \sqrt{2} &= 0,1505150 \\ \log \cot 33^\circ 20' 18'', 4 &= 10,1818809 - 10 \\ \hline &0,6334259 \\ \log 3 &= 0,4771213 \\ \hline \log y &= 0,1563046 \\ y &= 1,433 \dots \end{aligned}$$

$$\text{Nun ist } e = y - \frac{1}{3} = 1,433 - 0,333 \\ = 1,10,$$

und wenn p wieder die Procente bezeichnen
 $p = 10.$

Die eingezahlten Aktien haben demnach 10% Zinsen getragen.

Anmerkung. Die beiden anderen Wurzeln der cubischen Gleichung sind imaginär. Um sie auch noch zu bestimmen, wählen wir den einfachsten Weg, indem wir die Gleichung

$$e^3 + e^2 + e - 3,64 = 1$$

durch $e - 1,1$ dividiren. Die Division ergibt

$$e^2 + 2,1 e + 3,31.$$

Setzen wir diesen Ausdruck $= 0$ und lösen die quadratische Gleichung

$$e^2 + 2,1 e + 3,31 = 0$$

auf, so erhalten wir die beiden Wurzeln

$$e = -1,05 \pm i \sqrt{2,21},$$

wo $i = \sqrt{-1}$ gesetzt ist.

Führt die Aufgabe auf eine Gleichung, welche den dritten Grad übersteigt, so wird man statt des beschwerlichen Weges der direkten Lösung, lieber ein Verfahren wählen, nach welchem man das gesuchte e zwischen immer engere und engere Grenzen schliesst. Wir werden später Gelegenheit nehmen, ein solches Verfahren zu zeigen.

Drittes Kapitel.

Rechnung bei Lebens-, Aussteuer- und Capitals-Versicherungen.

§. 11.

Theorie dieser Rechnungsart.

Bei den obengenannten Versicherungen werden die Beiträge pränumerando zu Anfange jedes Jahres gezahlt, während der Rechnungsabschluss am Jahresende erfolgt. Nehmen wir nun an, es würden n Jahre hinter einander zu Anfange eines jeden C Thlr. in eine Bank gezahlt, so fragt es sich, wenn $p\%$ gerechnet werden und S die gesammte Leistung des Beitragenden bezeichnet, was für eine Relation zwischen den Grössen S , C , n und e , wo wieder

$$e = \frac{p + 100}{100}$$

gesetzt ist, stattfindet. Es ist nach dem Früheren klar, dass die einzelnen Beiträge anwachsen werden zu

$$Ce^n, Ce^{n-1}, Ce^{n-2}, \dots Ce^3, Ce^2, Ce;$$

die Gesammtleistung ist demnach

$$\begin{aligned} S &= Ce^n + Ce^{n-1} + Ce^{n-2} + \dots + Ce^3 + Ce^2 + Ce \\ &= e (Ce^{n-1} + Ce^{n-2} + Ce^{n-3} + \dots + Ce^2 + Ce + C). \end{aligned}$$

Mit Rücksicht auf (7) und (10) ist demnach

$$S = \frac{C \cdot e (e^n - 1)}{e - 1} \dots (28).$$

Dies ist die Formel, nach der wir hier zu rechnen haben werden.

§. 12.

Berechnung der Gesamtleistung.

18. Beispiel.

In der Lübecker- und Berliner Lebensversicherungsbank hat Jemand, der sich in seinem 32. Lebensjahre versichert pro 100 Thlr. Versicherungssumme 2 Thlr. 23 Sgr. 8 Pf. zu bezahlen. Gesetzt nun, es hätte sich Jemand bei einer dieser Banken mit 9000 Thaler versichert und stürbe nach zurückgelegtem 47. Lebensjahre, was hat er dann in Summa eingesteuert, wenn 4 % Zinsen gerechnet werden?)*

Wir haben hier $C = 2 \text{ Thlr. } 23 \text{ Sgr. } 8 \text{ Pf.} \times 90 = 251 \text{ Thlr.}$, ferner, da im 32. Jahre die erste und im 47. die letzte Prämie gezahlt worden ist, $n = 16$, endlich $e = 1,04$; wir haben also zu berechnen:

$$S = \frac{251 \cdot 1,04 (1,04^{16} - 1)}{0,04}$$

$$= 251 \cdot 26 \cdot (1,04^{16} - 1).$$

$$\log 1,04 = 0,0170333$$

$$\log 1,04^{16} = 0,2725328 \quad (16)$$

$$1,04^{16} = 1,87298,$$

$$\text{also } S = 251 \cdot 26 \cdot 0,87298$$

$$\log 251 = 2,3996737$$

$$\log 26 = 1,4149733$$

$$\log 0,87298 = 0,9410043 - 1$$

$$\log S = 3,7556513$$

$$S = 5697 \text{ Thlr.}$$

Anmerk. Tafel III. enthält die künftigen Werthe der Einlage 1 nach 1 bis 100 Jahren. Um voriges Beispiel mit Hülfe dieser Tafel zu berechnen, hat man in der mit 4 % überschriebenen Spalte den zu 16 Jahren gehörigen Werth zu suchen; dieser ist 22,697512. Nun ist in unserem Falle die Einlage nicht 1 Thlr., sondern 251 Thlr., folglich ist der gefundene Werth mit 251 zu multipliciren, was ebenfalls 5697 Thlr. giebt.

*) Die Versicherten geniessen bei allen Versicherungs-Banken Dividenden und es kommen diese also natürlich von der oben gesuchten Summe noch in Abzug.

19. B e i s p i e l.

Wer sich in seinem 26. Lebensjahre mit Anspruch auf Dividenden versichert hat pro 100 Thlr. in der Leipziger und Gothaer Bank 2 Thlr. 12 Sgr. 3 Pf. und beim Janus in Hamburg 2 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. als jährliche Prämie zu zahlen. Gesetzt nun Jemand, der sich in allen drei Banken in jenem Alter versichert hätte, stürbe nach erreichtem 45. Lebensjahre, wie viel hätte derselbe auf jede 100 Thlr., die seine Erben ausgezahlt erhalten, bereits eingezahlt, wenn 4 % gerechnet werden?

I. Berechnung für die Leipziger und Gothaer Bank.

In der Formel

$$S = \frac{C \cdot e \cdot (e^n - 1)}{0,04}$$

ist $C = 2 \text{ Thlr. } 12 \text{ Sgr. } 3 \text{ Pf.} = \frac{289}{120} \text{ Thlr.}$, $e = 1,04$

und $n = 20$ zu setzen, S wird gesucht; wir haben daher

$$S = \frac{289}{120} \cdot \frac{1,04 (1,04^{20} - 1)}{0,04}$$

$$= \frac{289 \cdot 26 \cdot (1,04^{20} - 1)}{120}$$

$$\begin{aligned} \log 1,04 &= 0,0170333 \\ \log 1,04^{20} &= 0,340666 \quad (20) \\ 1,04^{20} &= 2,1911, \end{aligned}$$

$$\text{also } S = \frac{289 \cdot 26 \cdot 1,1911}{120}$$

$$\begin{aligned} \log 289 &= 2,4608978 \\ \log 26 &= 1,4149733 \\ \log 1,1911 &= 0,0759482 \end{aligned}$$

$$\hline 3,9518193$$

$$\log 120 = 2,0791812$$

$$\hline \log S = 1,8726381$$

$$S = 74,58 \dots$$

Bei diesen Banken gewinnen demnach die Erben von jedem Hundert ausser den Dividenden c. 25 Thlr.

II. Berechnung beim Janus.

Es ist hier $C = 2$ Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. $= \frac{9}{4}$ Thlr., das Uebrige dagegen wie vorher; wir haben deshalb mit Benutzung der vorher gewonnenen Resultate

$$S = \frac{9 \cdot 26 \cdot 1,1911}{4}.$$

$$\log 9 = 0,9542425$$

$$\log 26 = 1,4149733$$

$$\log 1,1911 = 0,0759482$$

$$2,4451640$$

$$\log 4 = 0,6020600$$

$$\log S = 1,8431040$$

$$S = 69,679 \dots$$

Beim Janus gewinnen demnach die Erben ausser den Dividenden an jedem Hundert c. 30 Thlr.

20. Beispiel.

Beim Janus findet noch eine Versicherung ohne Anspruch auf Dividenden Statt, und es hat bei dieser Jemand, der sich im 26. Lebensjahre versichert, jährlich 2 Thlr. Prämie zu zahlen. Wie viel würden hier die Erben am Hundert profitieren, wenn der Versicherte im angetretenen 46. Lebensjahre stürbe?

Rechnen wir wieder zu 4 ‰, so ist $e = 1,04$, $C = 2$, $n = 20$, also

$$S = 2 \cdot 26 \cdot (1,04^{20} - 1)$$

$$\log 2 = 0,3010300$$

$$\log 26 = 1,4149733$$

$$\log (1,04^{20} - 1) = 0,0759482$$

$$S = 61,93 \dots$$

Die Erben würden also an jedem Hundert c. 38 Thaler profitieren.

§. 13.

Berechnung der jährlichen Zahlung.

21. B e i s p i e l.

Hat sich Jemand mit 100 Thlr. in Gotha oder Leipzig im 26. Lebensjahre mit Anspruch auf Dividenden versichert und stirbt im angetretenen 46. Lebensjahre, so hat er durch Prämienzahlung in Summa geleistet 75 Thlr.; hätte er dagegen dies beim Janus ohne Anspruch auf Dividenden gethan, so würde er in Summa nur 62 Thlr. geleistet haben. Nehmen wir nun an, dass in Gotha, Leipzig und Hamburg gleichgünstige Versicherungsverhältnisse stattfänden, so müsste der Mehrbetrag von 13 Thlr. in den beiden ersteren Städten durch gezahlte Dividenden gedeckt worden sein. Es fragt sich nun, wie viel der Versicherte alljährlich im Durchschnitt als Dividende erhalten haben müsste, wenn berücksichtigt wird, dass erst zu Anfange des 6. Jahres nach Abschluss der Versicherung die Dividendenvertheilung beginnt?

Da der Versicherte die ersten 5 Jahre keine Dividenden genießt, so ist hier $n = 15$, ferner $S = 13$, $e = 1,04$ und C ist gesucht. Wir haben deshalb

$$13 = \frac{C \cdot 1,04 (1,04^{15} - 1)}{0,04}$$

$$= C \cdot 26 \cdot (1,04^{15} - 1),$$

$$\text{mithin } C = \frac{13}{26 \cdot (1,04^{15} - 1)}.$$

$$\log 1,04 = 0,0170333$$

$$\log 1,04^{15} = 0,2554995 \quad (15)$$

$$1,04^{15} = 1,80094,$$

$$\text{mithin } C = \frac{13}{26 \cdot 0,80094}$$

$$= \frac{1300000}{26 \cdot 80094}$$

$$\log 1300000 = 6,1139434 \dots (29)$$

$$\log 26 = 1,4149733$$

$$\log 80094 = 4,9036000$$

$$6,3185733 \dots (30).$$

Ziehen wir (30) von (29) ab, so erhalten wir

$$\log C = 0,7953701 - 1$$

$$C = 0,62426 \text{ Thlr. oder circa}$$

$$C = 18 \text{ Sgr.}$$

Berechnen wir dies nach Procenten der Jahresprämie, so haben wir

$$\frac{289}{120} : \frac{3}{5} = 100 : x;$$

woraus sich $x = 24,9$ ergibt. Die Verhältnisse würden also gleichgünstig sein, wenn in Gotha und Leipzig c. 25 % von der Jahresprämie als Dividende restituirt würden.

22. B e i s p i e l.

Wenn die jährlichen Feldfrüchte eines Gutsbesitzers im Durchschnitt einen Werth von 15750 Thlr. haben und eine Hagelassekuranz-Gesellschaft annähme, dass eine Feldmark durchschnittlich alle 20 Jahre total verhagelt würde, wie hoch müsste letztere die jährliche Versicherungsprämie ansetzen, wenn $3\frac{1}{2}$ % Zinsen berechnet werden?

Da die Prämien zu Anfange jedes Jahres bezahlt werden müssen, so haben wir wieder nach der Formel

$$S = \frac{C \cdot e (e^n - 1)}{e - 1}$$

zu rechnen, und zwar ist $S = 15750$, $n = 20$, $e = 1,035$ und C ist gesucht, mithin ist

$$\begin{aligned} 15750 &= \frac{C \cdot 1,035 (1,035^{20} - 1)}{0,035} \\ &= \frac{C \cdot 1035 (1,035^{20} - 1)}{35}, \end{aligned}$$

$$\text{folglich } C = \frac{15750 \cdot 35}{1035 \cdot (1,035^{20} - 1)}.$$

$$\begin{aligned} \log 1,035 &= 0,0149403 \\ \log 1,035^{20} &= 0,298806 \\ 1,035^{20} &= 1,98976, \end{aligned} \quad (20)$$

deshalb

$$C = \frac{15750 \cdot 35}{1035 \cdot 0,98976}$$

$$\log 15750 = 4,1972806$$

$$\log 35 = 1,5440680$$

$$\hline 5,7413486 \dots (31)$$

$$\log 1035 = 3,0149403$$

$$\log 0,98976 = 0,9955299 - 1$$

$$\hline 3,0104702 \dots (32).$$

Wird (32) von (31) abgezogen, so erhalten wir

$$\log C = 2,7308784$$

$$C = 538,1 \dots$$

Die jährliche Prämie müsste demnach jährlich c. 538 Thlr. betragen, d. h. also c. $3\frac{2}{5}\%$ der Versicherungssumme.

Anmerkung. Auch die Beispiele 21 und 22 lassen sich mit Hülfe der Tafel III. berechnen. Man findet nämlich in derselben den Werth von

$$\frac{1,04 (1,04^{15} - 1)}{0,04} = 20,392742 \text{ und hat deshalb bei ersterem } C =$$

$$\frac{13}{20,392749} = 0,62426. \text{ Beim zweiten findet man } \frac{1,035 (1,035^{20} - 1)}{0,035} =$$

$$29,269741 \text{ und hieraus } C = \frac{15750}{29,269741} = 538,1.$$

§. 14.

Berechnung der Jahre.

23. Beispiel.

*Bei Verzichtleistung auf Dividenden hat Jemand, der sich im 33. Lebensjahre beim Janus mit 100 Thlr. versichert, eine jährliche Prämie von 2 Thlr. 12 Sgr. zu zahlen. Nehmen wir $3\frac{3}{4}\%$ *) Zinsen an, so fragt es sich, was die Gesellschaft als mittleres Lebensalter bei Personen, die im 33. Lebensjahre noch vollkommen gesund sind, annimmt?*

Wir haben hier $S = 100$, $C = 2 \text{ Thlr. } 12 \text{ Sgr.} = \frac{12}{5} \text{ Thlr.}$, $e = 1,0375$ und n ist gesucht, also

*) Höher wird man den Zinsfuß nicht stellen können, da die Gesellschaft nicht alle Gelder zinsbar anlegen und der ihr dadurch erwachsende Verlust deshalb wohl recht gut mit $\frac{1}{4}\%$ veranschlagt werden kann.

$$100 = \frac{12 \cdot 1,0375 (1,0375^n - 1)}{5 \cdot 0,0375}$$

$$= \frac{12 \cdot 10375 (1,0375 - 1)}{5 \cdot 375},$$

$$\frac{500 \cdot 375}{12 \cdot 10375} + 1 = 1,0375^n.$$

$$\log 500 = 2,6989700$$

$$\log 375 = 2,5740313$$

$$5,2730013 \dots (33).$$

$$\log 12 = 1,0791812$$

$$\log 10375 = 4,0159881$$

$$5,0951693 \dots (34).$$

Subtrahiren wir (34) von (33) so erhalten wir

$$0,1778320;$$

Hierzu ist der

$$\text{Num.} = 1,50603,$$

also ist

$$2,50603 = 1,0375^n,$$

$$n = \frac{\log 2,50603}{\log 1,0375}$$

$$= \frac{0,3989863}{0,0159881}$$

$$= \frac{3989863}{159881} = 24,9.$$

Es ist also die Versicherungssumme in c. 25 Jahren durch die Prämien gedeckt, es wird also $33 + 25 = 58$ Jahre als mittleres Lebensalter angenommen.

24. Beispiel.

Bei einer Versicherung mit Anspruch auf Dividenden ist im 33. Lebensjahre beim Janus für 100 Thlr. als jährliche Prämie 2 Thlr. 21 Sgr. zu entrichten. Nach wie viel Jahren ist bei $3\frac{3}{4}\%$ das versicherte Capital durch Prämien gedeckt?

Es ist hier $S = 100$, $C = 2,7$, $e = 1,0375$, n gesucht, mithin

$$100 = \frac{2,7 \cdot 10375 (1,0375^n - 1)}{375},$$

$$\frac{37500}{2,7 \cdot 10375} + 1 = 1,0375^n.$$

$$\log 37500 = 4,5740313 \dots (35)$$

$$\begin{array}{l} \log 2,7 = 0,4313638 \\ \log 10375 = 4,0159881 \end{array} \}$$

$$4,4473519 \dots (36).$$

(36) von (35) subtrahirt, giebt:

$$0,1266794,$$

davon ist der

$$\text{Numerus} = 1,33869$$

folglich

$$\begin{aligned} 2,33869 &= 1,0375^n, \\ n &= \frac{\log 2,33869}{\log 1,0375} = \frac{0,3689726}{0,0159881} \\ &= \frac{3689726}{159881} = 23,0 \dots \end{aligned}$$

Nach c. 23 Jahren ist demnach die Versicherungssumme durch Prämien absorbirt.

25. Beispiel.

Bei der Alter-Versorgungs-Gesellschaft zu Breslau bekommt derjenige, der in seinem 33. Lebensjahre die Summe von 827 Thlr. einzahlt, von seinem 50. Lebensjahre ab bis zum Tode zu Anfange jedes Jahres eine Pension von 100 Thalern ausgezahlt. Nach wie viel Jahren wird derselbe, wenn 4 % Zinsen gerechnet werden, durch gezogene Pensionen das Einlage-Capital absorbirt haben?

Wir haben hier $S = 827$, $C = 100$, $e = 1,04$ und n ist gesucht, also

$$827 = 100 \cdot \frac{1,04(1,04^n - 1)}{0,04}$$

$$= 100 \cdot 26 \cdot (1,04^n - 1),$$

$$\frac{827}{2600} + 1 = 1,04^n.$$

$$\log 827 = 2,9175055$$

$$\log 2600 = 3,4149733$$

$$\hline 0,5025322 - 1$$

$$\text{num.} = 0,31807,$$

es ist also

$$1,31807 = 1,04^n$$

$$n = \frac{\log 1,31807}{\log 1,04} = \frac{0,1199385}{0,0170333} \\ = 7,0.$$

Das Einlage - Capital ist demnach nach 7 Jahren durch gezogene Pensionen absorbiert *).

§. 15.

Berechnung des Zinsfusses.

26. Beispiel.

Wenn man bei der Lebensversicherungs-Bank zu Lübeck für ein Kind von dessen Geburt an alljährlich pränumerando eine Prämie von 3 Thlr. 20 Sgr. zahlt, so wird dem Kinde von der Bank im 18. Lebensjahre eine Aussteuer von 100 Thaler ausgezahlt. Wenn nun ein Kind dieses Alter erreicht, wie hoch haben sich dann die gezahlten Prämien verzinst?

Es ist hier $S = 100$, $C = 2 \text{ Thlr. } 20 \text{ Sgr.} = \frac{8}{3} \text{ Thlr.}$, $n = 18$ und e ist gesucht, also ist

$$100 = \frac{8}{3} \cdot \frac{e(e^{18}-1)}{e-1} \quad ..$$

Eine direkte Lösung würde nur durch Auflösung einer Gleichung von 18 Grade möglich sein, wir wählen deshalb den Weg des Probirens. Wir gehen hierbei von der Betrachtung aus, dass je höher der Zinsfuss angenommen wird, desto höher auch die Leistung durch gezahlte Prämien steigt, da ja die Zinsen mit geleistet werden. Es ist nun derjenige Zinsfuss zu suchen, für welchen diese Leistung den Betrag

*) Es versteht sich von selbst, dass der Versicherte zu dieser Zeit doch noch mehr geleistet, als genossen hat, indem ja der Gesellschaft von dessen Einlage-Capitale noch die Zinsen von 24 Jahren zu Gute gekommen sind.

100 Thlr. erreicht. Es wird uns hierbei die Tafel III. hülfsreiche Dienste leisten. Diese enthält nämlich für verschiedene Procentsätze die Werthe des Ausdrucks

$$\frac{e(e^n - 1)}{e - 1}$$

von $n = 1$ bis $n = 100$. Aus unserer Gleichung erhalten wir nun, wenn wir beiderseits durch $\frac{8}{3}$ dividiren

$$37,5 = \frac{e(e^{18} - 1)}{e - 1}.$$

Suchen wir nun die Zahl 37,5 in der zu 18 Jahren gehörigen Querspalte, so überzeugen wir uns, dass selbst bei 7%, dem höchsten Procentsatze, für welchen die Tafel berechnet ist, dieser Betrag noch nicht erreicht wird, indem

$$\frac{1,07(1,07^{18} - 1)}{0,07} = 36,378965$$

ist. Es bleibt uns deshalb nichts übrig, als die Procente noch etwas zu erhöhen und dadurch dem Werthe 37,5 näher zu kommen. Nehmen wir $7\frac{1}{4}\%$ an, so haben wir

$$S = \frac{1,0725(1,0725^{18} - 1)}{0,0725} = \frac{10725(1,0725^{18} - 1)}{725}.$$

$$\begin{aligned} \log 1,0725 &= 0,0303973 \\ \log 1,0725^{18} &= 0,5471514 \\ 1,0725^{18} &= 3,52494, \end{aligned} \quad (18)$$

$$\text{mithin } S = \frac{10725 \cdot 2,52494}{725}$$

$$\log 10725 = 4,0303973$$

$$\log 2,52494 = 0,4022442$$

69

$$4,4326484$$

$$\log 725 = 2,8603380$$

$$\log S = 1,5723104$$

$$S = 37,35.$$

Dieser Werth stimmt mit dem früheren 37,5 bis auf $\frac{3}{20}$ Thlr. oder $4\frac{1}{2}$ Sgr. überein. Die gezahlten Prämien verinteressiren sich also noch ein wenig höher als zu $7\frac{1}{4}\%$.

27. B e i s p i e l.

Wird für ein Kind beim Janus in Hamburg alljährlich pränumerando vom 2. Jahre ab 3 Thlr. 10 Sgr. Prämie gezahlt, so erhält das Kind nach erreichtem 21. Lebensjahre ein Kapital von 100 Thlr. ausgezahlt. Wie hoch würden sich nach dieser Zeit die Einlagen verzinst haben?

Es ist hier $S = 100$, $C = 3 \text{ Thlr. } 10 \text{ Sgr.} = \frac{10}{3} \text{ Thlr.}$,
 $n = 19$ und e ist gesucht, wir haben also

$$100 = \frac{10}{3} \frac{e(e^{19}-1)}{e-1}$$

$$\text{oder } 30 = \frac{e(e^{19}-1)}{e-1}$$

Suchen wir die Zahl 30 in der zu 19 Jahren gehörigen Querspalte der Tafel III., so finden wir bei $4\frac{1}{2}\%$ den Betrag 30,371423; so dass sich also die Prämien nahe zu $4\frac{1}{2}\%$ verzinsen. Nehmen wir zu genauerer Bestimmung des Zinsfusses etwa $4\frac{7}{16}\%$ an, so haben wir $e = 1,044375$, also

$$S = \frac{1,044375 (1,044375^{19} - 1)}{0,044375}$$

$$\log 1,044375 = 0,0188565$$

$$\log 1,044375^{19} = 0,3582735 \quad (19)$$

$$1,044375^{19} = 2,281778,$$

$$\text{also } S = \frac{1044375 \cdot 1,281778}{44375}$$

$$\log 1044375 = 6,0188565$$

$$\log 1,281777 = 0,1077864$$

$$237$$

$$27$$

$$6,1266693$$

$$\log 44375 = 4,6471384$$

$$\log S = 1,4795309$$

$$S = 30,167.$$

Die Prämien verzinsen sich mithin fast genau zu $4\frac{7}{16}\%$.

28. Beispiel.

Die Medical, Invalid and General Life Assurance Society in London (Verwaltung für Deutschland in Frankfurt am Main) hat eine Aussteuerversicherung, bei welcher die Prämien zurückgezahlt werden, wenn das Kind die Versicherungszeit nicht erlebt. Man kann daselbst einem Kinde im Alter von 1 Jahre ein Capital von 100, zahlbar nach erreichtem 21. Lebensjahre durch eine jährliche Prämie von 3 Thaler 16 Sgr. 8 Pf. sichern. Wie hoch verzinsen sich hier die jährlichen Einlagen, wenn das Kind jenes Alter erreicht?

Es ist hier $S = 100$, $C = 3 \text{ Thlr. } 16 \text{ Sgr. } 8 \text{ Sgr.} = \frac{32}{9} \text{ Thlr.}$, $n = 20$, mithin

$$100 = \frac{32}{9} \cdot \frac{e(e^{20}-1)}{e-1}$$

$$\text{oder } \frac{900}{32} = 28,125 = \frac{e(e^{20}-1)}{e-1}.$$

Suchen wir die Zahl 28,125 in der zu 20 Jahren gehörigen Querspalte der Tafel III., so finden wir bei $3\frac{1}{4} \%$ den Betrag 28,460082 . . Die jährlichen Einlagen verzinsen sich demnach nahe zu $3\frac{1}{4} \%$.

29. Beispiel.

Bei der im Jahre 1849 gegründeten „Deutschen Betrieb-Capitals- und Aussteueranstalt für den Handels- und Handwerkerstand“ zu Berlin hat man, um einem Kinde, welches 2 Jahre alt ist, bei erreichtem 24. Lebensjahre ein Kapital von 100 Thlr. zu sichern, monatlich 6 Sgr. 3 Pf. oder vierteljährlich 18 Sgr. 9 Pf. zu zahlen. Wie hoch würden sich diese Einlagen verinteressiren, wenn das Kind jenes Alter erreichte?

Nehmen wir an die Prämien würden jährlich pränumerando gezahlt, so dass also die Prämie $2\frac{1}{2} \text{ Thlr.}$ betrüge, so haben wir $S = 100$, $C = \frac{5}{2} \text{ Thlr.}$, $n = 22$, also

$$100 = \frac{5}{2} \cdot \frac{e(e^{22}-1)}{e-1}$$

$$\text{oder } 40 = \frac{e(e^{22}-1)}{e-1}.$$

In Taf. III. finden wir sehr nahe $e = 1,05$. Die Prämien verinteressirten sich also ungefähr zu 5 %.

30. Beispiel.

Bei derselben Anstalt ist vom 20. Lebensjahre ab vierteljährlich 4 Thlr. 10 Sgr. für die gleiche Versicherung zu zahlen. Wie viel Procente würden hier die Prämien bei der vorigen Voraussetzung tragen?

Nehmen wir jährliche Prämienzahlung im Betrage von 17 Thlr. 10 Sgr. an, so haben wir

$$S = 100, \quad C = \frac{52}{3}, \quad n = 4,$$

$$\text{also } 100 = \frac{52}{3} \cdot \frac{e^{(4-1)}}{e-1} \quad \text{oder nahe}$$

$$5,77 = \frac{e(e^4-1)}{e-1}.$$

Da nach Taf. III. der Betrag bei 7 % erst 4,750.. ausmacht, so ist der Zinsfuss noch weit über 7 %. Um ihn genauer zu ermitteln und doch die Tafeln benutzen zu können, gehen wir auf die vierteljährlichen Zahlungen zurück. Rechnen wir statt 4 Jahren 16 Vierteljahre, so haben wir

$$S = 100, \quad C = \frac{13}{3}, \quad n = 16,$$

$$\text{also } 100 = \frac{13}{3} \cdot \frac{e(e^{16}-1)}{e-1}$$

$$\text{oder } 23,08 = \frac{e(e^{16}-1)}{e-1},$$

wo sich e auf die Zinsen für ein Vierteljahr bezieht.

In Tafel III. finden wir in der 16. Querspalte 22,7 c. bei 4 % und 23,7 c. bei $4\frac{1}{2}$ %. Nach ungefährrer Schätzung tragen also die Prämien vierteljährlich etwa $4\frac{1}{8}$ %, also jährlich $16\frac{1}{2}$ % *).

*) Das von der Anstalt am 1. Juni 1849 ausgegebene Programm muss schlechterdings falsch sein, denn bei $16\frac{1}{2}$ % müsste das Institut binnen Kurzem zu Grunde gehen. Wahrscheinlich soll der Passus „wenn das Mit-

Zum Schlusse geben wir auch hier noch ein direkt gelöstes Beispiel.

31. Beispiel.

Eine Summe von 9900 Thlr., die Jemand nach 3 Jahren zu zahlen hat, will derselbe durch Raten à 3000 Thlr., die drei Jahre hinter einander zu Anfange eines jeden zahlbar sind, decken. Wie hohe Procente rechnet er?

Es ist hier $S = 9900$, $C = 3000$, $n = 3$, also

$$9900 = 3000 \cdot \frac{e(e^3 - 1)}{e - 1}$$

$$\text{oder } 3,3 = \frac{e(e^3 - 1)}{e - 1} = e(e^2 + e + 1) = e^3 + e^2 + e,$$

also ist $e^3 + e^2 + e - 3,3 = 0$ die zu lösende Gleichung.

Setzen wir in dieselbe $y - \frac{1}{3} = e$ ein, so erhalten wir

$$y^3 + \frac{2}{3}y - \frac{961}{270} = 0.$$

Befolgen wir dasselbe Verfahren, wie beim 17. Beispiele, so haben wir zunächst den Winkel φ aus

$$\text{tg } \varphi = \frac{5400 \sqrt{2}}{4805}$$

zu berechnen. Es ist

glied bei seiner Aufnahme alt ist: 2 Jahre u. s. f.“ heissen, „wenn das Mitglied bei seiner Aufnahme das 2te Jahr angetreten hat“, wo also vorausgesetzt wird, dass für das angetretene Jahr noch Prämien mitbezahlt werden müssen. Nehmen wir dies an, so hätten wir die Formel

$$23,08 = \frac{e(e^{20} - 1)}{e - 1},$$

weil 4 Vierteljahre länger Prämien gezahlt werden. Suchen wir die Zahl 23,08 in der 20. Querspalte der Tafel III., so finden wir 22,239 . . bei 1 % und 24,78 . . bei 2 %, die vierteljährlichen Zinsen würden also ungefähr 1½ %, also die jährlichen 6 % betragen. Jedoch auch bei diesem Zinsfusse dürfte die Anstalt ohne Eiuforderung von Nachschüssen wohl schwerlich auskommen.

$$\log 5400 = 3,7323938$$

$$\log \sqrt{2} = 0,1505150$$

$$\hline 3,8829088$$

$$\log 4805 = 3,6816934$$

$$\log 27 = 1,4313638$$

$$\hline 5,1130572$$

} subtrahirt

$$\log \operatorname{tg} \varphi = 8,7698516 - 10.$$

$$\varphi = 3^{\circ} 22' 7,6''.$$

$$\frac{1}{2} \varphi = 1^{\circ} 41' 3,8''.$$

$$\operatorname{tg} \psi = \sqrt[3]{\operatorname{tg} 1^{\circ} 41' 3,8''}.$$

$$\log \operatorname{tg} 1^{\circ} 41' 3,8'' = 8,4684448 - 10$$

$$= 28,4684448 - 30$$

$$\log \operatorname{tg} \psi = \log \sqrt[3]{\operatorname{tg} 1^{\circ} 41' 3,8''} = 9,4894816 - 10 \quad (3)$$

$$\psi = 17^{\circ} 9' 12,3''.$$

$$2 \psi = 34^{\circ} 18' 24,6'',$$

$$y = \frac{2\sqrt{2} \cot. 34^{\circ} 18' 24,6''}{3}.$$

$$\log 2 = 0,3010300$$

$$\log \sqrt{2} = 0,1505150$$

$$\log \cot 2 \psi = 10,1660065 - 10$$

$$\hline 0,6175515$$


$$\log 3 = 0,4771213$$

$$\hline \log y = 0,1404302$$

$$y = 1,3816,$$

$$e = 1,38316 - 0,33333 = 1,04983.$$

Die Theilzahlungen würden sich also nahe zu 5 % verinter-
essiren.



Viertes Kapitel.

Renten-Rechnung bei Zahlung der Mise in einer Summe.

§. 16.

Allgemeine Bemerkungen.

Eine in festgesetzten gleichen Terminen während eines bestimmten Zeitraums zahlbare Geldeinnahme, die man sich durch Erlegung eines gewissen Capitals oder durch Ueberlassung eines anderen Besitzthums erwirbt, wird eine Rente genannt, während das, wofür letztere erworben wird, die Mise heisst.

Die auf eine bestimmte Zeit abgeschlossenen Renten heissen Zeitrenten, die auf die ganze Lebensdauer des Rentenempfängers (Rentenirers) abgeschlossenen hingegen Leibrenten.

Man unterscheidet ferner Jahrrenten, Halbjahrrenten, Vierteljahrrenten, Monatrenten u. s. w., je nachdem die Rente alle Jahre, alle Halbjahre u. s. w. ausbezahlt wird.

Erfolgt die Zahlung der Rente zu Anfange des festgesetzten Termins, so heisst sie eine vorschussweise, erfolgt sie am Ende, eine nachschussweise.

I. Sofort beginnende nachschussweise Zeitrenten ohne Rücksicht auf Sterblichkeit.

§. 17.

Theorie dieser Rechnungsart.

A. Wir stellen uns die Aufgabe: welches ist der gegenwärtige Werth (W) einer n Jahre hinter einander zu zahlenden nachschussweisen Rente (R), wenn $p\%$ Zinsen gerechnet werden.

Bezeichnen wir wieder den Ausdruck $\frac{p+100}{100}$ mit e , so ist nach §. 1. die Summe W in n Jahren angewachsen zu $W \cdot e^n$.

Eine am Ende jedes Jahres n Jahre hinter einander gezahlte Summe R wächst aber nach §. 6. an zu

$$R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1}.$$

Der erste Ausdruck bezeichnet nun die Leistung des Rentenkäufers, der zweite die des Rentenzahlers, folglich haben wir, da die Leistungen gleich sein müssen

$$W \cdot e^n = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1} \dots (37)$$

$$\text{mithin } W = R \cdot \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} \dots (38).$$

B. Wird nach der Rente (R) gefragt, welche für eine bestimmte eingezahlte Summe (W) bei $p\%$ Zinsen n Jahre hinter einander gezahlt werden kann, so ergibt die Formel (38)

$$R = W \cdot \frac{e^n(e - 1)}{e^n - 1} \dots (38).$$

C. Soll gegen eine Summe W die Rente R bei $p\%$ Zinsen alljährlich gezahlt werden und es wird gefragt, wie viele (n) Jahre dies geschehen kann, so haben wir aus (37)

$$\begin{aligned} W e^n (e - 1) &= R e^n - R \\ \text{oder } R &= R e^n - W e^n (e - 1) \\ &= [R - W(e - 1)] e^n \\ \text{oder } e^n &= \frac{R}{R - W(e - 1)} \end{aligned}$$

Nehmen wir beiderseits die Logarithmen, so erhalten wir

$$n \log e = \log R - \log [R - W(e-1)]$$

$$\text{also } n = \frac{\log R - \log [R - W(e-1)]}{\log e} \dots (39).$$

D. Wird Jemanden gegen die sofort zu erlegende Summe W die Rente R auf n Jahre zugesichert, und es wird gefragt, was für ein Zinsfuß ($p\%$) hierbei angenommen worden ist, so ergibt sich aus (37)

$$We^n = R(e^{n-1} + e^{n-2} + e^{n-3} + \dots + e^3 + e^2 + e + 1) \dots (40).$$

Die Aufgabe führt also auf eine Gleichung vom n ten Grade. Man bedient sich auch hier statt der direkten Lösung der Lösung durch Probiren, wovon später weiter die Rede sein wird.

§. 18.

Berechnung des gegenwärtigen Werthes.

31. Beispiel.

Welchen Werth hat eine nachschussweise Rente im Betrage von 215 Thlr., welche 25 Jahre hinter einander gezahlt wird, wenn $3\frac{1}{2}\%$ Zinsen gerechnet werden?

Wir rechnen hier nach der Formel (38) und haben $R = 215$, $n = 25$, $e = 1,035$ in dieselbe einzusetzen, wodurch wir erhalten

$$W = \frac{215 \cdot (1,035^{25} - 1)}{0,035 \cdot 1,035^{25}}.$$

In Tafel IV. sind die gegenwärtigen Werthe der 1 bis 100 Jahre hinter einander zu zahlenden Rente von 1 Thlr. berechnet. Bezeichnen wir in unserem Beispiele den gegenwärtigen Werth der Rente von 1 Thlr. mit w , so ist

$$w = \frac{1,035^{25} - 1}{0,035 \cdot 1,035^{25}}.$$

Diesen Werth finden wir in der erwähnten Tafel, indem wir in der ersten Spalte herab bis zur Zahl 25 und von dieser horizontal bis zu der mit $3\frac{1}{2}\%$ überschriebenen Spalte gehen. Die Zahl, die wir da finden, ist

$$w = 16,4815146.$$

Nun ist

$$W = 215 \cdot w$$

oder wenn wir die Multiplication ausführen

$$W = 3543,5256 \text{ Thlr.}$$

32. Beispiel.

Jemand übernimmt ein Haus mit der Verpflichtung dem bisherigen Besitzer 15 Jahre hinter einander eine nachschussweise Rente von 200 Thlrn. auszusahlen. Wie hoch wurde das Haus taxirt, wenn 4 % Zinsen gerechnet werden?

Wir finden in Tafel IV. als die zu 15 Jahren und 4% gehörige Zahl

$$11,1183874.$$

Multipliciren wir diese mit 200, so erhalten wir

$$W = 2223,67758 \text{ Thlr.}$$

33. Beispiel.

Eine Stadt will in einer Bank ein Darlehn aufnehmen mit der Verpflichtung, dasselbe durch eine am Ende jedes Jahres zahlbare Summe von 800 Thlrn. binnen 30 Jahren zu decken. Welche Summe kann die Bank der Stadt vorstrecken, wenn zu 4½ % negoziert worden ist?

Die zu 30 Jahren und 4½ % gehörige Zahl der Taf. IV. ist

$$16,2888885.$$

Multipliciren wir diese mit 800, so erhalten wir

$$W = 13031 \text{ Thlr.}$$

§. 18.

Berechnung der Rente oder jährliche Zahlung.

Wird nach dem Betrage der Rente (R) gefragt, welche gegen Erlegung einer bestimmten Summe (W) bei p % Zinsen n Jahre hinter einander postnumerando gezahlt werden kann, so findet die Formel (38)

$$R = W \cdot \frac{e^n (e-1)}{e^n - 1}$$

Anwendung. Statt W mit $\frac{e^n (e-1)}{e^n - 1}$ zu multipliciren,

können wir auch W mit dem umgekehrten Werthe des zweiten Ausdrucks, also mit

$$\frac{e^n - 1}{e^n (e - 1)}$$

dividiren und es kann also, da letzterer Ausdruck mit Hülfe der Tafel IV. gefunden wird, die Berechnung ebenfalls mit Benutzung genannter Tafel geführt werden, indem der gegebene Werth W durch die in der Tafel gefundene Zahl dividirt wird.

34. Beispiel.

Dem Vormunde eines Kindes von 5 Jahren wird eine Summe von 5000 Thlr. überwiesen mit der Verpflichtung, genanntes Kind bis zu seiner Grossjährigkeit zu erziehen. Welches ist der Betrag des postnumerando zahlbar angenommen jährlichen Erziehungsgeldes, wenn 5 % Zinsen berechnet werden?

Da das Kind im 24. Jahre majorenn wird, so ist dasselbe 19 Jahre lang zu erziehen, wir haben also $n = 19$, $p = 5$ und $W = 5000$. Die zu 19 Jahren und 5 % gehörige Zahl in Taf. IV. ist

$$12,0853209.$$

Dividiren wir mit derselben in 5000, so erhalten wir

$$R = 413, 7 \dots \text{Thlr.}$$

35. Beispiel.

Ein Staat macht eine Anleihe von 7 Millionen Thaler unter der Bedingung, diese Summe innerhalb 40 Jahren durch eine jährlich postnumerando zu zahlende Summe zu decken. Wie hoch ist der Betrag der letzteren, wenn $4\frac{1}{2}$ % Zinsen berechnet werden?

Es ist hier $W = 7000000$, $n = 40$, $p = 4\frac{1}{2}$. Da die in Tafel IV. zu 40 Jahren und $4\frac{1}{2}$ % gehörige Zahl

$$18,4015844$$

ist, so haben wir

$$R = \frac{7000000}{18,4015844} \text{ Thlr.} = 380402 \text{ Thlr.} \text{ — Sgr. 10 Pf.}$$

36. Beispiel.

Welche nachschussweise Vierteljahrrente (R) kann für die Summe 5758 Thlr. während 20 Jahren zahlbar bei 4 % Zinsen gewährt werden?

Da die Rente vierteljährlich bezahlt werden soll, so sind auch die vierteljährlichen Zinsen (1 %) in Betracht zu ziehen, wir haben deshalb in Formel (38) die Werthe $W = 5758$, $e = 1,01$, $n = 80$ einzusetzen. Die zu $n = 80$ und 1 % gehörige Zahl in Tafel IV. ist

$$54,8882061.$$

Dividiren wir damit in 5758, so erhalten wir

$$R = \frac{5758}{54,8882061} \text{ Thlr.} = 104 \text{ Thlr. } 27 \text{ Sgr.}$$

§. 19.

Berechnung der Jahre.

Auf wie viele Jahre kann Jemandem eine nachschussweise Jahrrente im Betrage von 250 Thlr. bei Einzahlung einer Summe von 3750 gewährt werden, wenn $3\frac{1}{2}$ % Zinsen berechnet werden?

Wir haben hier $W = 3750$, $R = 250$, $e = 1,035$ und n ist gesucht, wir rechnen deshalb nach Formel (39)

$$n = \frac{\log 2 - \log (R - W(e-1))}{\log e}.$$

Setzen wir unsere Werthe in dieselbe ein, so bekommen wir

$$n = \frac{\log 250 - \log (250 - 3750 \cdot 0,035)}{\log 1,035}$$

$$= \frac{\log 250 - \log (250 - 131,25)}{\log 1,035}$$

$$= \frac{\log 250 - \log 118,75}{\log 1,035}$$

$$\begin{array}{rcl} \log 250 & = & 2,3979400 \\ \log 118,75 & = & 2,0746336 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \log 250 & = & 2,3979400 \\ \log 118,75 & = & 2,0746336 \end{array}} \right\} \text{ subtrahirt}$$

$$\hline 0,3233064.$$

$$\log 1,035 = 0,0149403.$$

Es ist also

$$n = \frac{0,3233064}{0,0149403} = \frac{3233064}{149403} \\ = 21,6.$$

Die besagte Rente kann demnach 21 Jahre hinter einander gewährt werden.

37. Beispiel.

Eine Aktiengesellschaft bringt zum Aufbau und zur Einrichtung einer Zuckersiederei eine Summe von 75000 Thlr. auf. Nach wie viel Jahren beginnt der eigentliche Nutzen für die Theilhaber, wenn die Fabrik im Durchschnitt einen Reinertrag von 8560 Thlr. gewährt und die aufgewendeten Gelder sonst mit 5 % ausgeliehen werden könnten?

Es ist hier $W = 75000$, $R = 8560$, $e = 1,05$ und n ist gesucht. Setzen wir die Werthe in (39) ein, so erhalten wir

$$n = \frac{\log 8560 - \log (8560 - 75000 \cdot 0,05)}{\log 1,05}$$

$$= \frac{\log 8560 - \log 4810}{\log 1,05}$$

$$\log 8560 = 3,9324738$$

$$\log 1810 = 3,6821451$$

} subtrahirt

$$0,2503287$$

$$\log 1,05 = 0,0211893.$$

Es ist also

$$n = \frac{0,2503287}{0,0211893} = \frac{2503287}{211893} \\ = 11,3 \dots$$

Der eigentliche Nutzen erfolgt erst im 12ten Jahre.

Auch die beiden letzten Aufgaben lassen sich mit Hülfe der Taf. IV. lösen.

Gehen wir nämlich auf die Formel (39) zurück, so ergibt sich aus derselben

$$\frac{W}{R} = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n},$$

oder wenn wir die Werthe aus dem 36. Beispiele einsetzen:

$$\frac{3750}{250} = \frac{1,035^n - 1}{0,035 \cdot 1,035^n} \cdot = 15.$$

Es enthält Tafel IV. die Werthe für den Ausdruck

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n}$$

für verschiedene Procentsätze von 1 — 100 Jahren. Suchen wir deshalb in der zu $3\frac{1}{2}\%$ gehörigen Spalte die zu dem Zahlenwerthe 15 gehörigen Jahre, so finden wir

bei 21 Jahren - - 14,697 . . .

und bei 22 Jahren - - 15,167 . . .

Der Werth von n liegt also zwischen 21 und 22.

Wenden wir dasselbe Verfahren auf das 37. Beispiel an, so haben wir

$$\frac{1,05^n - 1}{0,05 \cdot 1,05^n} = \frac{75000}{8560} = 8,74.$$

Suchen wir die Zahl 8,74 in der zu 5 % gehörigen Spalte, so finden wir

bei 11 Jahren 8,306 . .

und bei 12 Jahren 8,863 . . .

Der Werth von n liegt also zwischen 11 und 12.

§. 13.

Berechnung der Procente.

Es wurde bereits bemerkt, dass die Berechnung der Procente auf direktem Wege immer die Lösung einer algebraischen Gleichung erfordere, deren Grad bestimmt wird durch die Anzahl der Jahre, während welcher die Rente bezahlt wird; gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, dass man statt dieser direkten Lösung mit mehr Vortheil den Weg des Probirens wähle. Es ist nämlich nach Formel (38)

$$\frac{W}{R} = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n}$$

und es enthält die Tafel IV. die Werthe des Ausdrucks

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n}$$

für $e = 1,01$ bis $e = 1,07$ und für $n = 1$ bis 100, mithin hat man folgende Regel:

Man dividire mit der gegebenen Rente (R) in ihren ursprünglichen Werth (W) und suche die dadurch erhaltene Zahl in der zu den gegebenen (n) Jahren gehörigen Querspalte auf. Fände sie sich gerade vollständig auf, so wären die darüber stehenden Procente die gesuchten. Steht die vorerwähnte Zahl aber nicht in dieser Querspalte, was in der Regel der Fall sein wird, sondern fällt zwischen zwei dort befindliche Zahlen, so fallen auch die gesuchten Procente zwischen die zu den einschliessenden Zahlenwerthen gehörigen Procente.

Was zu der noch genaueren Bestimmung der Procente erforderlich ist und was zu thun ist, wenn sich auch ein Paar einschliessende Zahlenwerthe gar nicht finden, wird aus den nachfolgenden Beispielen deutlich werden.

38. B e i s p i e l.

Ein Staat nimmt ein Darlehn von 18000000 Thlr. auf unter der Bedingung, diese Schuld binnen 30 Jahren durch eine alljährlich postnumerando zu zahlende Summe von 1125000 Thalern ohne weitere Zinsenzahlung zu decken. Zu welchem Zinsfusse ist hierbei negoziirt worden?

Es ist hier $W = 18000000$ und $R = 1125000$, mithin

$$\frac{W}{R} = \frac{18000000}{1125000} = 16.$$

Suchen wir diese Zahl in Tafel IV. in der zu $n = 30$ gehörigen Querspalte, so finden wir die einschliessenden Zahlenwerthe

16,28... und 15,37...

bezüglich gehörig zu $4\frac{1}{2}$ und 5 %_o. Der Zinsfuss ist also etwas über $4\frac{1}{2}$ %_o. Um denselben genauer zu bestimmen, nehmen wir $p = 4\frac{3}{4}$, oder $e = 1,0475$ und berechnen dafür den Ausdruck

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} = \frac{1,0475^{30} - 1}{0,0475 \cdot 1,0475^{30}}.$$

$$\log 1,0475 = 0,0201540$$

$$30 \log 1,0475 = 0,6046200 \quad (30)$$

$$1,0475^{30} = 4,02365,$$

mithin

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} & = & \frac{3,02365}{0,0475 \cdot 1,0475^{30}} \\
 \log 3,02365 & = & 0,4805315 \\
 \log 0,0475 & = & 0,6766936 - 2 \\
 \log 1,0475^{30} & = & 0,6046200 \quad \left. \vphantom{\log 1,0475^{30}} \right\} \text{ addirt} \\
 & & \hline
 & & 0,2813136 - 1.
 \end{array}$$

Dies von 0,4805315 subtrahirt giebt

1,1992179.

Suchen wir die hierzu gehörige Zahl, so finden wir

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} = 15,82...$$

Es geht hieraus hervor, dass noch nicht ganz $4\frac{3}{4}\%$ angenommen sind. Nehmen wir zur genaueren Bestimmung $4\frac{5}{8}\%$ an, d. h. also setzen wir

$$e = 1,04625$$

so haben wir

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} = \frac{1,04625^{30} - 1}{0,04625 \cdot 1,04625^{30}}$$

zu berechnen.

$$\begin{array}{rcl}
 \log 1,04625 & = & 0,0196355 \\
 30 \log 1,04625 & = & 0,5890650 \quad (30 \\
 1,04625^{30} & = & 3,88208,
 \end{array}$$

mithin

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} & = & \frac{2,88208}{0,04625 \cdot 1,04625^{30}} \\
 \log 2,88208 & = & 0,4597060 \\
 \log 0,04625 & = & 0,6651117 - 2 \\
 \log 1,04625^{30} & = & 0,5890650 \quad \left. \vphantom{\log 1,04625^{30}} \right\} \text{ addirt} \\
 & & \hline
 & & 0,2541767 - 1.
 \end{array}$$

Dies von 0,4597060 subtrahirt giebt

1,2055293.

Die hierzu gehörige Zahl ist

16,052.

Es geht hieraus hervor, dass fast ganz genau zu $4\frac{5}{8}\%$ Procent negoziirt worden ist.

39. B e i s p i e l.

Jemand, der sich in seinem 54. Jahre bei der Medical, Invalid and General Life Assurance Society in London für 3000 Thlr. eine jährliche Rente im Betrage von 241 Thlr. gekauft hat, stirbt im erreichten 77. Lebensjahre. Wie hoch hat sich sein Geld verinteressirt?

Es ist $W = 3000$, $R = 241$ und $n = 23$. Wir haben somit, nach Einsetzung dieser Werthe in die Formel

$$\frac{W}{R} = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n},$$

$$12,448 = \frac{e^{23} - 1}{(e - 1)e^{23}}.$$

Suchen wir in Tafel IV. die Zahl 12,448 in der zu $n = 23$ gehörigen Querspalte, so finden wir in der zu 6% gehörigen Columne die Zahl 12,303. Es geht hieraus hervor, dass das Einlage-Capital des Rentenirers sich beinahe zu 6% verzinst hat. —

II. Später beginnende nachschussweise Zeilrenten.

§. 21.

Theorie dieser Rechnungsart.

Beginnt die Zahlung der Rente (R) erst einige (m) Jahre nach der Einzahlung ihrer Kaufsumme (W), so ist W vor Beginn des Rentengenusses angewachsen zu

$$W \cdot e^m.$$

Wird nun die Rente n Jahre bezogen, so genießt die Rentenbank die Zinsen der Kaufsumme noch anderweite n Jahre und es beträgt also die vollständige Leistung des Rentenkäufers

$$We^m \cdot e^n \text{ oder } W \cdot e^{m+n} = A.$$

Dafür genießt derselbe n Jahre hinter einander die Rente R also in Summa

$$R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1} = B.$$

Wir erhalten demnach als Grundformel dieser Rechnung, weil $A = B$ sein muss,

$$We^m \cdot e^n = W \cdot e^{m+n} = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1} \dots (41).$$

§. 22.

Berechnung des gegenwärtigen Werthes.

Wir erhalten aus Formel (41)

$$W = \frac{R(e^n - 1)}{(e - 1)e^n \cdot e^m} \dots (42).$$

Von diesem Ausdrucke kann der Werth von

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} = w$$

mittelst der Tafel IV., wenn die gegebenen Procente darin enthalten sind, gefunden werden, folglich bleibt

$$W = \frac{R \cdot w}{e^m} \dots (43)$$

zu berechnen, wo wieder e^m aus Tafel I. gefunden werden kann. —

Ist hingegen W für Procente zu berechnen, die in den Tafeln nicht stehen, so bleibt nichts übrig als aus der Formel

$$W = \frac{R(e^n - 1)}{(e - 1)e^{m+n}} \dots (44)$$

den Werth von W zu berechnen. Wir werden für jeden der beiden Fälle ein Beispiel berechnen.

40. B e i s p i e l.

Wer in seinem 40. Jahre bei der Breslauer Altersversorgungs-Gesellschaft die Summe von 300 Thaler einzahlt, erhält vom 70 Jahre an jährlich 100 Thlr. ausgezahlt. Ge-setzt es hätte sich Jemand in dieser Weise versichert und stürbe im 82 Jahre, was hätte dann eigentlich die Gesellschaft bei $3\frac{1}{2}\%$ fordern müssen?

Es ist hier $R = 100$, $e = 1,035$, $m = 29$, (es wird nämlich am Ende des 69sten Jahres die erste Rente bezahlt), $n = 14$, folglich erhalten wir nach Einsetzung dieser Werthe in Formel (42)

$$W = \frac{100}{1,035^{29}} \cdot \frac{1,035^{14} - 1}{0,035 \cdot 1,035^{14}}.$$

Der zweite Faktor ist nach Taf. IV.

$$w = 10,9205203.$$

Setzen wir diesen Werth in (33) ein, so erhalten

$$W = \frac{100 \cdot 10,9205203}{1,035^{29}}.$$

Nach Taf. I. ist $1,035^{29} = 2,711878$,

folglich

$$W = \frac{1092,5203}{2,711878} = 402,8 \dots \text{Thlr.}$$

Der Werth der gezogenen Renten hätte also in 40 Jahren eigentlich 402,8 Thlr. betragen.

41. B e i s p i e l.

Jemand hat als Eigenthümer vom Grund und Boden einen Grundkux an einem gewerkschaftlichen Bergbau. Wenn der Ertrag erst nach 7 Jahren beginnt und jeder Kuxinhaber nur während 20 Jahren einen jährlichen Nettogewinn von 1250 Thlr. genießt, weil nach dieser Zeit das Bergwerk an den Staat übergeht, so fragt es sich, wie theuer ist dem Grundbesitzer sein Grundstück bezahlt worden, wenn 5 % Zinsen berechnet werden?

Es ist hier $R = 1250$, $e = 1,05$, $m = 7$, $n = 20$ und W ist gesucht, wir erhalten also nach Formel (42)

$$W = \frac{1250}{1,05^7} \cdot \frac{1,05^{20} - 1}{0,05 \cdot 1,05^{20}}.$$

Der zweite Faktor ist nach Tafel IV.

$$w = 12,4622103$$

nach Tafel I. ist

$$1,05^7 = 1,407100$$

folglich

$$W = \frac{1250 \cdot 12,4622103}{1,407100}.$$

Berechnen wir diesen Ausdruck mit Logarithmen, so ist

$$\begin{array}{rcl}
 \log 1250 & = & 3,0969100 \\
 \log 12,462.. & = & 1,0955950 \\
 \hline
 & & 4,1925050 \\
 \log 1,4071 & = & 0,1483250 \\
 \hline
 \log W & = & 4,0441800 \\
 W & = & 11070,8 \dots
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{addirt} \\ \\ \text{subtrahirt} \end{array}$$

Das Grundstück ist demnach mit 11070,8 $\mathcal{R}$. bezahlt worden.

§. 23.

Berechnung der Rente.

Aus Formel (41) ergibt sich ohne Weiteres

$$R = W \cdot e^m \cdot \frac{e^n(e-1)}{e^n-1} \dots \quad (45)$$

oder wenn wir wieder

$$\frac{e^n-1}{e^n(e-1)} = w$$

setzen,

$$R = \frac{We^m}{w} \dots \quad (46).$$

Dies ist die Formel, welche der Berechnung der Rente zum Grunde liegt.

42. Beispiel.

Wer bei der Lübecker Bank in seinem 28. Jahre die Summe von 1200 Thlr. einzahlt, dem wird von dessen 39. Jahre ab alljährlich bis zum Tode eine Rente von 100 Thlr. ausgezahlt. Gesetzt Jemand hätte sich unter diesen Verhältnissen versichert und stürbe nach erreichtem 79. Lebensjahre, wie viel würde die Bank bei dieser Versicherung alljährlich gewonnen oder verloren haben, wenn 4 % Zinsen berechnet werden?

Es ist in diesem Falle $W = 1200$, $m = 11$, $n = 40$, $e = 1,04$, folglich

$$R = \frac{1200 \cdot 1,04^{11}}{w}$$

und zwar

$$w = \frac{1,04^{40} - 1}{1,04^{40} \cdot 0,04}.$$

Um R zu berechnen, suchen wir zunächst $1,04^{11}$ in Tafel I., wo wir

$$1,04^{11} = 1,539454$$

finden. Es ist also

$$\begin{aligned} R &= \frac{1200 \cdot 1,539454}{w} \\ &= \frac{1847,3448}{w}. \end{aligned}$$

Den Werth von w finden wir in Taf. IV. und zwar

$$w = 19,7927739.$$

Wir haben somit

$$\begin{aligned} R &= \frac{1847,3448}{19,7927739} . \\ &= 93,3 . . \end{aligned}$$

Die Gesellschaft hätte eigentlich unter diesen Umständen nur eine Rente von 93 Thlr. 9 Sgr. geben können, hat somit alljährlich 6 Thlr. 21 Sgr. verloren.

43. Beispiel.

Bei der vorerwähnten Bank hat Jemand im 47. Lebensjahre 501 Thlr. einzuzahlen, wenn er vom 63. Jahre ab 100 Thlr. Rente geniessen will. Wie würde sich hier bei 4% Zinsen der jährliche Gewinn oder Verlust der Bank stellen, wenn der Rentenkäufer nach erreichtem 79sten Lebensjahre stürbe?

Es ist hier $W = 501$, $m = 16$, $n = 16$, $e = 1,04$, also

$$R = \frac{501 \cdot 1,04^{16}}{w}$$

$$\text{und } w = \frac{1,04^{16} - 1}{1,04^{16} \cdot 0,04}.$$

Nach Tafel I. ist

$$1,04^{16} = 1,872981,$$

$$\begin{aligned} \text{folglich } R &= \frac{501 \cdot 1,872981}{w} \\ &= \frac{938,363481}{w}. \end{aligned}$$

Nach Tafel IV. ist

$$w = 11,6522956,$$

also

$$\begin{aligned} R &= \frac{938,363481}{11,6522956} \\ &= 80,5 \dots \end{aligned}$$

Es würde also auch in diesem Falle ein Verlust für die Gesellschaft erwachsen, weil die gezahlte Summe nur einer Rente von 80 Thlr. 15 Sgr. entspricht. Der jährliche Verlust betrüge demnach 21 Thlr. 15 Sgr.

§. 24.

Berechnung der Jahre, während welcher die Rente gezahlt wird.

Wird gefragt, auf wie viel Jahre eine Rente R , welche m Jahre vor dem Beginn derselben für die Summe W gekauft worden ist, bei festgesetztem Zinsfusse gewährt werden kann; so ist aus den Grössen W , R , m und e der Werth von n zu bestimmen.

Aus Formel (41) erhalten wir sofort

$$We^m \cdot e^n (e-1) = Re^n - R$$

oder

$$R = Re^n - We^m \cdot e^n (e-1)$$

$$= [R - We^m (e-1)] e^n$$

und hieraus

$$e^n = \frac{R}{R - We^m (e-1)} \dots (47).$$

Nehmen wir beiderseits die Logarithmen, so erhalten wir

$$\begin{aligned} n \log e &= \log \frac{R}{R - We^m (e-1)} \\ &= \log R - \log [R - We^m (e-1)] \end{aligned}$$

und endlich

$$n = \frac{\log R - \log [R - We^m (e-1)]}{\log e} \dots (48).$$

Dies ist die Formel für die logarithmische Berechnung des Werthes von n . Man wird jedoch in den meisten Fällen auch die Tafel IV. zur Berechnung benutzen können und zwar mit Zugrundelegung der sich aus (43) sofort ergebenden Formel

$$\frac{We^m}{R} = w = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} \dots (49).$$

Da nämlich Tafel IV. die Werthe von w für verschiedene Procentsätze enthält, so wird man den mit Hülfe von Taf. I. berechneten Werth von $\frac{We^m}{R}$ in der zu den gegebenen Procenten gehörigen Vertikalspalte der Taf. IV. aufsuchen. Finden sich nun in dieser Spalte zwei Zahlenwerthe, zwischen welche der gesuchte Werth fällt, so fällt auch die gesuchte Anzahl der Jahre zwischen die beiden in der ersten Vertikalspalte stehenden Zahlen.

Endlich kann man auch die Berechnung blos mit Hülfe der Taf. I. ausführen, wenn man die Formel (47) zu Grunde legt. Man hat dann zunächst den Ausdruck

$$We^m(e - 1)$$

mit Hülfe von Taf. I. zu berechnen, den gefundenen Werth von R abzuziehen und mit dem Reste in R zu dividiren. Die gefundene Zahl sucht man dann in der zu den gegebenen Procenten gehörigen Vertikalspalte der Taf. I. und verfährt im Uebrigen ebenso, wie vorher bei Taf. IV. angegeben wurde. Wir werden zur Erläuterung ein Beispiel auf alle drei verschiedene Arten berechnen.

44. Beispiel.

Wer beim Janus in Hamburg in seinem zurückgelegten 50. Lebensjahre die Summe von 99 Thlr. einlegt, dem wird vom 55. Jahre ab bis zum Tode alljährlich eine Pension von 10 Thlr. gewährt. Was nimmt die Gesellschaft bei dieser Versicherung als muthmaassliches Todesjahr des Versicherten an, wenn $3\frac{1}{2}\%$ berechnet werden?

A. Lösung durch logarithmische Berechnung.

Es ist hier $W = 99$, $R = 10$, $m = 5$ und $e = 1,035$. Setzen wir diese Werthe in Formel (48) ein, so erhalten wir

$$n = \frac{\log 10 - \log(10 - 99 \cdot 1,035^5 \cdot 0,035)}{\log 1,035}.$$

Berechnen wir zuerst den Ausdruck

$$99 \cdot 1,035^5 \cdot 0,035,$$

so haben wir

$$\begin{array}{rcl} \log 1,035 & = & 0,0149403 \\ \log 1,035^5 & = & 0,0747015 \\ \log 99 & = & 1,9956352 \\ \log 0,035 & = & 0,5440680 - 2 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \log 1,035 \\ \log 1,035^5 \\ \log 99 \\ \log 0,035 \end{array}} \right\} \text{addirt}$$

$$0,6144047.$$

Durch Zurückschlagen finden wir

$$99 \cdot 1,035^5 \cdot 0,035 = 4,11533.$$

Dies abgezogen von 10,00000

$$4,11533$$

gibt 5,88467;

es bleibt somit noch zu berechnen

$$n = \frac{\log 10 - \log 5,88467}{\log 1,035}.$$

$$\begin{array}{rcl} \log 10 & = & 1,0000000 \\ \log 5,88467 & = & 0,7697221 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \log 10 \\ \log 5,88467 \end{array}} \right\} \text{subtrahirt}$$

$$0,2302779.$$

Dividiren wir in diese Zahl mit

$$\log 1,035 = 0,0149403,$$

so erhalten wir endlich

$$\begin{aligned} n &= \frac{0,2302779}{0,0149403} \\ &= \frac{2302779}{149303} \\ &= 15,4. \end{aligned}$$

Die Gesellschaft nimmt also an, der Rentenkäufer werde c. 71 Jahre alt werden.

B. Lösung mit Hülfe der Tafel I. und IV.

Setzen wir die vorher angegebenen Werthe in Formel (49), so erhalten wir

$$\frac{99 \cdot 1,035^5}{10} = \frac{1,035^n - 1}{0,035 \cdot 1,035^n}.$$

Berechnen wir zunächst die linke Seite, so ist nach Taf. I.

$$1,035^5 = 1,187686.$$

Dies mit 99 multiplicirt giebt

117,5810,
wovon der 10te Theil

11,75810

ist. Wir haben somit

$$11,75810 = \frac{1,035^n - 1}{0,035 \cdot 1,035^n}.$$

Jetzt suchen wir die Zahl

11,75810

in der zu $3\frac{1}{2}\%$ gehörigen Vertikalspalte der Taf. IV. und finden daselbst die einschliessenden Zahlenwerthe

11,517 . . . und 12,094₂ . . . ,

wozu die Jahre 15 und 16 gehören.

Das gesuchte n liegt also zwischen 15 und 16.

C. Lösung mit Hülfe der Tafel I. allein.

Wir haben hier die Formel (47) zu benutzen und erhalten nach Einsetzung der betreffenden Werthe in dieselbe

$$1,035^n = \frac{10}{10 - 99 \cdot 1,035^5 \cdot 0,035}.$$

Nach Tafel I. ist

$$1,035^5 = 1,187686,$$

dies mit 99 multiplicirt giebt

117,5810

und dieses noch mit 0,035 multiplicirt giebt

4,11534.

Nun ist

$$\begin{array}{r} 10,00000 \\ 4,11534 \\ \hline 5,88466 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 10,00000 \\ 4,11534 \\ \hline 5,88466 \end{array}} \right\} \text{subtrahirt,}$$

folglich

$$\begin{aligned} 1,035^n &= \frac{10}{5,88466} \\ &= 1,69 \dots \end{aligned}$$

Suchen wir diese Zahl unter $3\frac{1}{2}\%$ in Tafel I. auf, so finden wir als einschliessende Zahlenwerthe

1,67 . . . und 1,73 . . . ,

wozu wieder die Jahre 15 und 16 gehören.

Anmerkung. Noch rascher kann man zum Ziele kommen, wenn man zuletzt die Taf. II. benutzt. Wir hatten nämlich

$$1,035^n = \frac{10}{5,88466},$$

folglich ist

$$\frac{1}{1,035^n} = 0,588466.$$

Suchen wir die rechts stehende Zahl unter $3\frac{1}{2}\%$ in Taf. II. auf, so finden wir die einschliessenden Zahlen

0,596... und 0,576...

zu denen ebenfalls die Jahre 15 und 16 gehören.

§. 25.

Berechnung des Zinsfusses.

Die direkte Berechnung des Zinsfusses führt auch hier auf die Lösung einer algebraischen Gleichung. Suchen wir mit Umgehung derselben nach einem praktischen Verfahren, so zeigt sich, dass der früher eingeschlagene Weg der angenäherten Berechnung mit Hülfe der Tafeln sich hier nicht anwenden lässt und dass man im Allgemeinen zur Annahme gewisser Procentsätze behufs der immer engeren und engeren Einschliessung keinen Anhaltspunkt hat. Man wird also hier in den Fall gerathen können, erst durch viele vorgängige Procentsubstitutionen zum Ziele zu gelangen. Glücklicherweise macht aber auch die Praxis dergleichen Berechnungen gewiss nur sehr selten nöthig. Die Banken nämlich haben wohl immer für vereinnahmte Gelder einen feststehenden Procentsatz und kann es sich also nur noch darum handeln, wie viel Procente sie für verausgabte Gelder nehmen. Blicken wir nun auf §. 21. zurück, so sehen wir, dass

$$A = W \cdot e^{m+n}$$

die Leistung des Rentenkäufers ist. Da diese Leistung in die Kasse der Bank fliesst, so wird sie eben nach dem feststehenden Procentsatze der Bank zu bemessen sein. Die Leistung der Bank hingegen wird ausgedrückt durch

$$B = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1},$$

folglich wird der hier angenommene Zinsfuss der fragliche sein. Der Werth von e in A ist demnach ein gegebener,

während der Werth des e in B eben gesucht wird. Um Verwechselung zu verhüten, wollen wir das erstere mit dem griechischen Buchstaben ε (*epsilon*) bezeichnen, so dass unsere Formel jetzt nun folgende ist:

$$W\varepsilon^{m+n} = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1}.$$

Da hier die linke Seite vollständig berechnet werden kann, so fällt die Formel mit der im zweiten Kapitel aufgestellten

$$S = C \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1}$$

zusammen.

III. Früher beginnende nachschussweise Zeitrenten. Sofort beginnende vorschussweise Zeitrenten.

§. 26.

Theorie der Rechnung.

Fassen wir zunächst den ersten Satz der Ueberschrift ins Auge, so können wir uns die Aufgabe stellen:

Jemand kauft sich eine nachschussweise Rente R auf n Jahre, will jedoch das Aequivalent W für dieselbe erst abtragen, nachdem er bereits die Rente m Jahre hinter einander genossen hat. Wie viel wird das Aequivalent oder die Kaufsumme betragen, wenn p % Zinsen berechnet werden?

In diesem Falle hat die Bank nur $(n - m)$ Jahre den Zinsengenuss von der Kaufsumme W und es beträgt also die Gesamtleistung des Rentenkäufers

$$A = W e^{n-m}.$$

Der Rentenirer hingegen bezieht die Rente die vollen n Jahre lang, mithin beträgt die Leistung der Rentenbank

$$B = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1}.$$

Da $A = B$ sein muss, so erhalten wir als Berechnungsformel

$$W \cdot e^{n-m} = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1} \dots (50);$$

oder auch, da

$$e^{n-m} = \frac{e^n}{e^m}$$

ist,

$$\frac{W \cdot e^n}{e^m} = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1} \dots (51).$$

Wird nun, wie in der vorher gestellten Aufgabe, W gesucht, hat man

$$W = R \cdot \frac{(e^n - 1) e^m}{(e - 1) e^n} \dots (52).$$

§. 27.

Berechnung der Kaufsumme.

Ist W gesucht, so wird man den Ausdruck

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1) e^n} = w$$

mittelst der Taf. IV. und

$$e^m = v$$

mittelst der Taf. I. bestimmen und darauf das Produkt $R \cdot w \cdot v$ bilden, welches dem gesuchten Werthe W gleich sein muss.

45. Beispiel.

Jemand will sich in seinem 20. Jahre eine nachschussweise Rente im Betrage von 200 Thlr. auf 30 Jahre kaufen, kommt aber erst nach erreichtem 24. Lebensjahre in den Besitz seines Vermögens; wie viel wird er zu dieser Zeit für die Rente geben müssen, wenn 4% Zinsen berechnet werden?

Es ist hier $R = 200$, $m = 4$, $n = 30$, $e = 1,04$ und W wird gesucht, wir haben demnach

$$w = \frac{1,04^{30} - 1}{0,04 \cdot 1,04^{30}}$$

und

$$v = 1,04^4.$$

Aus Tafel IV. finden wir

$$w = 17,2920333$$

und aus Tafel I.

$$v = 1,169859,$$

folglich

$$W = 200 \cdot 17,2920333 \cdot 1,169859.$$

Wählen wir die Berechnung durch Logarithmen, so haben wir

$$\log 200 = 2,3010300$$

$$\log 17,292.. = 1,2378459$$

$$\log 1,169859 = 0,0681335$$

$$\log W = 3,6070094$$

$$W = 4045,8 \dots$$

Die Kaufsumme würde also c.

$$4045 \text{ Thlr. } 24 \text{ Sgr.}$$

betragen.

§. 28.

Berechnung der jährlichen Zahlung.

Wir sahen vorher, dass

$$W = R \cdot v \cdot w,$$

und zwar

$$v = e^m$$

und

$$w = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n}$$

war. Es geht hieraus hervor, dass

$$R = \frac{W}{v \cdot w}$$

ist. Um demnach R zu berechnen, kann man v in Taf. I. und w in Tafel IV. suchen und mit dem Produkte beider Werthe in W dividiren; besser wird man aber thun, wenn man, statt mit v zu dividiren, mit

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{e^m}$$

multiplicirt; und da Taf. II. die Werthe von $\frac{1}{e^m}$ enthält, so wird man in folgender Weise rechnen: man sucht den Werth von $\frac{1}{e^m}$ in Taf. II., multiplicirt damit W und dividirt das Produkt durch den in Taf. IV. gefundenen Werth für w .

46. B e i s p i e l.

Jemand kauft ein Grundstück für 5000 Thlr. unter der Bedingung, diese Summe nach 5 Jahren einzuzahlen; später einigen sich beide Theile dahin, dass der Käufer seine Schuld binnen 10 Jahren durch alljährliche gleiche Raten tilgen soll. Wie viel hat er bei 5 % Zinsen alljährlich abzutragen, wenn die Leistung durch Theilzahlungen der in einer Summe ganz gleich sein soll?

Es ist in diesem Falle

$W = 5000$, $m = 5$, $n = 10$, $e = 1,05$,
folglich

$$v = 1,05^5$$

$$\text{und } w = \frac{1,05^{10} - 1}{0,05 \cdot 1,05^{10}}.$$

Wir finden in Taf. II. den umgekehrten Werth von v , oder

$$\frac{1}{1,05^5} = 0,7835262,$$

Dies mit 5000 multiplicirt, giebt:

$$3917,6310.$$

Dieser Werth ist noch zu dividiren durch w . Wir finden dies in Taf. IV., nämlich

$$w = 7,7217349.$$

Es ist mithin

$$R = \frac{3917,6310}{7,7217349}$$

$$= 507,3..$$

Eine jährliche Abzahlung im Betrage von c. 507 Thlr. 9 Sgr. wird also der Zahlung in einer Summe gleich kommen.

§. 29.

Berechnung der Dauer der jährlichen Zahlung.

Aus Formel (51) erhalten wir

$$\frac{W}{e^m \cdot R} = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^m} \dots \quad (53).$$

Um mittelst dieser Formel n zu berechnen, haben wir zunächst mit Hülfe der Taf. II. die linke Seite zu berechnen

und dann den gefundenen Werth in der zu den gegebenen Procenten gehörigen Vertikalspalte der Tat. IV. aufzusuchen. Die gesuchte Zeitdauer fällt dann zwischen die zu den einschliessenden Zahlenwerthe der genannten Spalte gehörigen Jahre.

47. B e i s p i e l.

Auf wie lange kann Jemandem von dessen 26. Jahre an eine Rente von 400 Thlr. gewährt werden für eine Summe von 7000 Thlr., wenn der Rentenkäufer letztere Summe erst im 32. Jahre zu zahlen im Stande ist und $3\frac{1}{2}\%$ Zinsen berechnet werden?

Wir haben hier $W = 7000$, $R = 400$, $m = 6$ und $e = 1,035$, folglich nach Einsetzung dieser Werthe in (53)

$$\frac{7000}{1,035^6 \cdot 400} = \frac{1,035^n - 1}{0,035 \cdot 1,035^n}.$$

Aus Taf. II. finden wir

$$\frac{1}{1,035^6} = 0,8135006,$$

die linke Seite der vorigen Gleichung ist demnach

$$\frac{7000 \cdot 0,8135006}{400} = \frac{70 \cdot 0,8135006}{4} = 14,23626.$$

Suchen wir diesen Werth in der zu $3\frac{1}{2}\%$ gehörigen Vertikalspalte, so finden wir als einschliessende Werthe

14,2124033 und 14,6979742,

wozu die Jahre 20 und 21 gehören. Die Rente kann demnach fast genau 20 Jahre, d. h. also bis zum 46. Lebensjahre des Rentenkäufers gezahlt werden.

§. 30.

Schlussbemerkung.

Es ist jetzt leicht zu übersehen, dass die bis jetzt noch nicht betrachteten sofort beginnenden vorschussweisen Renten mit in die Klasse der früher beginnenden nachschussweisen Renten gerechnet werden können. Da nämlich bei ersteren die Zahlung am Anfange des Jahres erfolgt, so ist sie ein Jahr früher als die bei der nachschussweisen Rente und es ist in der Formel (51) nur $m=1$ zu setzen, so dass wir erhalten

$$\frac{W \cdot e^n}{e} = R \cdot \frac{e^n - 1}{e - 1}$$

$$\text{oder } \frac{W}{e} = R \cdot \frac{e^n - 1}{(e - 1) e^n} \dots (54).$$

Ein Beispiel möge für diese Renten genügen.

48. B e i s p i e l.

Welche vorschussweise Rente kann auf 15 Jahre für eine Kaufsumme von 2750 Thlr. gewährt werden, wenn 4 % berechnet werden?

Wir haben hier $W = 2750$, $e = 1,04$, $n = 15$. Setzen wir wieder

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1) e^n} = w,$$

so erhalten wir aus (54)

$$\frac{W}{e \cdot w} = R.$$

Wir haben also durch 2750 durch $e \cdot w$ zu dividiren. Statt mit e zu dividiren, könnten wir wieder mit dem aus Taf. II. zu ersehenden Werthe

$$\frac{1}{e} = \frac{1}{1,04} = 0,9615385$$

multipliciren und das Produkt durch den aus Taf. IV. zu findenden Werth von w dividiren. Es ist jedoch hier bequemer den Werth von

$$w = 11,1183874$$

mit 1,04 zu multipliciren und mit dem Produkte

$$1,04 \cdot 11,1183874 = 11,5631229$$

in


$$W = 2750$$

zu dividiren. Wir erhalten hierdurch

$$R = \frac{2750}{11,5631229}$$

$$= 237,83 \dots$$

Es kann mithin eine jährliche Rente von c. 237 Thlr. 25 Sgr. gewährt werden.



Fünftes Kapitel.

Rentenerwerbung durch Partialeinzahlungen. — Pensionsrechnung.

§. 31.

Theorie dieser Rechnung.

Die Erwerbung einer Rente kann ausser durch Zahlung der Mise in einer Summe auch durch vorgängige Partialeinzahlungen erfolgen. In Bezug auf die letztere Versicherungsart, mit der wir uns im Folgenden beschäftigen wollen, setzen wir den Fall:

Jemand zahlt an eine Bank alljährlich m Jahre hinter einander pränumerando C Thlr. ein, um sich dadurch eine im k ten Jahre nach der letzten Einzahlung beginnende vor-schussweise Rente R auf n Jahre zu erwerben. Die Bank berechnet für vereinnahmte Gelder π (ausgesprochen p_i) und für verausgabte p ‰.

Um hier die Berechnungsformel zu finden, haben wir wieder zu untersuchen, was beide Parteien nach Auszahlung der letzten Rente geleistet haben. Durch Gleichsetzung dieser Leistungen werden wir in den Besitz der gewünschten Formel gelangen. Setzen wir

$$\frac{\pi + 100}{100} = \epsilon$$

und

$$\frac{p + 100}{100} = e,$$

so hat zunächst der Rentenkäufer durch seine m malige Einzahlung der Summe C geleistet,

$$A = C \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1}.$$

Diese Summe ist dann die k Jahre bis zum Beginn der Rente und ausserdem noch die n Jahre während des Renten-
genusses in den Händen der Bank geblieben und dadurch an-
gewachsen zu

$$A\varepsilon^k \cdot \varepsilon^n \text{ oder } A\varepsilon^{k+n} = C \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^{k+n} = B.$$

Der Werth von B ist also die Gesamtleistung des Renten-
käufers.

Die Bank hingegen gewährt dafür n Jahre lang pränu-
merando die Rente R und leistet deshalb in Summa

$$R \cdot \frac{e(e^n - 1)}{e - 1} = C.$$

Setzen wir $C = B$, so erhalten wir

$$C \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^{k+n} = R \cdot \frac{e(e^n - 1)}{e - 1} \dots (55).$$

Dies ist die Formel, nach der wir zu rechnen haben.

§. 32.

In voriger Formel ist auch die für Pensionsrechnung mit
enthalten. Es ist hier nur der einzige Unterschied, dass die
Pensionsauszahlung sofort nach Einzahlung des letzten Bei-
trags erfolgt. Wird nämlich Jemand pensionirt, so ist er von
den bis dahin gezahlten Beiträgen entbunden und tritt sofort
in den Genuss seiner Pension. Es ist somit hier blos $k = 0$
zu setzen, wodurch also die Formel (55) sich in folgende
umändert:

$$C \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^n = R \cdot \frac{e(e^n - 1)}{e - 1} \dots (56).$$

§. 33.

Bestimmung der jährlichen Einzahlung.

49. Beispiel.

*Es will Jemand von seinem 25sten Jahre ab 15 Jahre
hinter einander am Anfange jedes Jahres eine bestimmte Summe
an eine Bank einzahlen, um sich eine vom 55. Jahre an be-
ginnende Rente von 100 Thaler auf 20 Jahre zu sichern.*

Wie viel wird die jährliche Einzahlung betragen müssen, wenn die Bank vereinnahmte Gelder mit 3 und verausgabte mit 4 % berechnet?

Wir haben hier $R = 100$, $\varepsilon = 1,03$, $e = 1,04$, $m = 15$, $k = 15$, $n = 20$, und C ist gesucht. Aus (55) erhalten wir

$$C = R \cdot \frac{\frac{e(e^n - 1)}{e - 1}}{\frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1}} \cdot \frac{1}{\varepsilon^{k+n}} \dots \quad (57),$$

oder wenn wir der Kürze halber

$$\frac{e(e^n - 1)}{e - 1} = u$$

$$\frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} = v$$

$$\text{und } \frac{1}{\varepsilon^{k+n}} = w$$

setzen,

$$C = \frac{R \cdot u \cdot w}{v} \dots \quad (58).$$

Die Werthe von u und v werden in Taf. III. und der von w in Taf. II. gefunden. Wir finden nämlich in unserem Falle

$$u = \frac{104(1,04^{20} - 1)}{0,04} = 30,969202,$$

$$v = \frac{1,03(1,03^{15} - 1)}{0,03} = 19,156881,$$

$$w = \frac{1}{1,03^{35}} = 0,3553834.$$

Setzen wir diese Werthe in (58) ein, so erhalten wir, da $R = 100$ ist

$$C = \frac{100 \cdot 30,969202 \cdot 0,3553834}{19,156881},$$

ausgerechnet

$$C = 57,45 \dots$$

Die jährliche Einzahlung beträgt demnach c. 57 Thl. 13 Sgr. 6 Pf.

50. Beispiel.

Wenn sich durch Erfahrung herausgestellt hätte, dass die Personen einer Beamtenklasse im Allgemeinen im 50sten Jahre dienstunfähig würden und im 55sten mit Tode abgingen, welchen Beitrag müsste dann ein Pensionsinstitut von einem im 30sten Jahre stehenden Beitretenden alljährlich nehmen, um ihm für die Zeit seiner Dienstunfähigkeit eine Pension von 200 Thlr. zu sichern, wenn bei vereinnahmten Geldern $3\frac{1}{2}\%$ und bei verausgabten 4% Zinsen berechnet werden?

Wir haben hier $R = 200$, $\varepsilon = 1,035$, $e = 1,04$, $m = 20$, $n = 5$. Durch Einsetzung dieser Werthe in (56) erhalten wir

$$C = \frac{1,035 (1,035^{20} - 1)}{0,035} \cdot 1,035^5 = \frac{200 \cdot 1,04 (1,04^5 - 1)}{0,04}$$

oder wenn wir

$$\frac{1,04 (1,04^5 - 1)}{0,04} = u$$

$$\frac{1,035 (1,035^{20} - 1)}{0,035} = v$$

$$\text{und } \frac{1}{1,035^5} = w \text{ setzen,}$$

$$C = \frac{200 \cdot u \cdot w}{v}.$$

Wir finden in Taf. III.

$$u = 5,632975$$

$$v = 29,269471$$

und in Tafel II.

$$w = 0,8419732,$$

es ist also

$$C = \frac{200 \cdot 5,632975 \cdot 0,841973}{29,269471}$$

ausgerechnet

$$C = 32,408...$$

Der Pensionsbeitrag müsste dann ziemlich $32\frac{1}{2}$ Thlr. betragen.

§. 34.

Bestimmung der Rente oder Pension.

Aus der Formel (55) erhalten wir

$$R = C \cdot \frac{\frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^{k+n}}{\frac{e (e^n - 1)}{e - 1}} \dots (59)$$

oder wenn wir wieder

$$\frac{e (e^n - 1)}{e - 1} = u$$

$$\frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} = v,$$

hingegen $\varepsilon^{k+n} = w$ setzen,

$$R = C \cdot \frac{v \cdot w}{u} \dots (60).$$

Die Werthe von v und w werden wieder mittelst der Taf. III. gefunden, hingegen w mittelst der Taf. I.

51. B e i s p i e l.

Jemand zahlt 20 Jahre hinter einander alljährlich 15 Thlr. in eine Rentenbank, um vom 10ten Jahre nach der letzten Einzahlung ab sich auf 16 Jahre eine Rente zu sichern. — Welche Rente wird die Bank geben können, wenn sie vereinnahmte Gelder mit $3\frac{1}{2}\%$ und verausgabte mit $4\frac{1}{2}\%$ berechnet?

Es ist hier $C = 15$, $m = 20$, $k = 10$, $n = 16$, $e = 1,045$, $\varepsilon = 1,035$.

Indem wir nach Formel (60) rechnen, haben wir nach Taf. III.

$$u = \frac{1,045 (1,045^{16} - 1)}{0,045} = 23,741707$$

$$\text{und } v = \frac{1,035 (1,035^{20} - 1)}{0,035} = 29,269471$$

und nach Taf. I.

$$w = 1,035^{26} = 2,445959,$$

mithin

$$R = \frac{15.29,269471.2,445959}{23,741707},$$

ausgerechnet

$$C = 45,23 \dots$$

Die Bank wird also eine Rente von c. 45 Thlr. 7 Sgr. geben können.

52. B e i s p i e l.

Ich habe vom 28. Lebensjahre an jährlich einen Pensionsbeitrag von 6 Thlr. 24 Sgr. an die preuss. Beamten-Pensions-Kasse gezahlt; gesetzt nun ich würde im 58. Jahre pensionirt und stürbe im 65sten, auf welche Pension würde ich dann nach meinen Beiträgen einen Anspruch gehabt haben, wenn die Pensionskasse durchweg 4 % berechnet?

Es ist in diesem Falle

$$C = 6,8, \quad m = 30, \quad n = 7, \quad \varepsilon = e = 1,04.$$

Wir rechnen auch hier nach Formel (60), wo aber

$$u = \frac{1,04(1,04^7 - 1)}{0,04}$$

$$v = \frac{1,04(1,04^{30} - 1)}{0,04}$$

und weil $k = 0$ ist,

$$w = 1,04^7$$

ist. Aus Taf. III. finden wir

$$u = 8,214226,$$

$$v = 58,328335$$

und aus Taf. I.

$$w = 1,315932,$$

also

$$R = \frac{6,8.58,328335.1,315932}{8,214226},$$

ausgerechnet

$$R = 63,54.$$

Ich würde also nur einen Anspruch auf eine Pension von c. 63 Thlr. 16 Sgr. gehabt haben.

Bei diesem Beispiele lässt sich auch noch eine andere Berechnungsart anwenden, die wir der Uebung wegen im folgenden noch mittheilen wollen. Gehen wir nämlich auf Formel (56) zurück, so erhalten wir, weil $\varepsilon = e$ ist,

$$C \cdot \frac{e(e^m - 1)}{e - 1} \cdot e^n = R \cdot \frac{e(e^n - 1)}{e - 1},$$

und hieraus

$$R = \frac{C \cdot \frac{e(e^m - 1)}{e - 1} \cdot \frac{1}{e}}{\frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n}}$$

oder wenn wir

$$\frac{e(e^m - 1)}{e - 1} = x$$

$$\frac{1}{e} = y$$

$$\text{und } \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} = z$$

setzen,

$$R = \frac{C \cdot x \cdot y}{z}$$

Wir finden nun in Taf. III.

$$x = 58,328335$$

und in Taf. II.

$$y = 0,961538$$

und endlich in Taf. IV.

$$z = 6,0020547.$$

Wir haben somit

$$R = \frac{6,8 \cdot 58,328335 \cdot 0,961538}{6,0020547},$$

was ausgerechnet denselben Werth für R giebt, als wir vorher fanden.

§. 35.

Bestimmung der Dauer des Renten- oder Pensionsgenusses.

Ist in der Formel (55) der Werth von n unbekannt, so erfordert die direkte Auffindung dieses Werthes die Auflösung einer sogenannten transcendenten Gleichung, wofür die Mathematik keine allgemeine Regel kennt. Durch einen kleinen Kunstgriff gelangt man jedoch auch hier leicht indirekt zum Ziele. Gehen wir nämlich auf unsere Grundformel

$$C \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^k \cdot \varepsilon^n = R \cdot \frac{e (e^n - 1)}{e - 1}$$

zurück, so können wir dieselbe, wenn wir den Faktor ε^n durch Division auf die rechte und den Faktor e ebenso auf die linke Seite bringen, auch so schreiben

$$C \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^k \cdot \frac{1}{e} = R \cdot \frac{e^n - 1}{(e - 1) \varepsilon^n} \cdot$$

Nehmen wir nun an, dass ε kleiner als e sei, so würden wir, wenn wir auf der rechten Seite statt ε auch e setzten, ein zu grosses n bekommen. Wir hätten nämlich angenommen, dass die Rentenbank dem Einleger seine Leistungen während der Dauer des Rentengenusses mit höheren Procenten anrechnete, was natürlich wegen der dadurch vergrösserten Leistung auch einen längeren Rentengenuss nach sich ziehen würde. Wären wir aber im Stande dieses allerdings etwas zu grosse n zu bestimmen, so hätten wir wenigstens einen Ausgangspunkt gefunden, von dem aus wir durch allmälige Verminderung des n dem wahren Werthe immer näher und näher kommen könnten. In der That lässt sich aber das durch die vorige Annahme etwas vergrösserte n ohne Schwierigkeit finden. Die vorige Formel geht nämlich unter der gemachten Voraussetzung über in

$$\frac{C}{R} \cdot \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^k \cdot \frac{1}{e} = \frac{e^n - 1}{(e - 1) e^n} \cdot \cdot \cdot (61),$$

worin die Ausdrücke

$$u = \frac{\varepsilon (\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \quad \text{nach Taf. III.}$$

$$v = \varepsilon^k \quad \text{nach Taf. I.}$$

$$w = \frac{1}{e} \quad \text{nach Taf. II.}$$

und endlich das n in dem Ausdrucke

$$\frac{e^n - 1}{(e - 1) e^n} \quad \text{nach Taf. IV.}$$

gefunden werden können.

53. B e i s p i e l.

Jemand zahlt 8 Jahre lang zu Anfange jedes Jahres 50 Thlr. in eine Rentenbank, um sich dadurch eine jährliche

vorschussweise Rente von 100 Thlr. zu erwerben, welche 5 Jahre nach der letzten Einzahlung beginnt. Auf wie viel Jahre kann die Bank besagte Rente gewähren, wenn sie vereinnahmte Gelder mit 3, hingegen verausgabte mit 4 % berechnet?

Wir haben in diesem Falle $C = 50$, $R = 100$, also

$$\frac{C}{R} = \frac{1}{2} = 0,5, \quad \varepsilon = 1,03, \quad e = 1,04, \quad m = 8, \quad k = 5$$

und n ist gesucht. Wir finden nun aus Taf. III.

$$u = 9,159106,$$

aus Taf. I.

$$v = 1,159274$$

und aus Taf. H.

$$w = 0,9615385.$$

Setzen wir diese Werthe in Formel (61) ein, so erhalten wir

$$0,5 \cdot 9,159106 \cdot 1,159274 \cdot 0,9615385$$

$$= \frac{1,04^n - 1}{0,04 \cdot 1,04^n}.$$

Die Ausrechnung der linken Seite ergiebt

$$5,1049 \dots$$

Suchen wir diesen Werth unter 4 % in Taf. IV., so finden wir die einschliessenden Werthe

$$4,4518 \dots \text{ für } n = 5$$

$$\text{und } 5,2421 \dots \text{ für } n = 6.$$

Unter allen Umständen ist nun $n = 6$ zu gross, es fragt sich nur, ob auch $n = 5$ noch zu gross sein wird. Bedenken wir zunächst, dass ein zu grosses n die rechte Seite der Formel (55), welche die Leistung der Rentenbank ausdrückt, zu gross macht, so ersehen wir, dass wir von $n = 6$ so lange zurückgehen müssen, bis die linke Seite besagter Formel einmal grösser als die rechte wird. Setzen wir nun in diese Formel $n = 5$ ein, so ist deren linke Seite nach Taf. III. u. I.

$$0,5 \cdot \frac{1,03(1,03^8 - 1)}{0,03} \cdot 1,03^{10} = 05 \cdot 9,159106 \cdot 1,343916$$

$$= 6,1544 \dots,$$

hingegen die rechte Seite nach Taf. III.

$$\frac{1,04(1,04^5 - 1)}{0,04} = 5,6329..$$

Wir sehen also, dass die linke Seite schon jetzt grösser geworden ist, als die rechte, dass mithin 5 Jahre für die Dauer des Rentengenusses anzunehmen ist.

Ein anderes Verhältniss zwischen ε und e kann eintreten, wenn bei jährlichen Einzahlungen halb-, vierteljährliche oder monatliche Renten erworben werden sollen und bei Einzahlungen die Zinsen alljährlich, bei den Renten hingegen am Schlusse jedes Termins zum Kapitale geschlagen werden. In diesem Falle, wo e die Terminprocente bezeichnet, wird jedoch nicht ε in e , sondern ε^n resp. in e^{2n} , e^{4n} , e^{12n} zu ändern sein, so dass also auch hier in Betreff der Grösse des erlangten n noch das vorige gilt. Auch dafür wollen wir ein Beispiel berechnen.

54. Beispiel.

Jemand zahlt 8 Jahre hinter einander praenummerando 50 Thlr. in eine Rentenbank, auf wie lange wird die Bank eine 5 Jahre nach der letzten Einzahlung beginnende Vierteljahrrente von 25 Thlr. gewähren können, wenn bei den Einzahlungen 3 und den Renten 4 % jährliche Zinsen berechnet werden und bei ersteren alljährlich, bei letzteren allvierteljährlich die Zinsen zum Kapitale geschlagen werden?

Da hier e durch die vierteljährlichen Zinsen berechnet wird, so ändert sich die Formel (55), wie leicht zu sehen, dahin ab, dass auf der rechten Seite $4n$ statt n zu setzen ist. Um nun ein dem vorigen analoges Verfahren in Anwendung bringen zu können, sind wir genöthigt, den Ausdruck ε^n vorläufig $= e^{4n}$ zu setzen, so dass also die Formel (61) übergeht in folgende:

$$\frac{C}{R} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^k \cdot \frac{1}{e} = \frac{e^{4n} - 1}{(e - 1)e^{4n}} \dots (62).$$

Es ist nun in unserem obigen Beispiele $\varepsilon = 1,03$, $e = 1,01$, $C = 50$, $R = 25$, also $\frac{C}{R} = 2$, $m = 8$, $k = 5$ und $4n$ wird gesucht.

Bezeichnen u, v, w dasselbe wie vorher, so finden wir aus den Tafeln III., I. und II. wieder

$$u = 9,159106$$

$$v = 1,159274,$$

$$\text{hingegen } w = 0,9900990.$$

Setzen wir diese Werthe in (62) ein, so erhalten wir

$$2 \cdot 9,159106 \cdot 1,159274 \cdot 0,990099, \text{ ausgerechnet}$$

$$21,029.. = \frac{1,01^{4n} - 1}{0,01 \cdot 1,01^{4n}}.$$

Suchen wir die linke Seite dieser Gleichung in Taf. IV. unter 1%, so finden wir

$$\text{bei 23 Jahren } 20,4558..$$

$$\text{bei 24 Jahren } 21,2433..$$

Hinsichtlich der Dauer des Rentengenusses sind nun offenbar 24 Termine zu viel und es wäre deshalb zunächst auf 23 zurückzugehen. Die anzuwendende Formel würde sein:

$$C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^k \cdot \varepsilon^n = R \frac{e(e^{4n} - 1)}{e - 1}.$$

Es wäre hierin nun $4n = 23$, also $n = 4\frac{3}{4}$ einzusetzen.

Dies geht aber auf der linken Seite deshalb nicht, weil dort nur alljährlich die Zinsen zum Kapitale geschlagen werden, es bleibt uns deshalb nichts weiter übrig, als $\varepsilon^n = 1,03^4$ zu setzen und zu dem gefundenen Werthe die Zinsen von $\frac{3}{4}$ Jahren noch zuzuzählen. Dividiren wir beide Seiten der letzten Formel durch R , so erhalten wir auf der linken Seite

$$\begin{aligned} \frac{C}{R} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^{k+n} &= 2 \cdot \frac{1,03(1,03^8 - 1)}{0,03} \cdot 1,03^9 \\ &= 2 \cdot 9,159106 \cdot 1,304773 \\ &= 23,911. \end{aligned}$$

Wegen der noch fehlenden $\frac{3}{4}$ Jahre sind von letzterem Werthe

$$\text{bei } 4\% \text{ jährlicher Zinsen } 3\% \text{ zu nehmen, also } 23,911 \cdot \frac{3}{100}$$

$= 0,717..$, so dass also die linke Seite der fraglichen Formel, wenn wir sie mit M bezeichnen, jetzt folgenden Werth hat:

$$M = 23,911.. + 0,717.. = 24,628..$$

Die rechte Seite hingegen ist

$$N = \frac{1,01(1,01^{23}-1)}{0,01} \text{ nach Taf. III.} \\ = 25,973 \dots$$

Da die rechte Seite, also die Leistung der Bank immer noch grösser ist, als die linke, die Leistung des Einlegers, so geht daraus hervor, dass $4n = 23$ noch zu gross angenommen ist. Setzen wir deshalb $4n = 22$, so haben wir für die linke Seite, wie leicht zu sehen,

$$M = 23,911 + 23,911 \cdot \frac{2}{100} \text{ (wegen der halbjährigen Zinsen)} \\ = 23,911 + 0,478 \\ = 24,389.$$

$$\text{Hingegen ist } N = \frac{1,01(1,01^{22}-1)}{0,01} = 24,716 \dots$$

Da immer noch N grösser als M ist, so müssen wir noch auf $4n = 21$ zurückgehen. In diesem Falle erhalten wir

$$M = 23,911 + 23,911 \cdot \frac{1}{100} \\ = 23,911 + 0,239 = 24,150 \dots$$

Für die rechte Seite bekommen wir aus Taf. III.

$$N = 23,471 \dots$$

Da jetzt das Grössenverhältniss zwischen M und N umgeschlagen ist, so ist $4n = 21$ die als richtig anzunehmende Zahl und es kann demnach die Vierteljahrrente 21mal bezogen werden.

Anmerkung. Für die Pensionsrechnung ist das Verfahren ganz dasselbe, indem nur der Faktor ϵ^k auf der linken Seite fehlt. Wir halten deshalb die Berechnung eines Beispiels für diesen Fall für überflüssig und wollen statt dessen noch ein Beispiel berechnen, wo die Procente gleich sind.

55. Beispiel.

Jemand legt 8 Jahre hinter einander zu Anfange eines jeden 50 Thlr. in eine Rentenbank, um sich eine 5 Jahre nach der letzten Einlage beginnende Jahrrente von 25 Thlrn. zu sichern. Wie vielmal wird er die Rente beziehen können, wenn durchweg $3\frac{1}{2}\%$ Zinsen berechnet werden?

Wir haben jetzt $\varepsilon = e$, folglich ist

$$C \cdot \frac{e(e^m - 1)}{e - 1} \cdot e^k \cdot e^n = R \cdot \frac{e(e^n - 1)}{e - 1} \dots (63).$$

Um immer mit Hülfe der Tafeln bequem rechnen zu können, schreiben wir

$$\frac{C}{R} \cdot \frac{e(e^m - 1)}{e - 1} \cdot e^{k-1} = \frac{e^n - 1}{(e - 1)e^n} \dots (64) *).$$

In unserem Beispiele ist nun $C=50$, $R=25$, also $\frac{C}{R} = 2$, ferner $e = 1,035$, $m = 8$, $k = 5$, also $k - 1 = 4$ und n ist gesucht.

Nun ist nach Taf. III.

$$\frac{1,035(1,035^8 - 1)}{0,035} = 9,368496$$

und nach Taf. I.

$$1,035^4 = 1,147523.$$

Die linke Seite ist also

$$2 \cdot 9,368496 \cdot 1,147523 = 21,50..$$

Suchen wir diese Zahl in Tafel IV. unter $3\frac{1}{2}\%$, so finden wir die einschliessenden Zahlen

21,35.. für 40 Jahre

und 21,59.. für 41 Jahre.

Die Rente wird also 40mal gezogen werden können.

§. 36.

Procentbestimmung.

In unserer Grundformel

$$C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^{k+n} = R \cdot \frac{e(e^n - 1)}{e - 1}$$

kann entweder ε gegeben und e gesucht, oder e gegeben und ε gesucht sein. Im ersteren Falle hat die Rechnung keine Schwierigkeit, ist aber um so beschwerlicher im zweiten. Glücklicher Weise kommt dieser jedoch wohl nicht leicht vor,

*) Durch Division beider Seiten mit $e \cdot e^n$; es ist nämlich $\frac{e^k}{e} = e^{k-1}$.

da alle Geldinstitute für vereinnahmte Gelder einen feststehenden Procentsatz haben. Wir können uns deshalb hier auch bloß auf den ersteren beschränken. Es ist leicht zu ersehen, dass wenn die linke Seite der Formel

$$\frac{C}{R} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \varepsilon^{k+n} = \frac{e(e^n - 1)}{e - 1}$$

mit Hülfe der Tafeln III. und I. berechnet ist, die Aufsuchung dieses Werthes in der zu den gegebenen n Jahren gehörigen Horizontalreihe der Taf. III. uns — falls die Tafeln ausreichen — im Allgemeinen zu zwei einschliessenden Procentsätzen führen wird.

56. Beispiel.

Wer beim Janus in Hamburg vom 40. Lebensjahre ab alljährlich eine Prämie von 11 Thlr. 10 Sgr. bis zu seinem 50. Jahre zahlt, dem wird von da ab eine halbjährliche Pension von 10 Thlrn. bis zu seinem Tode ausgezahlt. Gesetzt Jemand hätte sich unter diesen Verhältnissen versichert und stürbe in der zweiten Hälfte des 57sten Lebensjahres, wie viel Procente würden die gezahlten Pensionen der Gesellschaft eingetragen haben, wenn vereinnahmte Gelder mit $3\frac{1}{2}\%$ berechnet würden?

Es ist hier $C = 11\frac{1}{2}$, $R = 10$, folglich $\frac{C}{R} = \frac{34}{30}$, ferner $m = 10$, $k = 0$, $n = 7$, $\varepsilon = 1,035$, und e ist gesucht. Da die Pensionen halbjährlich gezahlt werden, so haben wir auf der rechten Seite $n = 2 \cdot 7 = 14$ zu setzen, wo dann das e sich auf die halbjährlichen Zinsen bezieht. Unsere Formel ist somit folgende:

$$\frac{34}{30} \cdot 1,35 \frac{(1,035^{10} - 1)}{0,035} \cdot 1,035^7 = \frac{e(e^{14} - 1)}{e - 1}$$

Nun ist

$$u = \frac{34}{30} = 1,1333..$$

$$v = \frac{1,035(1,035^{10} - 1)}{0,035} = 12,141992 \text{ (nach Taf. III.)}$$

$w = 1,035^7 = 1,272279$ (nach Taf. I.)

Werden die Werthe u , v und w mit einander multiplicirt, so erhalten wir

17,507...,

es ist also

$$\frac{e(e^{14}-1)}{e-1} = 17,507..$$

Suchen wir diese Zahl in der zu $n = 14$ gehörigen Querreihe der Taf. III., so finden wir die einschliessenden Zahlen

17,261781 bei $2\frac{3}{4}\%$

und 17,598914 bei 3% .

Es wird demnach $e = 2\frac{7}{8}\%$ angenommen werden können, so dass die jährlichen Zinsen c. $5\frac{3}{4}\%$ betragen würden.

§. 37.

Schlussbemerkung.

So allgemein die im Bisherigen benutzte Formel (55) auch ist, so kann doch noch unter Umständen eine weitere Verallgemeinerung nöthig werden. Um das, was wir meinen, ins hellste Licht zu stellen, wollen wir gleich ein Beispiel aufstellen.

57. Beispiel.

Jemand wird in seinem 25. Lebensjahre mit einem Gehalte von 800 Thlrn. angestellt unter der Bedingung, beim Eintritte der Dienstunfähigkeit sich eine Pensionirung mit der Hälfte seines Gehaltes gefallen zu lassen. Da dieser Beamte annimmt, dass ungefähr im 55 Jahre seine Pensionirung eintreten möchte und er gleichwohl dann sich ein Einkommen von 600 Thlr. bis zum Tode, den er — um sicher zu gehen — in das 80. Lebensjahr setzt, sichern möchte, so fasst er folgenden Entschluss. Er will von jetzt ab alljährlich bis zum 50sten Jahre praenumerando eine gewisse Summe in eine Sparkasse legen, welche 3% Zinsen berechnet, will das

Geld dort auf sammeln lassen, dann im 50sten Jahre erheben und zu 4 % Zinsen aushun, die dafür ihm alljährlich zufließenden Zinsen wieder der Sparkasse zur Aufsammlung übergeben und endlich für die Gesamttersparniss sich im 55sten Jahre eine Rente von 200 Thalern, zahlbar bis zu seiner angenommenen Todeszeit, bei einer Bank kaufen, welche für vereinnahmte Gelder $3\frac{1}{2}$ % und für verausgabte $4\frac{1}{2}$ % berechnet. Wie viel wird seine jährliche Einlage in die Sparkasse betragen müssen?

Um zu einer allgemeinen Formel zu gelangen, wollen wir die Sparkasseneinlage mit C , die Procente der Sparkasse mit π , die Procente, welche für die dort ersparte Summe beim Ausleihen gewährt werden, mit π' , die Vereinnahmungsprocente der Bank mit p und die Verausgabungsprocente derselben mit p' bezeichnen. Ferner wollen wir

$$\frac{\pi + 100}{100} = \varepsilon,$$

$$\frac{p + 100}{100} = e,$$

$$\frac{p' + 100}{100} = e',$$

setzen und endlich annehmen, die Sparkasseneinlagen würden k Jahre hinter einander gemacht, dann würde die Ersparniss m Jahre ausgethan und dafür n Jahre lang die Rente R bezahlt. —

Zunächst wächst die Sparkasseneinlage an zu

$$A = C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1}.$$

Diese Summe wird dann m Jahre zu π' % ausgethan, gewährt also jährlich eine Einnahme von

$$B = A \cdot \frac{\pi'}{100} = C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{\pi'}{100}.$$

Diese jährlichen Zinsen wachsen in der Sparkasse in m Jahren an zu

$$D = B \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} = C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{\pi'}{100} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1},$$

so dass der Einleger demnach nach Verfluss dieser m Jahre in Summa besitzt

$$\begin{aligned} A + D &= C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} + C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{\pi'}{100} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \\ &= C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} \left(1 + \frac{\pi'}{100} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \right) = M. \end{aligned}$$

Diesen Betrag giebt er an die Bank ab und hat deshalb nach weiteren n Jahren in Summa geleistet

$$S = M \cdot e^n \text{ oder}$$

$$S = C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} \left(1 + \frac{\pi'}{100} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \right) \cdot e^n.$$

Die Gegenleistung der Bank beträgt nun, da diese n Jahre bei $p' \%$ die Rente R pränumerando zahlt:

$$S' = R \cdot \frac{e'(e'^n - 1)}{e' - 1}.$$

Da nun $S = S'$ sein muss, so erhalten wir endlich als Berechnungsformel:

$$C \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^k - 1)}{\varepsilon - 1} \cdot \left(1 + \frac{\pi'}{100} \cdot \frac{\varepsilon(\varepsilon^m - 1)}{\varepsilon - 1} \right) \cdot e^n = R \cdot \frac{e'(e'^n - 1)}{e' - 1} \quad (65).$$

In unserem vorigen Beispiele ist $\varepsilon = 1,03$, $\pi' = 4$, $e = 1,035$, $e' = 1,045$, $k = 25$, $m = 5$, $n = 25$, $R = 200$ und C ist gesucht. Setzen wir diese Werthe in die Formel (65) ein, so erhalten wir

$$\begin{aligned} C \cdot \frac{1,03(1,03^{25} - 1)}{0,03} \left(1 + 0,04 \cdot \frac{1,03(1,03^5 - 1)}{0,03} \right) \cdot 1,035^{25} \\ = 200 \cdot 1,045 \frac{(1,045^{25} - 1)}{0,045}. \end{aligned}$$

Nun ist

$$\frac{1,03(1,03^5 - 1)}{0,03} = 37,553042 \quad (\text{Taf. III.})$$

$$\frac{1,03(1,03^{25} - 1)}{0,03} = 5,468410 \quad (\text{Taf. III.})$$

$$1,035^{25} = 2,363245 \quad (\text{Taf. I.})$$

$$\frac{1,045(1,045^{25} - 1)}{0,045} = 46,570645 \quad (\text{Taf. III.}),$$

folglich haben wir

$$C \cdot 37,553042 \cdot (1 + 0,04 \cdot 5,467410) \cdot 2,363245 \\ = 200 \cdot 46,570645.$$

Berechnen wir zunächst die Klammer auf der linken Seite der Gleichung, so finden wir

$$1 + 0,04 \cdot 5,468410 = 1,218736,$$

und erhalten also nach Einsetzung dieses Werthes

$$C = \frac{200 \cdot 46,570645}{37,553042 \cdot 1,218736 \cdot 2,363245},$$

ausgerechnet

$$C = 86,12..$$

Die jährliche Sparkassen-Einlage müsste demnach c. 86 Thlr. 3 Sgr. 7 Pf. betragen.

Sechstes Kapitel.

Elemente der Wahrscheinlichkeits-Rechnung.

§. 38.

Begriff der mathematischen Wahrscheinlichkeit.

Im gewöhnlichen Leben sagt man, das Eintreffen irgend eines ungewissen Ereignisses sei wahrscheinlich, wenn mehr Gründe dafür als dagegen sprechen, zweifelhaft, wenn ebensoviel Gründe dafür, als dagegen sprechen und endlich unwahrscheinlich, wenn für das Nichteintreffen mehr Gründe sprechen, als für das Eintreffen. Ganz in Uebereinstimmung mit diesen Grundbegriffen wird die mathematische Wahrscheinlichkeit ausgedrückt durch das Verhältniss der dem Eintreffen eines Ereignisses günstigen Fälle zu den überhaupt möglichen Fällen, d. h. also durch einen Bruch, dessen Zähler die Anzahl der günstigen Fälle, und dessen Nenner die Anzahl der überhaupt möglichen Fälle ist. Bezeichnet W die Wahrscheinlichkeit, N die Anzahl der überhaupt möglichen, hingegen n die Anzahl der günstigen Fälle, so ist

$$W = \frac{n}{N}.$$

58. Beispiele.

a) Enthält z. B. ein Gefäss 7 weisse und 3 rothe Kugeln und es wird nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass man beim Herausnehmen einer Kugel eine weisse treffen werde, so ist hier $n = 7$, $N = 10$, also

$$W = \frac{7}{10},$$

hingegen die Wahrscheinlichkeit eine rothe zu treffen,

$$W' = \frac{3}{10}.$$

b) Wären 5 weisse und 5 rothe Kugeln im Gefässe, so wäre die Wahrscheinlichkeit, eine weisse zu treffen,

$$W = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

und die Wahrscheinlichkeit, eine rothe zu treffen, auch

$$W' = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

c) Wären endlich in dem Gefässe blos 10 weisse Kugeln, so würde die Anzahl der dem Ereignisse, eine weisse zu treffen, günstigen Fälle der Zahl der überhaupt möglichen gleich sein, d. h. es wäre dann $n = N = 10$, also

$$W = \frac{10}{10} = 1.$$

Nach den Begriffen des gemeinen Lebens ist es im Falle a) wahrscheinlich eine weisse und unwahrscheinlich eine rothe Kugel zu ziehen, im Falle b) zweifelhaft eine weisse oder eine rothe zu ziehen, im Falle c) gewiss, dass man eine weisse ziehen wird. Mit diesen Begriffen in Uebereinstimmung, sagt man ein Ereigniss sei

unwahrscheinlich, wenn $W < \frac{1}{2}$

zweifelhaft, wenn $W = \frac{1}{2}$

wahrscheinlich, wenn $W > \frac{1}{2}$

und gewiss, wenn $W = 1$ ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereigniss nicht eintreffen werde, nennt man die entgegengesetzte Wahrscheinlichkeit. Sie ergänzt, wie aus dem Vorigen klar geworden ist, die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens zur Gewissheit. — Bezeichnet W die letztere und W' die erstere, so ist

$$W' = 1 - W,$$

oder wenn

$$W = \frac{n}{N}$$

ist, so hat man

$$W' = 1 - \frac{n}{N} = \frac{N - n}{N}.$$

§. 39.

Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens irgend eines unter mehreren Ereignissen, aus den Wahrscheinlichkeiten sämtlicher.

Es sei zunächst

$$W_1 = \frac{n_1}{N_1}$$

die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Ereignisses und

$$W_2 = \frac{n_2}{N_2}$$

die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines anderen, und es werde nach der Wahrscheinlichkeit W gefragt, dass irgend eines von beiden Ereignissen eintreffen werde, so bildet das Zusammentreffen jedes von den n_1 günstigen Fällen beim ersten Ereignisse mit einem der N_2 überhaupt möglichen Fälle beim zweiten Ereignisse einen für die Wahrscheinlichkeit W günstigen Fall. Dies giebt demnach $n_1 \cdot N_2$ günstige Fälle. In gleicher Weise bildet aber auch das Zusammentreffen jedes der n_2 günstigen Fälle beim zweiten Ereignisse mit einem der N_1 überhaupt möglichen Fälle beim ersten Ereignisse wieder einen der Wahrscheinlichkeit W günstigen Fall, so dass zu den vorigen günstigen Fällen noch $n_2 \cdot N_1$ Fälle hinzukommen und in Summa also $n_1 \cdot N_2 + n_2 \cdot N_1$ günstige Fälle vorhanden sind. Es bleibt nun noch die Bestimmung der Anzahl aller möglichen Fälle übrig. Diese Anzahl ist aber offenbar $N_1 \cdot N_2$, weil das Zusammentreffen jedes möglichen Falles des einen Ereignisses mit jedem möglichen Falle des zweiten einen überhaupt möglichen Fall in Bezug auf das Eintreffen irgend eines von beiden Ereignissen bildet. Somit ist denn die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned}
 W &= \frac{n_1 N_2 + n_2 N_1}{N_1 N_2} \\
 &= \frac{n_1 N_2}{N_1 N_2} + \frac{n_2 N_1}{N_1 N_2} \\
 &= \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} \\
 &= W_1 + W_2.
 \end{aligned}$$

Tritt zu dem Ereignisse, dessen Wahrscheinlichkeit W wir so eben bestimmt haben, noch ein drittes Ereigniss mit der Wahrscheinlichkeit W_3 , so ist ganz aus denselben Gründen, wie vorher, die Wahrscheinlichkeit, dass eins von allen drei Ereignissen eintreffen werde

$$W + W_3 = W_1 + W_2 + W_3,$$

wir haben also, wenn wir jetzt W als die Wahrscheinlichkeit betrachten, dass eins von den drei Ereignissen eintreffen werde,

$$W = W_1 + W_2 + W_3.$$

Schliessen wir auf diese Weise weiter, so gelangen wir zu dem allgemeinen Satze:

Sind $W_1, W_2, W_3, W_4, \dots$ die Wahrscheinlichkeiten für ebensoviel Ereignisse und bezeichnet W die Wahrscheinlichkeit, dass eins von denselben eintreffen werde, so ist

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + \dots$$

59. Beispiele.

a) Befinden sich in einem Gefässe 7 weisse, 3 rothe, 5 blaue und 10 grüne, in Summa also 25 Kugeln, so ist die Wahrscheinlichkeit eine weisse zu ziehen

$$W_1 = \frac{7}{25},$$

eine rothe zu ziehen

$$W_2 = \frac{3}{25},$$

eine blaue zu ziehen

$$W_3 = \frac{5}{25}$$

und endlich eine grüne zu ziehen

$$W_4 = \frac{10}{25}.$$

b) Fragen wir jetzt nach der Wahrscheinlichkeit W , dass eine herausgenommene Kugel eine weisse, rothe oder blaue sein werde, so ist

$$\begin{aligned} W &= \frac{7}{25} + \frac{3}{25} + \frac{5}{25} \\ &= \frac{15}{25} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

§. 40.

Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens mehrerer Ereignisse aus den Wahrscheinlichkeiten der letzteren.

Sei wieder zunächst für zwei Ereignisse

$$W_1 = \frac{n_1}{N_1}$$

$$\text{und } W_2 = \frac{n_2}{N_2},$$

so bildet hier nur das Zusammentreffen eines der n_1 günstigen Fälle des ersten Ereignisses mit einem der n_2 günstigen Fälle des zweiten Ereignisses im Allgemeinen einen günstigen Fall für das gleichzeitige Eintreffen beider Ereignisse. Die Zahl der überhaupt günstigen Fälle ist demnach $n_1 \cdot n_2$. Die der überhaupt möglichen, wie vorher, $N_1 \cdot N_2$, folglich ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit

$$W = \frac{n_1 n_2}{N_1 N_2} = W_1 W_2.$$

Ganz in derselben Weise, wie vorher, wird man für mehrere Ereignisse erhalten

$$W = W_1 W_2 W_3 W_4 \dots,$$

so dass wir hier zu folgender allgemeinen Regel gelangen:

Sind $W_1, W_2, W_3, W_4, \dots$ die Wahrscheinlichkeiten für ebensoviel Ereignisse und bezeichnet W die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens sämtlicher Ereignisse, so ist

$$W = W_1 W_2 W_3 W_4 \dots$$

Es folgt von selbst aus dem Bisherigen, dass die vorige Regel auch noch anwendbar bleibt, wenn nach der Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens einzelner von mehreren Ereignissen bei gleichzeitigem Nichteintreffen der übrigen gefragt wird. Sind z. B. $W_1, W_2, W_3, W_4 \dots$ die Wahrscheinlichkeiten des Eintreffens von 5 einzelnen Ereignissen und es wird nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass das 1ste und 3te eintreffen, das 2te und 4te aber nicht eintreffen werde, so ist

W_1 die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des ersten Ereignisses,

$1 - W_2$ die Wahrscheinlichkeit des Nichteintreffens des zweiten Ereignisses,

W_3 die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens des 3ten Ereignisses und

$1 - W_4$ die Wahrscheinlichkeit des Nichteintreffens des vierten Ereignisses; mithin ist die Wahrscheinlichkeit, dass das 1ste und 3te eintreffen, das 2te und 4te hingegen nicht eintreffen werde

$$W = W_1 (1 - W_2) W_3 (1 - W_4).$$

Stellen wir uns zunächst für zwei Ereignisse A und B die möglichen Combinationen zusammen, so ist

$W_1 W_2$ die Wahrscheinlichkeit, dass A und B zugleich eintreffen,

$(1 - W_1) W_2$ die Wahrscheinlichkeit, dass A nicht, wohl aber B eintreffe,

$W_1 (1 - W_2)$ die Wahrscheinlichkeit, dass A eintreffe, B aber nicht,

$(1 - W_1)(1 - W_2)$ die Wahrscheinlichkeit, dass weder A noch B eintreffe,

$1 - (1 - W_1)(1 - W_2)$ die Wahrscheinlichkeit, dass von A und B wenigstens eins eintreffe.

Hieraus ergibt sich leicht der Schluss auf mehr als zwei Ereignisse.

§. 41.

Die mathematische Hoffnung oder die Erwartung.

Handelt es sich um den Werth G eines in Aussicht stehenden, aber noch ungewissen Gewinnes im Betrage S , so hängt derselbe offenbar von der Höhe des Gewinnes und ferner von der Grösse der Wahrscheinlichkeit W des Gewinnens ab. Der Werth wird offenbar der ebensoviele Theil von der zu gewinnenden Summe sein, als die Wahrscheinlichkeit von der Gewissheit 1 ist.

$$\text{Nun ist } W = \frac{n}{N} = \frac{n}{N} \cdot 1, \text{ folglich auch}$$

$$G = \frac{n}{N} \cdot S \text{ oder} \\ = WS.$$

Das Produkt WS wird die mathematische Hoffnung oder die Erwartung genannt.

Um ein Beispiel dafür anzuführen, wollen wir uns folgende Frage vorlegen:

60. B e i s p i e l.

Wenn bei einem Würfelspiele mit 2 Würfeln auf jedem Wurfe, welcher ein Pasch ist, ein Gewinn von 2 R_g. stünde, auf jedem anderen Wurfe aber nichts, wie viel könnte dann der Spielende Einsatz geben?

Untersuchen wir zunächst die Wahrscheinlichkeit einen Pasch zu werfen, so ist die Zahl der günstigen Fälle offenbar gleich 6, denn es sind nur zwei Einsen, zwei Zweien, u. s. f. bis zwei Sechsen möglich. Die Zahl aller möglichen Fälle erhält man hingegen leicht durch die Betrachtung, dass jede Zahl des einen Würfels mit jeder des anderen einen möglichen Fall giebt, was im Ganzen $6 \cdot 6 = 36$ mögliche Fälle ausmacht. Hiernach wäre also

$$W = \frac{6}{36} = \frac{1}{12}$$

$$S = 2 \text{ Thaler,}$$

$$\text{folglich } G = WS = \frac{1}{12} \cdot 2 \text{ Thlr.} = \frac{1}{6} \text{ Thlr.} \\ = 5 \text{ Sgr.}$$



Siebentes Kapitel.

Anwendung der Wahrscheinlichkeits-Rechnung auf Sterblichkeit und Lebensdauer.

§. 42.

Vorbemerkungen über Sterblichkeit.

Durch die, viele Jahre hindurch fortgesetzte, Vergleichung der Sterbelisten verschiedener Orte ist man endlich zu Tabellen gelangt, in welchen sich angegeben findet, wie viele von einer gewissen Anzahl gleichzeitig geborner Personen in dem und dem Alter noch leben. Wir haben am Schlusse in Tafel V. zwei solche Tabellen mitgetheilt, die *Süssmilch-Baumann'sche*, welche namentlich für Nord-Deutschland als allgemeine Sterblichkeits-Tabelle benutzt werden kann, und die *Deparcieux'sche*, welche nach französischen Tontinen (Rentenanstalten) zusammengestellt ist und deshalb namentlich bei solchen Personen benutzt werden kann, die ohne Nahrungssorgen und ohne grosse körperliche Anstrengung ihr Leben verbringen.

§. 43.

Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Alter zu erreichen.

Wir wollen in der Folge durch a_n die Anzahl derjenigen Personen bezeichnen, die von einer gewissen, in der angenommenen Sterblichkeitstafel angegebenen, Anzahl gleichzeitig Geborner in einem Alter von n Jahren noch leben. So wäre nach der *Süssmilch-Baumann'schen* Tafel

$a_0 = 1000, a_5 = 579, a_{50} = 300$, etc.
nach Deparcieux hingegen

$a_0 = 10000, a_5 = 6468, a_{50} = 3964$, etc.

Fragen wir jetzt nach der Wahrscheinlichkeit, mit welcher eine Person von n Jahren das $(n+p)$ te Lebensjahr erreichen werde, so haben wir in einer Sterblichkeitstafel nachzusehen, wie viele von a_n im n ten Lebensjahre stehenden Personen das $(n+p)$ te Lebensjahr erreichen. Ist nun die Anzahl a_{n+p} , so ist a_{n+p} die Anzahl der günstigen Fälle, weil die in Rede stehende Person offenbar noch leben wird, wenn sie eine von den a_{n+p} Personen ist, hingegen ist a_n die Anzahl aller möglichen Fälle, so dass mithin

$$W = \frac{a_{n+p}}{a_n}$$

die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass eine Person von n Jahren das $(n+p)$ te Lebensjahr erreicht. Offenbar ist

$$W' = 1 - \frac{a_{n+p}}{a_n}$$

die entgegengesetzte Wahrscheinlichkeit, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass die in Rede stehende Person das $(n+p)$ te Lebensjahr nicht erreichen werde.

61. Beispiele.

a) Fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit, mit welcher eine 36jährige Person noch 30 Jahre leben, d. h. das 66ste Lebensjahr erreichen werde, so finden wir in der Süssmilch-Baumann'schen Tafel

$a_{36} = 402$ und $a_{66} = 152$,
mithin

$$W = \frac{152}{402} = 0,378 \dots$$

Da hier $W < \frac{1}{2}$ ist, so ist also die Erreichung dieses Alters unwahrscheinlich.

b) Wird für dieselbe Person die Wahrscheinlichkeit gesucht, mit welcher sie das 61. Lebensjahr erreichen werde, so ist

$a_{36} = 402, a_{61} = 201$,

$$\text{folglich } W = \frac{201}{402} = \frac{1}{2}.$$

Da hier die Wahrscheinlichkeit gerade gleich $\frac{1}{2}$ ist, so ist es zweifelhaft, ob die Person das 61ste Jahr erreichen werde oder nicht.

c) Wird endlich für dieselbe Person die Wahrscheinlichkeit gesucht, mit welcher sie das 50ste Jahr erreichen werde, so hat man $a_{50} = 300$, folglich

$$W = \frac{300}{402} = 0,746.$$

Da $0,746 > \frac{1}{2}$, so ist es wahrscheinlich, dass die Person dieses Alter erreichen werde.

§. 44.

Wahrscheinliche Lebensdauer.

Unter der wahrscheinlichen Lebensdauer einer Person versteht man diejenige Anzahl von Jahren, nach deren Verfluss die Wahrscheinlichkeit noch zu leben der Wahrscheinlichkeit zu sterben, d. i. also der entgegengesetzten Wahrscheinlichkeit gleich ist. Bezeichnen wir diese Anzahl Jahre für eine Person von n Jahren mit x , so ist die Wahrscheinlichkeit, nach x Jahren noch zu leben

$$\frac{a_{n+x}}{a_n}$$

und die entgegengesetzte Wahrscheinlichkeit

$$1 - \frac{a_{n+x}}{a_n},$$

setzen wir beide Wahrscheinlichkeiten einander gleich, so erhalten wir

$$\frac{a_{n+x}}{a_n} = 1 - \frac{a_{n+x}}{a_n}$$

$$a_{n+x} = a_n - a_{n+x},$$

$$2a_{n+x} = a_n$$

$$a_{n+x} = \frac{1}{2} a_n.$$

Um demnach die wahrscheinliche Lebensdauer einer Person mittelst der Sterblichkeitstafeln zu finden, suche man die An-

zahl der im n ten Lebensjahre noch Lebenden, nehme davon die Hälfte und suche das Lebensjahr auf, in welchem die Anzahl der noch Lebenden jener Hälfte gleich ist. Die dabei stehenden Jahre geben dann das Alter an, bis zu welchem die Person noch zu leben hoffen darf. Gemeiniglich wird sich die vorerwähnte halbe Anzahl der im n ten Jahre Lebenden in der angewandten Sterblichkeitstafel nicht finden, sondern zwischen zwei auf einander folgende Zahlen fallen. In diesem Falle liegt die Grenze des wahrscheinlichen Lebensalters zwischen den zu den einschliessenden Zahlen gehörigen Jahren. Zur genaueren Bestimmung derselben muss der Weg der sogenannten Interpolation eingeschlagen werden. Wir wählen für beide Fälle ein Beispiel.

62. B e i s p i e l.

Welches ist die wahrscheinliche Lebensdauer einer 36jährigen Person mit Rücksicht auf die Süssmilch-Baumann'sche Sterblichkeitstafel?

Es ist (Tafel V.)

$$a_{36} = 402,$$

folglich

$$\frac{1}{2} a_{36} = 201.$$

Suchen wir 201 unter der Zahl der Lebenden, so finden wir diese Zahl bei dem Alter von 61 Jahren. Es ist also das 61ste Jahr die Grenze der wahrscheinlichen Lebensdauer.

63. B e i s p i e l.

Welches ist die wahrscheinliche Lebensdauer einer 38jährigen Person mit Rücksicht auf die Süssmilch-Baumann'sche Sterblichkeitstafel?

Wir haben hier

$$a_{38} = 388,$$

folglich

$$\frac{1}{2} a_{38} = 194.$$

Suchen wir 194 unter der Zahl der Lebenden (Tafel V.), so finden wir die einschliessenden Zahlen 192 und 201. Es geht hieraus hervor, dass die Grenze der wahrscheinlichen Lebensdauer zwischen dem 61sten und 62sten Lebensjahre

liegt. — Zur genaueren Bestimmung derselben führt folgende Betrachtung. Bis zu der von uns gesuchten Zeit, wo also von 1000 gleichzeitig Gebornen noch 194 leben, sind vom 61. Jahre ab, wo nach der Tafel noch 201 lebten, $201 - 194 = 7$ Personen gestorben. Auf das ganze Jahr (vom 61sten bis 62sten Jahre) kommen in Summa 9 Todte, es bleibt uns also nur übrig, zu ermitteln, in welchem Zeitraume nach diesem Maafsstabe 7 Personen sterben werden. Diesen Zeitraum finden wir nach dem Regeldetri-Exempel:

9 Personen : 3 Personen = 1 Jahr : x Jahren,
woraus man findet

$$x = \frac{7}{9}.$$

Die gesuchte wahrscheinliche Lebensdauer ist demnach $61\frac{7}{9}$ Jahre.

Verschieden von der wahrscheinlichen Lebensdauer ist die

§. 45.

Mittlere Lebensdauer.

Wenn von einer gewissen Anzahl gleichzeitig geborner Personen im n ten Lebensjahre noch a_n ,

im $(n+1)$ ten Lebensjahre noch a_{n+1} ,

„ $(n+2)$ ten „ „ „ a_{n+2} ,

„ $(n+3)$ ten „ „ „ a_{n+3} ,

u. s. f.

leben, so ist die Anzahl Jahre, welche diese a_n Person in Summa durchleben

$$a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4} + \dots *)$$

Es haben nämlich von a_n Personen a_{n+1} das $(n+1)$ te Jahr durchlebt, also jeder 1 Jahr, macht in Summa a_{n+1} Jahre; ferner haben a_{n+2} Personen ein weiteres Jahr durchlebt, mithin alle zusammen a_{n+2} Jahre u. s. f. Um nun zu finden, wie viele von diesen durchlebten Jahren durchschnittlich auf eine der a_n Personen kommen, so haben wir nur mit a_n in die obige Summe zu dividiren, wodurch wir erhalten

*) Die Reihe bricht natürlich mit der Sterblichkeitstafel ab.

$$\frac{a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + a_{n+4} + \dots}{a_n}.$$

Es ist im Bisherigen noch stillschweigend eine Annahme gemacht worden, die füglich nicht gemacht werden darf. — Wenn wir nämlich sagten, von a_n Personen lebten noch a_{n+1} Personen ein weiteres Jahr, so ist das wohl richtig, allein von den inzwischen verstorbenen sind doch auch noch Theile eines Jahres verlebt worden, weil ja nicht alle zu Anfange des $(n+1)$ sten Lebensjahres gestorben sein werden. Man wird am wenigsten irren, wenn man annimmt, dass alle mit Tode abgehenden Personen in der Mitte des Jahres sterben. Bei dieser Annahme wird also noch $\frac{1}{2}$ Jahr als weitere Lebensdauer zuzurechnen sein. Fügen wir deshalb dem obigen Quotienten noch $\frac{1}{2}$ hinzu, so erhalten wir

$$M = \frac{1}{2} + \frac{a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots}{a_n}.$$

Dieser Ausdruck heisst die (fernere) mittlere Lebensdauer einer Person von n Jahren.

64. B e i s p i e l.

Welches ist die mittlere Lebensdauer einer Person von 84 Jahren nach der Süssmilch-Baumann'schen Sterblichkeitstafel?

Es ist $a_{84} = 20$, $a_{85} = 17$, $a_{86} = 14$ u. s. f. (s. Taf. V.) folglich ist

$$M = \frac{1}{2} + \frac{17 + 14 + 12 + 10 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1}{20}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{82}{20} = \frac{1}{2} + \frac{41}{10} = 4,6.$$

Die mittlere Lebensdauer ist also noch 4,6 Jahre.

§. 46.

E h e d a u e r.

Ist bei einem Ehepaare der Mann n , die Frau p Jahre alt, so ist mit Rücksicht auf die frühere Bezeichnung, die Wahrscheinlichkeit, dass beide nach k Jahren noch leben werden (vergl. §. 40.)

$$\frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+k}}{a_p} \dots (a),$$

dass beide zugleich nicht mehr leben werden

$$1 - \frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+k}}{a_p} \dots (b),$$

dass der Mann noch leben, die Frau aber gestorben sein werde

$$\frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \left(1 - \frac{a_{p+k}}{a_p}\right) \dots (c),$$

dass der Mann gestorben sein, die Frau aber noch leben werde

$$\left(1 - \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{p+k}}{a_p} \dots (d),$$

dass beide gestorben sein werden

$$\left(1 - \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \cdot \left(1 - \frac{a_{p+k}}{a_p}\right) \dots (e),$$

endlich dass noch nicht beide gestorben sein werden

$$1 - \left(1 - \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \left(1 - \frac{a_{p+k}}{a_p}\right) \dots (f).$$

65. B e i s p i e l.

Anwendung des Vorigen auf ein Ehepaar, bei welchem der Mann 36, die Frau 29 Jahre alt ist, für die folgenden 20 Lebensjahre.

Es ist hier $n = 36$, $p = 29$, $k = 20$, und mithin nach der Süssmilch-Baumann'schen Tafel

$$a_{36} = 402, \quad a_{29} = 445, \quad a_{36+20} = a_{56} = 246 \text{ und } a_{29+20} = a_{49} = 308,$$

folglich

$$a) \quad \frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+k}}{a_p} = \frac{246}{402} \cdot \frac{308}{445} = 0,423 \dots$$

Da $0,423 < \frac{1}{2}$ ist, so ist es unwahrscheinlich, dass beide Personen nach 20 Jahren noch leben werden.

b) Die entgegengesetzte Wahrscheinlichkeit des Vorigen ist

$$1 - 0,423 = 0,577 \dots$$

Es ist also wahrscheinlich, dass beide zugleich nicht mehr leben werden.

$$\begin{aligned} \text{c) } \frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \left(1 - \frac{a_{p+k}}{a_p}\right) &= \frac{246}{402} \cdot \left(1 - \frac{308}{445}\right) \\ &= \frac{246}{402} \cdot \frac{137}{308} = 0,188... \end{aligned}$$

Dass der Mann noch leben, die Frau aber gestorben sein werde, ist ebenfalls unwahrscheinlich.

$$\begin{aligned} \text{d) } \left(1 - \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{p+k}}{a_p} &= \left(1 - \frac{246}{402}\right) \cdot \frac{308}{445} \\ &= \frac{156}{402} \cdot \frac{308}{445} = 0,269. \end{aligned}$$

Dass der Mann gestorben sein, die Frau aber noch leben werde, ist ebenfalls unwahrscheinlich.

$$\begin{aligned} \text{e) } \left(1 + \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \cdot \left(1 + \frac{a_{p+k}}{a_p}\right) &= \frac{156}{402} \cdot \frac{137}{308} \\ &= 0,1199 .. \end{aligned}$$

Dass keins mehr leben werde, ist ebenfalls unwahrscheinlich.

f) Die entgegengesetzte Wahrscheinlichkeit vom Vorigen ist

$$1 - 0,1199 = 0,8801.$$

Es ist mithin wahrscheinlich, dass noch nicht beide gestorben sein werden, d. h. dass eine von beiden Personen noch leben werde.

§. 47.

Wahrscheinliche Ehedauer.

Unter der wahrscheinlichen Ehedauer versteht man den Zeitraum, nach dessen Verfluss die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe noch bestehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufgelöst sein werde, einander gleich sind.

Setzen wir diesen Zeitraum = x Jahre, so ist bei voriger Bezeichnung

$$\frac{a_{n+x}}{a_n} = \frac{a_{p+x}}{a_p}$$

die Wahrscheinlichkeit, dass beide nach x Jahren noch leben werden, hingegen

$$1 - \frac{a_{n+x}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+x}}{a_p}$$

die Wahrscheinlichkeit, dass nicht beide zugleich noch leben werden. Sind beide Wahrscheinlichkeiten gleich, so haben wir

$$\frac{a_{n+x}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+x}}{a_p} = 1 - \frac{a_{n+x}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+x}}{a_p}$$

$$2 \cdot \frac{a_{n+x}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+x}}{a_p} = 1$$

$$a_{n+x} \cdot a_{p+x} = \frac{1}{2} \cdot a_n a_p.$$

Man wird deshalb um x zu finden für dasselbe 1, 2, 3 u. s. f. zu nehmen haben, bis man auf eine Zahl kommt, für welche die vorige Gleichung richtig ist.

66. Beispiel.

Welches ist die wahrscheinliche Ehedauer, wenn der Mann 36 und die Frau 29 Jahre alt ist mit Benutzung der Süssmilch-Baumann'schen Tafel?

Wir haben zunächst

$$\frac{1}{2} a_n \cdot a_p = \frac{1}{2} \cdot a_{36} \cdot a_{29} = \frac{1}{2} \cdot 402 \cdot 445 = 89445 = A.$$

Gehen wir gleich 10 Jahre weiter, d. h. setzen $x = 10$, so ist

$$a_{n+x} \cdot a_{p+x} = a_{46} \cdot a_{39} = 332 \cdot 374 = 124168.$$

Da diese Zahl noch grösser als A ist, so müssen wir noch weiter gehen. Setzen wir deshalb etwa $x = 17$, so haben wir

$$a_{n+x} \cdot a_{p+x} = a_{53} \cdot a_{46} = 273 \cdot 332 = 90636.$$

Auch diese Zahl ist noch grösser als A . Gehen wir noch 1 Jahr weiter, setzen also $x = 18$, so ist

$$a_{n+x} \cdot a_{p+x} = a_{54} \cdot a_{47} = 264 \cdot 324 = 75536.$$

Da diese Zahl kleiner als A ist, so haben wir die Grenze erreicht. Die wahrscheinliche Ehedauer liegt also zwischen 17 und 18 Jahren. Das was zu 17 Jahren noch hinzukommt, finden wir ganz so, wie im 63. Beispiele, durch die Proportion

$$90636 - 75536 : 90636 - 89545 = 1 : z$$

$$15100 : 1091 = 1 : z$$

$$z = \frac{1091}{15100} = 0,072.$$

Dieser Werth von x kommt noch zu 17 hinzu, so dass die wahrscheinliche Ehedauer vollständig ausgedrückt wird durch

$$x = 17,072 \dots$$

§. 48.

Mittlere Ehedauer.

Die mittlere Ehedauer unterscheidet sich von der wahrscheinlichen ebenso, wie die mittlere Lebensdauer von der wahrscheinlichen. Mit Bezug auf das was unter §. 45. ausgeführt worden ist, dürfte jetzt wohl von selbst klar sein, dass die mittlere Ehedauer ausgedrückt wird durch

$$M = \frac{1}{2} + \frac{a_{n+1} \cdot a_{p+1} + a_{n+2} \cdot a_{p+2} + a_{n+3} \cdot a_{p+3} + \dots}{a_n \cdot a_p} \dots$$

67. Beispiel.

Welches ist die mittlere Ehedauer, wenn der Mann 82 und die Frau 79 Jahre alt ist, nach der Süssmilch-Baumann'schen Sterblichkeitstafel?

Es ist $a_{82} = 28$ $a_{79} = 43$
 $a_{83} = 24$ $a_{80} = 37$
 $a_{84} = 20$ $a_{81} = 32$
 u. s. f. u. s. f. (s. Taf. V.),

folglich

$$M = \frac{1}{2} + \frac{1}{28 \cdot 43} (24 \cdot 37 + 20 \cdot 32 + 17 \cdot 28 + 14 \cdot 24 + 12 \cdot 20 + 10 \cdot 17 + 8 \cdot 14 + 6 \cdot 12 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 4)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3048}{1204} = 0,5 + 2,53$$

$$= 3,03 \dots$$

Die mittlere Ehedauer beträgt also 3,03 ... Jahre.

Achstes Kapitel.

Versicherungs-Rechnungen mit Rück- sicht auf Sterblichkeit.

§. 49.

Aussteuerversicherung bei Zahlung der Prämie in einer Summe.

Bei vielen Lebensversicherungsinstituten besteht auch eine Aussteuerversicherung in der Art, dass entweder gegen eine einmal zu zahlende Summe oder gegen jährlich zu zahlende feste Prämien einem Kinde gewöhnlich nach Erreichung des 18ten, 21sten oder 24sten Lebensjahres ein Kapital ausbezahlt wird. In den Statuten der Versicherungsanstalten sind in der Regel die Prämien angegeben, welche einer Versicherungssumme von 100 Thlr. entsprechen. Wir betrachten zunächst die Versicherung bei einmaliger Prämienzahlung. Obgleich die Versicherung den Kindern aus allen Ständen offen steht, so werden thatsächlich doch nur Kinder aus den wohlhabenderen versichert werden, deshalb ist auch die *Deparcieux'sche* Sterblichkeitstafel in Anwendung zu bringen. — Die Berechnung der Prämie ist leicht und einfach. Ist S die versicherte Summe, die bei Erreichung des n ten Lebensjahres gezahlt wird und ist ein Kind jetzt k Jahre alt, so ist nach der früheren Bezeichnung die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das n te Jahr erreichen werde

$$\frac{a_n}{a_k}$$

und es hat deshalb die mathematische Hoffnung auf die Versicherungssumme den Werth (s. §. 41.)

$$\frac{a_n}{a_k} \cdot S.$$

Da die Versicherungssumme aber erst nach $(n-k)$ Jahren zahlbar ist, so ist ihr baarer Werth (vergl. §. 3.)

$$W = \frac{a_n}{a_k} \cdot \frac{S}{e^{n-k}} \dots (A.),$$

wo wie früher $\frac{p+100}{100} = e$ gesetzt ist.

Was nun noch den zu Grunde zu legenden Zinsfuss betrifft, so wird man über $3\frac{1}{2}\%$ deshalb nicht hinausgehen dürfen, weil auch bei Anwendung der Deparcieux'schen Sterblichkeitstabelle für die Versicherungsinstitute ein Verlust daraus erwächst, dass auch die wohlhabenderen Stände nur ihre zur Zeit der Versicherung gesunden Kinder versichern werden und deshalb die Gesellschaft sich durch etwas höhere Prämien decken muss.

68. Beispiele.

Welche Prämie ist für ein Kind bei der Geburt zu zahlen, wenn demselben 100 Thlr. zahlbar nach erreichtem 18. Lebensjahre gesichert werden sollen?

Wir haben hier in der Formel

$$W = \frac{a_n}{a_k} \cdot \frac{S}{e^{n-k}}$$

$n=18$, $k=0$, $S=100$, $e=1,035$ und nach Deparcieux $a_{18}=5655$, $a_0=10000$, folglich

$$W = \frac{5655}{10000} \cdot \frac{100}{1,035^{18}}$$

Da nach Taf. II.

$$\frac{1}{1,035^{18}} = 0,5383611$$

ist, so erhalten wir

$$W = \frac{5655}{1000} \cdot 53,83611$$

$$= 30,44..$$

$$= 30 \text{ Thlr. } 13 \text{ Sgr. } 3 \text{ Pf.}$$

69. Beispiel.

Welche Prämie ist für ein Kind, das 7 Jahre alt ist, zu zahlen, wenn demselben 100 Thlr. zahlbar nach erreichtem 21sten Lebensjahre gesichert werden sollen?

Wir haben hier in der Formel

$$W = \frac{a_n}{a_k} \cdot \frac{S}{e^{n-k}}$$

$n = 21$, $k = 7$, $a_n = 5344$, $a_k = 6243$, $S = 100$, $e = 1,035$,
folglich

$$\begin{aligned} W &= \frac{5344}{6243} \cdot \frac{100}{1,035^{14}} \\ &= \frac{5344 \cdot 61,77818}{6243} \\ &= 52,882 \dots \\ &= 52 \text{ Thlr. } 26 \text{ Sgr. } 9 \text{ Pf.} \end{aligned}$$

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir die nach der angegebenen Weise berechneten Prämien zusammen, welche bei der Geburt, im ersten u. s. f. bis zum 12. Jahre behufs einer Versicherung von 100 Thlr. zahlbar im 18ten, 21sten und 24sten Lebensjahre einmal zu zahlen sind.

Einmal zu zahlende Prämie zur Versicherung von 100 Thalern zahlbar bei Vollendung des 18ten, 21sten und 24sten Lebensjahres.

Alter des Kindes.	Bei Vollendung des 18. Jahres.	Bei Vollendung des 21. Jahres.	Bei Vollendung des 24. Jahres.
Jahre. Geburt.	Thaler.	Thaler.	Thaler.
	30,44	26,74	23,41
1	42,30	37,15	32,52
2	46,02	40,41	35,38
3	49,47	43,44	38,03
4	52,79	46,36	40,58
5	55,90	49,09	42,98
6	58,98	51,79	45,35
7	62,03	54,49	47,70
8	65,14	57,21	50,08
9	68,32	60,00	52,52
10	71,52	62,80	54,99
11	74,75	65,64	57,47
12	78,02	68,51	59,97

Anmerkung. Zu den in vorhergehender Tabelle aufgestellten Beiträgen wird allerdings noch ein kleiner Aufschlag zur Deckung der Verwaltungskosten kommen müssen. Uebrigens würde schon bei obigen Prämien den Versicherungsinstituten ein Gewinn erwachsen, weil angenommen worden ist, dass dieselben ihre Gelder nur zu 3¹/₂ unterbringen könnten. Wie verschieden die Sätze bei den verschiedenen Instituten sind, und wie wenig sie deshalb auf mathematischen Grundlagen zum Theil zu ruhen scheinen, zeigt nachfolgende vergleichende Tabelle.

Einmalige Prämie zur Versicherung von 100 Thlr. zahlbar bei Vollendung

A. des 18. Lebensjahres.

Alter des Kindes.	Janus in Hamburg.	Medical etc. Assu- rance Society.	Deutsche Lebens- versicherungs - Ge- sellschaft in Lü- beck.
Jahre.	<i>Rfl. Sgr. Sch.</i>	<i>Rfl. Sgr. Sch.</i>	<i>Rfl. Sgr.</i>
Geburt.	33. 8. 3.	— — —	36. 17.
1	40. 21. 3.	43. 1. 9.	44. 15.
2	45. 25. 3.	49. 14. 4.	49. 25.
3	50. 26. 6.	54. 15. —	54. 27.

B. des 21. Lebensjahres.

Alter des Kindes.	Janus in Ham- burg.	Crown Life As- surance Com- pany.	Medical etc. Assurance So- ciety.	Lübecker Gesellschaft.
Jahre.	<i>Rfl. Sgr. Sch.</i>	<i>Rfl. Sgr. Sch.</i>	<i>Rfl. Sgr. Sch.</i>	<i>Rfl. Sgr.</i>
Geburt.	29. 11. 6.	— — —	— — —	32. 26.
1	35. 28. 3.	36. 22. 6.	39. 17. 2.	40. —
2	40. 13. 6.	43. 7. 6.	44. 21. 7.	44. 25.
3	44. 28. —	47. 19. —	48. 21. 4.	49. 11.

§. 50.

Rückgewährung der Versicherungsprämie.

Soll eine Versicherungsanstalt im Stande sein, die einmal gezahlte Versicherungsprämie im Falle des früheren Ablebens des Kindes wieder zurückzuerstatten, so muss sie natürlich eine Zusatzprämie nehmen. Es sind hier nun überhaupt 4 Fälle möglich:

Die Versicherungsprämien allein werden zurückerstattet

- 1) am Ende des Todesjahres,
- 2) zur Zeit, wo die Versicherungssumme fällig sein würde; und ferner die Versicherungsprämien sammt den Zusatzprämien werden zurückerstattet
- 3) am Ende des Todesjahres,
- 4) zum festgesetzten Versicherungstermine.

Nach unserer Ansicht dürften die Versicherungsarten unter 2) und 4) die empfehlenswerthesten sein, weil ja bei diesen auch die Prämien gegen einen Disconto-Abzug sofort beim Tode zurückerstattet werden können. Wir werden uns auch deshalb vorzugsweise mit diesen beschäftigen.

Soll die Versicherungsprämie allein zum Versicherungstermine zurückgezahlt werden, so hängt diese Zahlung ab von der Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherte vor dem Versicherungstermine gestorben ist; im Uebrigen ist die Rechnung ganz wie vorher. Bezeichnen wir nämlich die Versicherungsprämie mit V und die Zusatzprämie mit Z , behalten aber im Uebrigen die Bezeichnungen aus §. 49. bei, so haben wir

$$Z = \left(1 - \frac{a_n}{a_k}\right) \cdot \frac{V}{e^{n-k}} \dots (B).$$

Da eine Lebensversicherungsbank für alle Eventualitäten möglichst gedeckt sein muss, so kann bei Berechnung der Zusatzprämien nicht die Sterblichkeitstafel von Deparcieux, sondern es muss die allgemeine Süssmilch-Baumannsche angewendet werden, denn es bleibt immer möglich, dass auch Leute aus niederen Ständen ihre Kinder versichern und dass dann wegen der grösseren Sterblichkeit der letzteren mehr Prämien zurückerstattet werden müssten, als bei der Berechnung der Zusatzprämien vorgesehen wären.

70. B e i s p i e l.

Welche Zusatzprämie muss der Janus nehmen, wenn er die bei der Geburt eines Kindes behufs einer Versicherung von 100 Thlr. zahlbar im erreichten 18. Lebensjahre gezahlte Prämie von 33 Thlr. 8 Sgr. 3 Pf. zurückzahlen können soll?

In der Formel

$$Z = \left(1 - \frac{a_n}{a_k}\right) \frac{V}{e^{n-k}}$$

ist $V = 33,27$, $n = 18$, $k = 0$, $a_n = 499$, $a_k = 1000$, $e = 1,035$, folglich

$$\begin{aligned} Z &= \left(1 - \frac{499}{1000}\right) \cdot \frac{33,27}{1,035^{18}} \\ &= \frac{501.33,27.0,5383611}{1000} \\ &= 8,97 \\ &= 8 \text{ Thlr. } 29 \text{ Sgr. } 2 \text{ Pf.} \end{aligned}$$

71. Beispiel.

Welche Zusatzprämie ist erforderlich, damit die im 5ten Lebensjahre gezahlte Prämie im Betrage von 49,09 Thlr. im 21sten Jahre zurückgezahlt werden kann, wenn 3 % Zinsen gerechnet werden?

Es ist hier $V = 49,09$, $n = 21$, $k = 5$, $a_n = a_{21} = 486$, $a_k = a_5 = 579$, $e = 1,03$, folglich

$$\begin{aligned} Z &= \left(1 - \frac{486}{579}\right) \cdot \frac{49,09}{1,03^{16}} \\ &= \frac{93.49,09.0,6231669}{579} \\ &= 4,86 = 4 \text{ Thlr. } 25 \text{ Sgr. } 10 \text{ Pf.} \end{aligned}$$

§. 51.

Rückgewährung der Versicherungsprämie und der Zusatzprämie zugleich.

Soll ausser der Versicherungsprämie V auch die Zusatzprämie Z zurückgezahlt werden, so ist der baare Werth von $V + Z$ auszudrücken und es ist deshalb nur in der §. 50. ent-

wickelten Formel $V + Z$ statt V einzusetzen, wodurch wir erhalten

$$Z = \left(1 - \frac{a_n}{a_k}\right) \frac{V + Z}{e^{n-k}}.$$

Um hieraus Z zu bestimmen, haben wir

$$Z = \frac{a_k - a_n}{a_k \cdot e^{n-k}} \cdot V + \frac{a_k - a_n}{a_k \cdot e^{n-k}} \cdot Z$$

$$\text{oder } Z \left(1 - \frac{a_k - a_n}{a_k \cdot e^{n-k}}\right) = \frac{a_k - a_n}{a_k \cdot e^{n-k}} \cdot V$$

$$\text{oder } Z = \frac{\frac{a_k - a_n}{a_k \cdot e^{n-k}} \cdot V}{1 - \frac{a_k - a_n}{a_k \cdot e^{n-k}}}$$

oder endlich

$$Z = \frac{V}{\frac{a_k \cdot e^{n-k}}{a_k - a_n} - 1} \dots (C).$$

Dies ist die zur Berechnung bequemste Formel,

72. Beispiel.

Welche Zusatzprämie ist zu nehmen, wenn die Versicherungsprämie im Betrage von 49,09 Thaler (s. 71. Beispiel) sammt der Zusatzprämie im 21. Jahre zurückgezahlt werden soll und wenn 3 % Zinsen berechnet werden?

Es ist hier wieder $V = 40,09$ u. s. f., also

$$Z = \frac{49,09}{\frac{579 \cdot 1,03^{16}}{579 - 486} - 1}$$

$$= \frac{49,09}{\frac{579 \cdot 1,604706}{93} - 1}$$

$$= \frac{49,09}{9,99 - 1} = \frac{49,09}{8,99}$$

$$= 5,46 \text{ Thlr.} = 5 \text{ Thlr. } 13 \text{ Sgr. } 10 \text{ Pf.}$$

Die Gesamtprämie wäre demnach

$$49,09 + 5,46 = 54,55$$

$$= 54 \text{ Thlr. } 16 \text{ Sgr. } 6 \text{ Pf.}$$

Nachfolgende Tabelle enthält die in der angegebenen Art berechneten Gesamtprämien, welche, wenn das Kind vorher stirbt, zur Versicherungszeit zurückgewährt werden können.

Einmalige Prämie zur Versicherung von Hundert Thalern zahlbar im 18ten, 21sten und 24sten Lebensjahre, welche, wenn das Kind vor dem Versicherungstermine stirbt, zu diesem Termine zurückgezahlt wird.

Alter des Kindes.	18tes Lebens- jahr.	21stes Lebensjahr.	24stes Lebensjahr.
Jahre.	Thaler.	Thaler.	Thaler.
Geburt.	43,18	36,95	31,66
1	53,50	46,14	40,08
2	54,32	47,60	41,64
3	55,45	49,17	43,61
4	58,97	52,04	45,80
5	61,71	54,55	48,10
6	64,41	57,02	50,36
7	66,94	59,44	52,56
8	69,69	61,91	54,83

Anmerkung. Von der Berechnung von Prämien, die sofort beim Tode des versicherten Kindes zurückgewährt werden, wird später bei den Lebensversicherungen die Rede sein.

§. 52.

Aussteuer-Versicherung durch jährliche Prämienzahlung.

Mit Zugrundelegung der Süssmilch-Baumann'schen Sterblichkeitstafel wollen wir annehmen, dass 1000 Kinder bei der Geburt versichert würden mit je 100 Thlr. zahlbar bei Vollendung des 18. Lebensjahres. Wir untersuchen zu dem

Ende zuvörderst, zu welcher Summe deren Prämien à 1 *R.* in den Händen der Versicherungsanstalt nach Vollendung des 18. Jahres angewachsen sein werden.

Die erste Einzahlung wird für sämtliche 1000 Kinder gezahlt, es wachsen deshalb deren Prämien à 1 Thlr. bei 4% in den Händen der Bank an zu $1000 \cdot 1,04^{18}$. Das 1ste Lebensjahr erreichen nur 750, folglich wachsen deren Prämien an zu $750 \cdot 1,04^{17}$ u. s. f. Die nachfolgende, durch sich selbstverständliche Tabelle umfasst die Gesammtheit der Prämienzahlungen nach ihrem künftigen Werthe.

Alter der Kinder.	Es leben noch Kinder	Deren Prämien à 1 Thlr. wach- sen an zu	Ausgerechnet
Jahre. Geburt.	wie viel?	Thalern?	Thaler.
	1000	$1000 \cdot 1,04^{18}$	2025,82
1	750	$750 \cdot 1,04^{17}$	1401,61
2	661	$661 \cdot 1,04^{16}$	1238,04
3	618	$618 \cdot 1,04^{15}$	1112,98
4	593	$593 \cdot 1,04^{14}$	1026,88
5	579	$579 \cdot 1,04^{13}$	964,08
6	567	$567 \cdot 1,04^{12}$	907,77
7	556	$556 \cdot 1,04^{11}$	855,93
8	547	$547 \cdot 1,04^{10}$	809,69
9	539	$539 \cdot 1,04^9$	767,16
10	532	$532 \cdot 1,04^8$	728,07
11	527	$527 \cdot 1,04^7$	693,49
12	523	$523 \cdot 1,04^6$	661,76
13	519	$519 \cdot 1,04^5$	631,44
14	515	$515 \cdot 1,04^4$	602,48
15	511	$511 \cdot 1,04^3$	574,80
16	507	$507 \cdot 1,04^2$	548,37
17	503	$503 \cdot 1,04$	523,12
			<u>16074,49</u>

Da die Prämien à 1 Thlr. von 1000 bei der Geburt versicherten Kindern zu 16074,49 Thlr. anwachsen, so ist der künftige Werth der von einem Kinde gezahlten Prämien à 1 Thlr. nach 18 Jahren 16,07449 Thlr.

Die Berechnung nach Art der vorigen Tabelle ergibt folgende in einer Tabelle zusammengestellten Resultate.

Alter der Kinder.	Versicherte Kinder.	Sie bringen durch Zahlung einer jährlichen Prämie à 1 <i>R.</i> dem Versicherungsinstitute ein		
Jahre.	Anzahl.	nach 18 Jahren. Thaler.	nach 21 Jahren. Thaler.	nach 24 Jahren. Thaler.
Geburt.	1000	16074,49	19311,00	23284,27
1	750	13712,67	17032,23	20720,95
2	661	12311,06	15455,54	18947,39
3	618	11073,02	14062,98	17380,59
4	593	9960,04	12811,03	15972,68
5	579	8933,16	11655,93	14673,35
6	567	7969,08	10550,85	13430,29
7	556	7396,31	9927,85	12728,74
8	547	6540,38	8964,38	11645,72
9	539	5730,69	8053,58	10621,20
10	532	4963,53	7190,63	9650,50
11	527	4235,46	6371,66	8712,78
12	523	3541,97	5591,57	7851,77

Fragen wir nun:

73. B e i s p i e l.

Welche Prämie ist für ein einzelnes Kind vom Tage der Geburt an zu entrichten, wenn demselben im 18ten Lebensjahre eine Summe von 100 Thalern ausgezahlt werden soll?

so lehrt uns das Resultat voriger Tabelle, dass, wenn von 1000 gleichzeitig versicherten Kindern jedes 1 Thlr. Prämie zahlt, die Gesammtheit dieser Prämien zu 16074,49 Thaler anwächst. Die Bank hat nun an die das 18te Jahr überle-

lebenden, d. i. an 499 Kinder je 100 Thlr. auszuzahlen, mit-
hin in Summa 49900 Thlr., welche Summe also durch Prä-
mien aufgebracht werden muss. Die dieser Summe entspre-
chende Prämie finden wir aber durch die Proportion

$$16074,49 : 49900 = 1 : x,$$

$$\text{also } x = \frac{49900}{16074,49} = 3,1043$$

$$= 3 \text{ Thlr. } 3 \text{ Sgr. } 2 \text{ Pf. c.}$$

Die für die verschiedenen Alter von der Geburt bis zum
12ten Lebensjahre für eine Versicherung von 100 Thlr. zahl-
bar nach Vollendung des 18ten, 21sten und 24sten Lebens-
jahres zu zahlenden Prämien sind in nachfolgender Tabelle
zusammengestellt.

*Jährliche Prämie zur Versicherung von 100 Thalern, zahl-
bar bei Vollendung des 18ten, 21sten und 24sten Lebens-
jahres.*

Alter des Kindes.	Bei Vollendung des 18. Jahres.	Bei Vollendung des 21. Jahres.	Bei Vollendung des 24. Jahres.
Jahr.	Thaler.	Thaler.	Thaler.
Geburt.	3, 10	2, 52	2, 02
1	3, 63	2, 85	2, 27
2	4, 05	3, 14	2, 48
3	4, 51	3, 46	2, 71
4	5, 01	3, 79	2, 95
5	5, 59	4, 17	3, 21
6	6, 26	4, 61	3, 51
7	6, 74	4, 90	3, 70
8	7, 63	5, 42	4, 04
9	8, 77	6, 03	4, 43
10	10, 05	6, 76	4, 88
11	11, 78	7, 63	5, 41
12	14, 09	8, 69	6, 00

Es versteht sich von selbst, dass zu diesen Prämien-sätzen noch ein Verwaltungskosten - Aufschlag kommen muss, welcher je nach der Billigkeit und Liberalität der einzelnen Versicherungsanstalten allerdings eine sehr verschiedene Höhe hat. Nach der Billigkeit rangiren dieselben in folgender Reihenfolge.

Vergleichende Tabelle über die Prämien für eine Versicherung von 100 Thalern zahlbar nach Vollendung des 21sten Lebensjahres.

Alter des Kindes.	Normal- Prämien- satz *).	Janus in Hamburg.	Crown etc. Company.	Medical, Invalid etc. Society.	Lübecker Gesellschaft
Jahre.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.
Geburt.	2. 15. 8.	2. 23. —			2. 29. 6.
1	2. 25. 6.	3. 1. 3.	3. 5. 6.	3. 7. 6.	3. 8. 6.
2	3. 4. 3.	3. 10. —	3. 14. 9.	3. 16. 3.	3. 17. 4.
3	3. 13. 10.	3. 19. —	3. 22. 9.	3. 25. 6.	3. 26. 3.
4	3. 23. 9.	3. 28. 6.	4. 3. 6.	4. 5. 3.	4. 6. 7.
5	4. 5. 2.	4. 9. 6.	4. 14. 3.	4. 16. 2.	4. 17. 4.
6	4. 18. 4.	4. 21. 3.	4. 27. 9.	4. 28. 5.	4. 29. 6.
7	4. 27. —	5. 5. 3.	5. 10. 3.	5. 12. —	5. 13. 9.
8	5. 12. 8.	5. 21. 3.	5. 27. 9.	5. 28. —	5. 29. 6.
9	6. — 11.	6. 9. 9.	6. 16. 5.	6. 16. 6.	6. 17. 10.
10	6. 22. 10.	7. 3. —	7. 8. 3.	7. 8. 8.	7. 9. 10.
11	7. 18. 11.	7. 27. 9.			
12	8. 20. 8.	8. 29. 3.			

*) Mit diesem Namen bezeichnen wir den im Vorhergehenden berechneten Prämien-satz, zu welchem natürlich jede Versicherungsanstalt noch einen Verwaltungskosten - Aufschlag nehmen muss.

Der vorigen entsprechende Tabelle bei Zahlung von Hundert Thalern nach Vollendung des 24sten Lebensjahres.

Alter des Kindes.	Normal - Prämiensatz.			Deutsche Betriebs- Capitals- und Aus- steuer-Anstalt in Berlin.		Janus in Hamburg.		
Jahre.	Rth.	Syl.	S.	Rth.	Syl.	Rth.	Syl.	S.
Geburt.	2.	—	8.			2.	7.	9.
1	2.	8.	1.	2.	12.	2.	14.	3.
2	2.	14.	5.	2.	15.	2.	20.	9.
3	2.	21.	4.	2.	18.	2.	27.	3.
4	2.	28.	6.	2.	25.	3.	4.	—
5	3.	9.	4.	3.	2.	3.	11.	3.
6	3.	15.	2.	3.	9.	3.	19.	6.
7	3.	21.	—	3.	20.	3.	29.	3.
8	4.	1.	3.	3.	29.	4.	9.	9.
9	4.	12.	10.	4.	10.	4.	21.	6.
10	4.	26.	5.	4.	21.	5.	4.	9.
11	5.	12.	4.	5.	9.	5.	20.	3.
12	6.	—	—	5.	22.	6.	7.	9.

Anmerkung. Die Vergleichung obiger Prämiensätze zeigt, dass die Deutsche Betriebs-Kapitals- und Aussteuer-Anstalt für den Handels- und Handwerkerstand in Berlin zu niedrige Prämien nimmt, und deshalb, weil sie unmöglich dabei bestehen kann, in die Lage kommen muss, Nachschüsse zu erheben.

§. 53.

Aussteuerversicherung mit Rückgewährung der Versicherungsprämien.

Sollen die Versicherungsprämien von dem Versicherungsinstitute zurückgezahlt werden können, so muss letzteres wieder eine Zusatzprämie nehmen, die nicht mit zurückgezahlt wird. Es sind nun wieder zwei Fälle möglich, entweder werden die Versicherungsprämien erst zur Zeit, wo die versicherte Summe fällig wäre, also z. B. das 18te, 21ste oder 24ste Lebensjahr zurückgewährt, oder gleich beim Tode des Kindes.

A. Der erstere Fall ist der am leichtesten zu berechnende. Man hat nämlich nur in der Sterblichkeitstafel nachzusehen, wie viele von 1000 bei der Geburt versicherten Kindern bis zum 1sten, dann bis zum 2ten, zum 3ten u. s. w. Jahre sterben und zu bedenken, dass die erstere erst einmal, die folgenden zweimal, die wieder folgenden dreimal u. s. f. Prämien gezahlt haben. Werden nun die Prämien wieder zu 1 Thlr. angenommen, so hat man demnach die Zahl der in den einzelnen Jahren Gestorbenen der Reihe nach mit 1, 2, 3 bis 18 (resp. 21 oder 24) zu multipliciren, die Produkte zu addiren und für die erhaltene Summe die Prämien zu berechnen, wie in §. 52. angegeben worden ist.

B. Im zweiten Falle, wo die Prämien sofort beim Tode des Kindes restituirt werden, ist der künftige Werth (resp. im 18ten, 21sten, 24sten Jahre) dieser Zahlung zu ermitteln und die diesem entsprechenden Prämien nach dem vorher angezogenen Paragraphe zu berechnen.

Für die weiteren Berechnungen beider Fälle stellen wir zunächst folgende selbstverständliche Tabelle auf.

Von 1000 gleichzeitig Gebornen und bei der Geburt Versicherten sterben		Diesen ist für gezahlte Prä- mien à 1 <i>R.</i> zu- rückzugewäh- ren :	Künftiger Werth der Rückgewährun- gen.	Ausgerechnet :
bis zum Jahre :	wie viel ?			
1	250	250	$250 \cdot 1,04^{17}$	486,975
2	89	178	$178 \cdot 1,04^{16}$	333,390
3	43	129	$129 \cdot 1,04^{15}$	232,323
4	25	100	$100 \cdot 1,04^{14}$	173,168
5	14	70	$70 \cdot 1,04^{13}$	116,555
6	12	72	$72 \cdot 1,04^{12}$	115,272
7	11	77	$77 \cdot 1,04^{11}$	118,538
8	9	72	$72 \cdot 1,04^{10}$	106,576
9	8	72	$72 \cdot 1,04^9$	102,474
10	7	70	$70 \cdot 1,04^8$	95,800
11	5	55	$55 \cdot 1,04^7$	72,376
12	4	48	$48 \cdot 1,04^6$	60,735
13	4	52	$52 \cdot 1,04^5$	63,266
14	4	56	$56 \cdot 1,04^4$	65,512
15	4	60	$60 \cdot 1,04^3$	67,492
16	4	64	$64 \cdot 1,04^2$	69,222
17	4	68	$68 \cdot 1,04^1$	70,720
18	4	72	72	72,000

Summa 1565 *R.*Summa 2422,394 *R.*

Nehmen wir weiter an, im ersten Lebensjahre würden 750, im zweiten 661 u. s. f. versichert, so würden ebensoviel der vorigen analoge Tabellen zu berechnen sein, in Bezug auf welche wir uns hier begnügen, deren Endresultate in nachfolgender Tabelle zusammenzustellen. Wir nehmen hierbei an, dass nur bis zum 12ten Lebensjahre Versicherungen zugelassen würden.

Ver- siche- rungen im Jahre	Versicherung für's 18. Le- bensjahr.		Versicherung für's 21. Le- bensjahr.		Versicherung für's 24. Jahr.
	Baarer Werth der Rück- gewährung.	Künftiger Werth der Rück- gewährung.	Baarer Werth der Rück- gewährung.	Künftiger Werth der Rück- gewährung.	Baarer Werth der Rück- gewährung.
0	1565	2422,394	1826	2995,268	2171
1	1064	1516,080	1312	1962,300	1642
2	813	1096,312	1048	1476,630	1363
3	651	844,082	873	1179,420	1173
4	532	668,870	741	978,844	1026
5	438	536,949	634	806,964	904
6	358	428,342	541	671,308	796
7	290	338,950	460	557,267	700
8	233	266,492	390	462,275	615
9	185	207,356	329	382,267	539
10	145	159,606	276	315,069	471
11	112	121,423	230	258,631	410
12	84	89,830	189	209,610	354

Die Tabellen pag. 105, 107 und 113 enthalten alle Elemente, welche zur Berechnung der Zusatzprämien bei Rückgewährung im 18. etc. Jahre sowohl, als bei der Geburt erforderlich sind. Zur näheren Erläuterung mögen einige Beispiele dienen.

74. Beispiel.

Welche Zusatzprämie muss ein Versicherungsinstitut ausser der behufs einer Versicherung von 100 Thlr. zahlbar im 18. Lebensjahre von der Geburt ab zu zahlenden Versicherungsprämie im Betrage von 3,10 Thlr. nehmen, wenn die Versicherungsprämien, im Fall das Kind vor dem 18ten Jahre stirbt, zu letzterer Zeit zurückgezahlt werden sollen?

Bei 1 Thaler Versicherungsprämie hat das Institut nach Tabelle pag 113. bei 1000 versicherten Kindern 1565 Thlr., also bei 3,10 Thlr. Versicherungsprämie $3,10 \cdot 1565$ zurückzuzahlen. Diese Summe ist durch Zusatzprämien aufzubringen. Nun bringt nach Tabelle pag. 107 eine Prämie von 1 Thlr. eine Summe von 16074,49 Thalern auf, wir haben deshalb, wenn wir die gesuchte Zusatzprämie mit x bezeichnen, die Proportion

$$\begin{aligned} x:1 &= 3,10 \cdot 1565 : 16074,49, \\ \text{also} \quad x &= \frac{3,10 \cdot 1565}{16074,49} \text{ Thlr.} \\ &= \frac{3,10 \cdot 1565 \cdot 30}{16074,49} \text{ Sgr.} \\ &= 9 \text{ Sgr. 1 Pf. c.} \end{aligned}$$

Wenn also für ein Kind neben der Versicherungsprämie im Betrage von 3 Thlr. 3 Sgr. noch eine Zusatzprämie von 9 Sgr. 1 Pf. bezahlt wird, so ist das Versicherungsinstitut im Stande am Versicherungstermine die bis zum Tode des vorher gestorbenen Kindes gezahlten Versicherungsprämien zurückzuzahlen.

75. B e i s p i e l.

Welche Zusatzprämie muss bei einer Versicherung im 5ten Lebensjahre neben der Versicherungsprämie im Betrage von 5,59 Thlr. gezahlt werden, wenn im Uebrigen dieselben Verhältnisse stattfinden, wie vorher?

Bei 1 Thlr. Versicherungsprämie hat das Institut nach Tabelle pag. 113. bei 579 versicherten Kindern 438 Thaler, also bei 5,59 Thaler Versicherungsprämien $5,59 \cdot 438$ Thaler zurückzuzahlen. Diese Summe ist durch Zusatzprämie aufzubringen. Nach Tabelle pag. 107 bringt 1 Thlr. eine Summe von 8933,16 Thalern auf, deshalb setzen wir zur Auffindung der Zusatzprämie x die Proportion

$$\begin{aligned} x:1 &= 5,59 \cdot 438 : 8933,16 \\ x &= \frac{5,59 \cdot 438}{8933,16} \text{ Thlr.} \end{aligned}$$

$$= \frac{5,59.438.30}{8933,16} \text{ Sgr.}$$

$$= 8 \text{ Sgr. } 3 \text{ Pf.}$$

76. B e i s p i e l.

Welche Zusatzprämie muss gezahlt werden, wenn die Versicherungsprämien gleich beim Tode des Kindes zurückgezahlt werden sollen, im Uebrigen aber Alles wie im 74sten Beispiele bleibt?

Es ändert sich die Rechnung nur insofern, als jetzt nicht 1565 Thlr., sondern der künftige Werth der Rückgewährungen, d. i. nach Tabelle pag. (113) eine Summe von 2422,394 Thlr. durch Zusatzprämien aufgebracht werden müssen. Wir haben also jetzt

$$x = \frac{3,10.2422,394.30}{16074,49} \text{ Sgr.}$$

$$= 14 \text{ Sgr. } 1 \text{ Pf. c.}$$

§. 54.

Aussteuerversicherung mit Rückgewährung der gesamten Prämien.

Wir sondern wieder die Fälle: A. Rückgewährung am Versicherungstermine und B. Rückgewährung beim Tode des Kindes. Bei beiden Versicherungsarten ist nur festzuhalten, dass, wenn v die Versicherungsprämie und x die Zusatzprämie bezeichnet, nicht v allein, sondern $v + x$ zurückzuzahlen ist; es ist deshalb in vorigen Rechnungsformeln statt v nur $v + x$ einzusetzen. Die nachfolgenden Beispiele werden dies hinlänglich deutlich machen.

77. Beispiel.

Welche Zusatzprämie muss gezahlt werden, wenn die Versicherungsprämie à 3,10 Thlr. sammt den Zusatzprämien, im Falle das Kind vor dem 18. Jahre stirbt, zu letzterer Zeit zurückgezahlt werden sollen, im Uebrigen aber die Verhältnisse des 74. Beispieles stattfinden?

Wir haben hier (vergl. 74. Beispiel) die Proportion

$$x:1=(3,10+x)1565:16074,49$$

also

$$16074,49x=3,10 \cdot 1565 + 1565x$$

$$14509,49x=3,10 \cdot 1565$$

$$x = \frac{3,10 \cdot 1565}{14509,49} \text{ Thlr.}$$

$$= \frac{3,10 \cdot 1565 \cdot 30}{14509,49} \text{ Sgr.}$$

$$= 10 \text{ Sgr. 1 Pf. c.}$$

Da die Versicherungsprämie 3,10 Thlr. = 3 Thlr. 3 Sgr. beträgt, so können demnach bei einer Gesamtprämie von 3 Thlr. 13 Sgr. 3 Pf. die ganzen Prämien zum Versicherungstermine zurückgezahlt werden.

78. Beispiel.

Welche Zusatzprämie muss genommen werden, wenn die gesammten Prämien gleich beim Tode des Kindes zurückgezahlt werden sollen, im Uebrigen aber Alles wie im 74sten Beispiele bleibt?

Wir haben hier die Proportion

$$x:1=(3,10+x) \cdot 2422,394:16074,49,$$

$$16074,49x=3,10 \cdot 2422,394 + 2422,394 \cdot x$$

$$13652,1x=3,1 \cdot 2422,394$$

$$x = \frac{3,1 \cdot 2422,394}{13652,1} \text{ Thlr.}$$

$$= \frac{3,1 \cdot 2422,394 \cdot 30}{13652,1} \text{ Sgr.}$$

$$= 16 \text{ Sgr. 7 Pf. c.}$$

Anmerkung. Die nachfolgende Tabelle enthält die auf die angegebene Weise berechneten Prämiensätze, welche genommen werden müssen, wenn bei einer Versicherung von 100 Thlr. zahlbar nach Vollendung des 18ten, 21sten und 24sten Lebensjahres im Todesfalle die Prämien zum Versicherungstermine zurückgezahlt werden sollen; und zweitens eine Tabelle über die Prämien, welche bei gleicher Versicherung fürs 18te und 21ste Jahr sofort beim Tode zurückgezahlt werden sollen.

Prämien zur Versicherung von Hundert Thalern, zahlbar im 18ten, 21sten und 24sten Lebensjahre, welche, wenn das Kind stirbt, zum Versicherungstermine zurückgezahlt werden.

Alter des Kindes.	18tes Lebens- jahr.	21stes Lebensjahr.	24stes Lebensjahr.
Jahre. Geburt.	Thaler.	Thaler.	Thaler.
	3,44	2,79	2,23
1	3,94	3,09	2,47
2	4,34	3,37	2,68
3	4,80	3,69	2,91
4	5,30	4,03	3,16
5	5,88	4,42	3,43
6	6,56	4,86	3,74
7	7,02	5,24	3,92
8	7,92	5,67	4,27
9	9,07	6,29	4,67
10	10,36	7,03	5,14
11	12,10	7,92	5,65
12	14,44	9,00	6,29

Anmerkung. In dieser und der nachfolgenden Tabelle ist die zweite Dezimalstelle wegen der unberücksichtigten folgenden Ziffern überall um eine Einheit erhöht worden.

Prämien zur Versicherung von Hundert Thalern, zahlbar im 18ten oder 21sten Lebensjahre, welche, wenn das Kind stirbt, am Ende des Todesjahres zurückgezahlt werden.

Alter des Kindes.	Bei Vollendung des 18. Jahres.	Bei Vollendung des 21. Jahres.
Jahr. Geburt.	Thaler.	Thaler.
	3, 66	2, 99
1	4, 09	3, 23
2	4, 45	3, 48
3	4, 89	3, 78
4	5, 38	4, 11
5	5, 95	4, 49
6	6, 62	4, 93
7	7, 07	5, 20
8	7, 96	5, 72
9	9, 10	6, 34
10	10, 39	7, 08
11	12, 13	7, 96
12	14, 46	9, 03

§. 55.

V o n d e n L e i b r e n t e n .**A. Independente Berechnung.**

Wir stellen uns zunächst folgende Aufgabe:

Welches ist der gegenwärtige Werth w einer nachschussweisen Rente r , welche einer Person von n Jahren auf Lebenszeit gewährt wird, wenn $p\%$ berechnet werden?

Setzen wir wieder $\frac{p+100}{100} = e$, so wäre der gegenwärtige Werth der ersten Rentenzahlung, wenn sie be-

stimmt erfolgen würde nach §. 3. $\frac{r}{e}$, der zweiten $\frac{r}{e^2}$, der dritten $\frac{r}{e^3}$ u. s. f. Nun hängt aber die Zahlung der Renten davon ab, ob der Rentenempfänger zur Zahlungszeit noch lebt. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass die n jährige Person nach einem Jahre noch lebt, ist nach der in §. 43. eingeführten Bezeichnung $\frac{a_{n+1}}{a_n}$, die Wahrscheinlichkeit ferner, dass die Person noch 2, 3, 4 u. s. f. Jahre noch lebt, ist in entsprechender Weise $\frac{a_{n+2}}{a_n}$, $\frac{a_{n+3}}{a_n}$, $\frac{a_{n+4}}{a_n}$ u. s. f., mithin haben nach §. 41. die einzelnen Rentenzahlungen für den Rentenempfänger nur die Werthe $\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{r}{e}$, $\frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{r}{e^2}$, $\frac{a_{n+3}}{a_n} \cdot \frac{r}{e^3}$, u. s. f., folglich haben die gesammten Renten den Werth

$$W = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{r}{e} + \frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{r}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{a_n} \cdot \frac{r}{e^3} + \dots$$

Diese Reihe ist soweit fortzusetzen, bis sie wegen der in der angewandten Sterblichkeitstafel verschwindenden Zahlen von selbst abbricht. Nehmen wir an, die Rente betrage 1 Thlr., so ist $r=1$ zu setzen, und unsere Berechnungsformel geht über in folgende:

$$W = \frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots \right) \quad (D)$$

79. Beispiel.

Welches ist der baare Werth einer nachschussweisen Leibrente von 1 Thlr. für eine 92jährige Person, wenn die *Deparcieux'sche Sterblichkeitstafel* benutzt wird und 4% Zinsen berechnet werden?

Setzen wir die Klammer der vorigen Reihe $= k$, so haben wir

$$W = \frac{k}{a_n}$$

und zwar

$$k = \frac{a_{93}}{1,04} = 14.0,9615385 = 13,4615390$$

$$+ \frac{a_{94}}{1,04^2} = 6.0,9245562 = 5,5473372$$

$$+ \frac{a_{95}}{1,04^3} = 3.0,8889964 = 2,6669892$$

$$+ \frac{a_{96}}{1,04^4} = 1.0,8548042 = 0,8548042$$

$$22,5306696.$$

Es ist nun

$$w = \frac{k}{a_{92}} = \frac{22,5306696}{28}$$

$$= 0,8047 \text{ Thaler.}$$

B. *Recurrirende Berechnung.*

Je weiter das Alter des Rentenkäufers von 96 Jahren entfernt ist, desto mühsamer wird natürlich die Berechnung des Werthes der Leibrente. Man kann sich jedoch bei Berechnung einer Tabelle für diese Werthe die Rechnung sehr erleichtern, wenn man bei der Berechnung des Werthes für irgend ein Alter den für das um 1 Jahr höhere bereits berechneten benutzt. Es ist nämlich aus dem Vorhergehenden ohne Weiteres klar, dass der Werth w' einer Person von $(n-1)$ Jahren nach Formel (D) folgender ist:

$$w' = \frac{1}{a_{n-1}} \left(\frac{a_n}{e} + \frac{a_{n+1}}{e^2} + \frac{a_{n+2}}{e^3} + \frac{a_{n+3}}{e^4} + \dots \right)$$

oder

$$w' = \frac{1}{e \cdot a_{n-1}} \left(a_n + \frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots \right)$$

Nun ist aber wegen (D)

$$\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots = w \cdot a_n,$$

folglich erhalten wir nach Einsetzung dieses Werthes in die Formel für w' den Ausdruck

$$w' = \frac{1}{e \cdot a_{n-1}} \cdot (a_n + w \cdot a_n)$$

oder

$$w' = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot (1 + w) \cdot \frac{1}{e} \dots (E)$$

80. Beispiel.

Ausrechnung des 79. Beispieles nach der Formel (E).

Alter des Rentenkäufers.	Werth einer Leibrente im Betrage von 1 Thaler.
96 Jahre	0,0000
95 „	$\frac{1}{3} \cdot (1 + 0,0000) \cdot 0,9615 = 0,3205$
94 „	$\frac{3}{6} \cdot (1 + 0,3205) \cdot 0,9615 = 0,6349$
93 „	$\frac{6}{14} \cdot (1 + 0,6349) \cdot 0,9615 = 0,6737$
92 „	$\frac{14}{28} \cdot (1 + 0,6737) \cdot 0,9615 = 0,8047.$

Wir theilen im Nachfolgenden eine Tabelle über die baaren Werthe einer Leibrente in den verschiedenen Lebensaltern mit.

18	19,017	17,017	15,017	13,017	11,017	9,017	7,017	5,017	3,017	1,017
19	18,750	16,750	14,750	12,750	10,750	8,750	6,750	4,750	2,750	0,750
20	18,483	16,483	14,483	12,483	10,483	8,483	6,483	4,483	2,483	0,483
21	18,217	16,217	14,217	12,217	10,217	8,217	6,217	4,217	2,217	0,217
22	17,950	15,950	13,950	11,950	9,950	7,950	5,950	3,950	1,950	0,950
23	17,683	15,683	13,683	11,683	9,683	7,683	5,683	3,683	1,683	0,683
24	17,417	15,417	13,417	11,417	9,417	7,417	5,417	3,417	1,417	0,417
25	17,150	15,150	13,150	11,150	9,150	7,150	5,150	3,150	1,150	0,150
26	16,883	14,883	12,883	10,883	8,883	6,883	4,883	2,883	0,883	0,883
27	16,617	14,617	12,617	10,617	8,617	6,617	4,617	2,617	0,617	0,617
28	16,350	14,350	12,350	10,350	8,350	6,350	4,350	2,350	0,350	0,350
29	16,083	14,083	12,083	10,083	8,083	6,083	4,083	2,083	0,083	0,083
30	15,817	13,817	11,817	9,817	7,817	5,817	3,817	1,817	0,817	0,817
31	15,550	13,550	11,550	9,550	7,550	5,550	3,550	1,550	0,550	0,550
32	15,283	13,283	11,283	9,283	7,283	5,283	3,283	1,283	0,283	0,283
33	15,017	13,017	11,017	9,017	7,017	5,017	3,017	1,017	0,017	0,017
34	14,750	12,750	10,750	8,750	6,750	4,750	2,750	0,750	0,750	0,750
35	14,483	12,483	10,483	8,483	6,483	4,483	2,483	0,483	0,483	0,483
36	14,217	12,217	10,217	8,217	6,217	4,217	2,217	0,217	0,217	0,217
37	13,950	11,950	9,950	7,950	5,950	3,950	1,950	0,950	0,950	0,950
38	13,683	11,683	9,683	7,683	5,683	3,683	1,683	0,683	0,683	0,683
39	13,417	11,417	9,417	7,417	5,417	3,417	1,417	0,417	0,417	0,417
40	13,150	11,150	9,150	7,150	5,150	3,150	1,150	0,150	0,150	0,150
41	12,883	10,883	8,883	6,883	4,883	2,883	0,883	0,883	0,883	0,883
42	12,617	10,617	8,617	6,617	4,617	2,617	0,617	0,617	0,617	0,617
43	12,350	10,350	8,350	6,350	4,350	2,350	0,350	0,350	0,350	0,350
44	12,083	10,083	8,083	6,083	4,083	2,083	0,083	0,083	0,083	0,083
45	11,817	9,817	7,817	5,817	3,817	1,817	0,817	0,817	0,817	0,817
46	11,550	9,550	7,550	5,550	3,550	1,550	0,550	0,550	0,550	0,550
47	11,283	9,283	7,283	5,283	3,283	1,283	0,283	0,283	0,283	0,283
48	11,017	9,017	7,017	5,017	3,017	1,017	0,017	0,017	0,017	0,017
49	10,750	8,750	6,750	4,750	2,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
50	10,483	8,483	6,483	4,483	2,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483

Werth einer Leibrente von 1 Thaler nach Francis Baily.

Alter.	3 ⁰ / ₀	3 ¹ / ₂ ⁰ / ₀	4 ⁰ / ₀	Alter.	3 ⁰ / ₀	3 ¹ / ₂ ⁰ / ₀	4 ⁰ / ₀
4	22,390	20,319	18,559	49	14,244	13,494	12,807
5	22,597	20,518	18,749	50	13,899	13,183	12,526
6	22,726	20,647	18,877	51	13,567	12,883	12,255
7	22,791	20,720	18,953	52	13,248	12,596	11,995
8	22,813	20,754	18,996	53	12,919	12,298	11,725
9	22,815	20,770	19,022	54	12,579	11,989	11,443
10	22,766	20,742	19,008	55	12,252	11,692	11,173
11	22,664	20,665	18,949	56	11,914	11,383	10,891
12	22,506	20,536	18,844	57	11,565	11,063	10,597
13	22,343	20,403	18,734	58	11,228	10,755	10,314
14	22,175	20,266	18,620	59	10,881	10,436	10,020
15	22,002	20,123	18,502	60	10,522	10,104	9,713
16	21,823	19,976	18,380	61	10,151	9,760	9,393
17	21,666	19,849	18,275	62	9,766	9,402	9,060
18	21,505	19,717	18,167	63	9,392	9,053	8,734
19	21,339	19,581	18,054	64	9,005	8,691	8,394
20	21,168	19,441	17,938	65	8,604	8,314	8,039
21	21,020	19,321	17,841	66	8,212	7,944	7,691
22	20,867	19,197	17,740	67	7,830	7,584	7,350
23	20,711	19,071	17,637	68	7,460	7,234	7,019
24	20,550	18,940	17,530	69	7,104	6,896	6,699
25	20,386	18,805	17,420	70	6,766	6,575	6,394
26	20,217	18,667	17,306	71	6,424	6,250	6,084
27	20,043	18,524	17,188	72	6,105	5,946	5,794
28	19,864	18,377	17,066	73	5,789	5,644	5,506
29	19,681	18,225	16,940	74	5,479	5,348	5,222
30	19,492	18,069	16,810	75	5,178	5,060	4,945
31	19,298	17,907	16,675	76	4,862	4,755	4,652
32	19,099	17,741	16,535	77	4,557	4,462	4,370
33	18,893	17,568	16,390	78	4,273	4,188	4,105
34	18,682	17,390	16,240	79	3,984	3,908	3,834
35	18,464	17,207	16,084	80	3,730	3,662	3,596
36	18,240	17,017	15,922	81	3,448	3,428	3,370
37	18,009	16,820	15,755	82	3,269	3,216	3,164
38	17,742	16,590	15,556	83	3,031	2,984	2,939
39	17,467	16,352	15,349	84	2,757	2,717	2,679
40	17,183	16,105	15,133	85	2,490	2,457	2,424
41	16,889	15,848	14,907	86	2,240	2,212	2,185
42	16,585	15,581	14,673	87	2,023	2,000	1,977
43	16,271	15,304	14,427	88	1,747	1,728	1,711
44	15,946	15,016	14,171	89	1,474	1,460	1,446
45	15,609	14,716	13,904	90	1,208	1,198	1,187
46	15,260	14,405	13,625	91	0,955	0,948	0,941
47	14,925	14,105	13,357	92	0,721	0,716	0,712
48	14,578	13,794	13,076	93	0,485	0,483	0,481

C. Leibrenten verbundener Personen, zahlbar bis zum Tode des Zuerststerbenden.

Wir wollen uns zunächst zwei Personen denken, welche sich gemeinschaftlich eine Rente erwerben wollen, die so lange gezahlt wird, als noch beide leben. Ist die eine Person n Jahre alt, die zweite hingegen p Jahre, so ist die mathematische Hoffnung auf den Genuss der ersten Rente r

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+1}}{a_p} \cdot r,$$

folglich ihr gegenwärtiger Werth

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+1}}{a_p} \cdot \frac{r}{e},$$

entsprechend ist der gegenwärtige Werth der zweiten Rente

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{a_{p+1}}{a_p} \cdot \frac{r}{e^2}, \text{ u. s. f.}$$

mithin der Gesamtwertb sämtlicher Renten, wenn wir wieder $r=1$ setzen,

$$w = \frac{1}{a_n \cdot a_p} \left(\frac{a_{n+1} \cdot a_{p+1}}{e} + \frac{a_{n+2} \cdot a_{p+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3} \cdot a_{p+3}}{e^3} + \dots \right) \text{.. (F).}$$

Für zwei Personen, von denen jede ein Jahr jünger ist, erhalten wir entsprechend

$$w' = \frac{1}{a_{n-1} \cdot a_{p-1}} \left(\frac{a_n \cdot a_p}{e} + \frac{a_{n+1} \cdot a_{p+1}}{e^2} + \frac{a_{n+2} \cdot a_{p+2}}{e^3} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{a_{n-1} \cdot a_{p-1}} \cdot \frac{1}{e} \left(a_n \cdot a_p + \frac{a_{n+1} \cdot a_{p+1}}{e} + \frac{a_{n+2} \cdot a_{p+2}}{e^2} + \dots \right)$$

und weil nach (F)

$$\frac{a_{n+1} \cdot a_{p+1}}{e} + \frac{a_{n+2} \cdot a_{p+2}}{e^2} + \dots = w \cdot a_n \cdot a_p$$

ist, so haben wir

$$w' = \frac{1}{a_{n-1} \cdot a_{p-1}} \cdot \frac{1}{e} (a_n \cdot a_p + w \cdot a_n \cdot a_p)$$

$$\text{oder } w' = (1 + w) \cdot \frac{a_n \cdot a_p}{a_{n-1} \cdot a_{p-1}} \cdot \frac{1}{e} \dots \text{ (G),}$$

ein Ausdruck, welcher dem unter (E) aufgestellten ganz analog ist.

81. Beispiel.

Welches ist der baare Werth einer Rente von 1 Thlr. für zwei Personen von 92 und 80 Jahren, welche so lange gezahlt wird, als noch beide leben, mit Benutzung der Deparcieux'schen Sterblichkeitstafel und bei 4% Zinsen?

$$95 \text{ und } 83 \text{ Jahre,} \quad = 0,0000$$

$$94 \text{ „ } 82 \text{ „} \quad = (1 + 0,000) \cdot \frac{1.492}{3.590} \cdot 0,9615 = 0,2904$$

$$93 \text{ „ } 81 \text{ „} \quad = (1 + 0,2904) \cdot \frac{3.590}{6.697} \cdot 0,9615 = 0,5252$$

$$92 \text{ „ } 80 \text{ „} \quad = (1 + 0,5252) \cdot \frac{6.697}{14.812} \cdot 0,9615 = 0,5395.$$

Der baare Werth einer solchen Rente ist also 0,5395 Thlr., von 100 Thlr. also 53,95 Thlr.

Anmerkung. Bei drei und mehreren Personen von $m, n, p, \dots$ Jahren ist die Berechnung ganz analog und man erhält, wie sich jetzt leicht übersehen lässt, den der Formel (G) entsprechenden Ausdruck:

$$w' = (1 + w) \frac{a_m \cdot a_n \cdot a_p \dots}{a_{m+1} \cdot a_{n+1} \cdot a_{p+1} \dots} \cdot \frac{1}{e} \dots \quad (H).$$

D. Leibrenten verbundener Personen, zahlbar bis zum Tode des Zuletzststerbenden.

Bei zwei Personen von n und p Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch nicht beide nach einem Jahre gestorben sind nach §. 46. (f.)

$$1 - \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \left(1 - \frac{a_{p+1}}{a_p}\right).$$

Da nun von dieser Wahrheinlichkeit der Genuss der ersten Rente r abhängig ist, so ist ihr gegenwärtiger Werth

$$\left[1 - \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \left(1 - \frac{a_{p+1}}{a_p}\right)\right] \cdot \frac{r}{e}.$$

Dieselbe Betrachtung in Betreff der übrigen Renten führt in Betreff des Gesamtwertes der Leibrente für $r = 1$ zu folgender Formel

$$w = \left[1 - \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \left(1 - \frac{a_{p+1}}{a_n} \right) \right] \cdot \frac{1}{e} + \\ \left[1 - \left(1 - \frac{a_{n+2}}{a_n} \right) \left(1 - \frac{a_{p+2}}{a_n} \right) \right] \cdot \frac{1}{e^2} + \dots (J).$$

82. Beispiel.

Welches ist der baare Werth einer Leibrente von 1 Thlr, für zwei Personen von 92 und 90 Jahren, welche so lange gezahlt wird, als überhaupt noch eine von beiden Personen lebt?

Wir haben hier $a_n = 28$, $a_p = 80$, $a_{n+1} = 14$, $a_{p+1} = 50$, u. s. f., also

$$1 - \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \left(1 - \frac{a_{p+1}}{a_p} \right) = \\ 1 - \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_p - a_{p+1}}{a_p} = 1 - \frac{14}{28} \cdot \frac{30}{80} = \frac{13}{16}; \\ 1 - \frac{a_n - a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{a_p - a_{p+2}}{a_p} = 1 - \frac{22}{28} \cdot \frac{52}{80} = \frac{137}{280}; \\ 1 - \frac{a_n - a_{n+3}}{a_n} \cdot \frac{a_p - a_{p+3}}{a_p} = 1 - \frac{25}{28} \cdot \frac{66}{80} = \frac{59}{224}; \\ 1 - \frac{a_n - a_{n+4}}{a_n} \cdot \frac{a_p - a_{p+4}}{a_p} = 1 - \frac{27}{28} \cdot \frac{74}{80} = \frac{121}{1120}; \\ 1 - \frac{a_n - a_{n+5}}{a_n} \cdot \frac{a_p - a_{p+5}}{a_p} = 1 - \frac{77}{80} = \frac{3}{80}; \\ 1 - \frac{a_n - a_{n+6}}{a_n} \cdot \frac{a_p - a_{p+6}}{a_p} = 1 - \frac{79}{80} = \frac{1}{80}.$$

Setzen wir diese Werthe in die Formel (J) ein, so erhalten wir

$$w = \frac{13}{16} \cdot \frac{1}{1,04} = 0,78125 \\ + \frac{137}{280} \cdot \frac{1}{1,04^2} = 0,45237 \\ + \frac{59}{224} \cdot \frac{1}{1,04^3} = 0,23415 \\ + \frac{121}{1120} \cdot \frac{1}{1,04^4} = 0,09325$$

$$+ \frac{3}{80} \cdot \frac{1}{1,04^5} = 0,03082$$

$$+ \frac{1}{80} \cdot \frac{1}{1,04^6} = 0,00988$$

$$w = 1,60172 \text{ Thaler.}$$

Anmerkung. Die entsprechende Rechnung für mehr als zwei Personen dürfte ohne Weiteres klar sein.

E. Aufgeschobene Leibrenten.

Wird eine jetzt gekaufte Rente erst nach k Jahren gezahlt, so sind die k ersten Glieder der Klammer in Formel (D), da diese die baaren Werthe der in den k ersten Jahren gezahlten Renten ausdrücken, offenbar gleich Null und wir erhalten demnach, wenn der Rentenkäufer jetzt n Jahre alt ist, als baaren Werth der Rente

$$w = \frac{1}{a_n} \cdot \left(\frac{a_{n+k+1}}{e^{k+1}} + \frac{a_{n+k+2}}{e^{k+2}} + \dots \right)$$

oder

$$w = \frac{1}{a_n \cdot e^k} \cdot \left(\frac{a_{n+k+1}}{e} + \frac{a_{n+k+2}}{e^2} + \dots \right) \dots (K).$$

Multiplicirt und dividirt man den Ausdruck rechts mit a_{n+k} , und schreibt also

$$w = \frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{1}{e^k} \cdot \frac{1}{a_{n+k}} \left(\frac{a_{n+k+1}}{e} + \frac{a_{n+k+2}}{e^2} + \dots \right) \dots (L)$$

so kann man sagen: Um den baaren Werth einer k Jahre aufgeschobenen Leibrente für eine Person von n Jahren zu berechnen, hat man nur den Werth einer sofort beginnenden Rente für eine Person von $(n+k)$ Jahren mit dem Faktor

$$\frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{1}{e^k}$$

zu multipliciren.

83. B e i s p i e l.

Welches ist der baare Werth einer 10 Jahre lang aufgeschobenen Leibrente für eine Person von 82 Jahren?

Nach dem 79. Beispiele ist der baare Werth einer sofort beginnenden Leibrente für eine Person von 92 Jahren gleich 0,8047 Thaler. Da nun im gegenwärtigen Falle $n = 82$ und $k = 10$, folglich nach Deparcieux

$$\frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{1}{e^k} = \frac{a_{92}}{a_{82}} \cdot \frac{1}{1,04^{10}} = \frac{28}{590} \cdot 0,6755642$$

ist, so erhalten wir für unseren gesuchten Werth

$$w = \frac{28}{590} \cdot 0,6755642 \cdot 0,8047 \\ = 0,0258 \text{ Thaler.}$$

F. *Temporäre Leibrenten.*

Wird nach dem baaren Werthe einer blos k Jahre hindurch zahlbaren Leibrente für eine n jährige Person gefragt, so leuchtet von selbst ein, dass man diesen Werth findet, wenn man vom Werthe einer sofort beginnenden lebenslänglichen Leibrente den Werth einer k Jahre aufgeschobenen subtrahirt. Es fallen nämlich in der Klammer der Formel (D) alle Glieder fort, welche auf das Glied

$\frac{a_{n+k}}{e^k}$ folgen. Die Formel für den gesuchten Werth ist demnach

$$w = \frac{1}{a_n} \cdot \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots + \frac{a_{n+k}}{e^k} \right) \dots \quad (M).$$

84. B e i s p i e l.

Welches ist der baare Werth einer zwei Jahre hindurch zahlbaren Rente für eine Person von 92 Jahren?

Der baare Werth einer sofort beginnenden Leibrente für eine Person von 92 Jahren ist nach dem 80. Beispiele:

$$x = 0,8047$$

und der einer zwei Jahre lang aufgeschobenen nach demselben Beispiele und der unter E. angegebenen Regel

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{a_{94}}{a_{92}} \cdot \frac{1}{e^2} \cdot 0,6349 \\
 &= \frac{6}{28} \cdot 0,9245562 \cdot 0,6349 \\
 &= 0,0199.
 \end{aligned}$$

Subtrahiren wir y von x , so erhalten wir

$$\begin{aligned}
 w &= 0,8047 - 0,0199 \\
 &= 0,7848 \text{ Thaler}
 \end{aligned}$$

als den gesuchten Werth der zweijährigen Leibrente.

Anmerkung. Die Berechnung der beiden letzten Leibrenten für zwei und mehr Personen ist nach den früheren analogen Untersuchungen jetzt leicht zu übersehen und gehen wir deshalb nicht weiter darauf ein. —

G. *Erwerbung aufgeschobener Leibrenten oder Pensionen durch vorgängige Prämienzahlung.*

Zahlt Jemand von seinem n ten Lebensjahre ab sofort und die nächstfolgenden k Jahre hindurch eine bestimmte Summe s an eine Rentenbank, um sich dadurch eine ein Jahr nach der letzten Prämienzahlung (d. h. also im $(n+k+1)$ sten Lebensjahre) beginnende Leibrente r zu sichern, so haben wir, um eine Relation zwischen den genannten Grössen zu erlangen, sowohl den baaren Werth der Leistung des Rentenkäufers, als den der Gegenleistung der Rentenbank zu ermitteln und beide Werthe gleich zu setzen. Beginnen wir mit dem baaren Werthe der Leistung des Rentenkäufers, so ist dieser, wenn wir vorläufig von der ersten Einzahlung der Summe s absehen, offenbar gleich dem baaren Werthe w einer temporären k Jahre hindurch zahlbaren Rente; und wenn wir die erste Zahlung zurechnen,

$$= s + w.$$

Der baare Werth der Gegenleistung der Bank ist aber, wie sofort erhellt, gleich dem baaren Werthe w' einer k Jahre aufgeschobenen Leibrente. Soll nun auf keiner Seite ein Nachtheil sein, so haben wir

$$s + w = w'$$

zu setzen. Nun ist aber nach (M)

$$w = \frac{s}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots + \frac{a_{n+k}}{e^k} \right)$$

und nach (L)

$$w' = \frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{1}{e^k} \cdot \frac{1}{a_{n+k}} \left(\frac{a_{n+k+1}}{e} + \frac{a_{n+k+2}}{e^2} + \dots \right)$$

so dass wir nach Einsetzung dieser Werthe die Formel erhalten:

$$s \left\{ 1 + \frac{1}{a_n} \frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots + \frac{a_{n+k}}{e^k} \right\} \\ = \frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{1}{e^k} \cdot \frac{1}{a_{n+k}} \left(\frac{a_{n+k+1}}{e} + \frac{a_{n+k+2}}{e^2} + \dots \right) \dots (N).$$

Anmerkung. Diese Berechnung kommt vorzugsweise in Anwendung bei der Bestimmung der Pensionen, die Beamten im Falle der Dienstunfähigkeit gegen einen vorher gezahlten Beitrag gewährt werden. Die Grösse k wird hier durch das erfahrungsmässig mittlere Lebensalter, in welchem für eine bestimmte Beamten-gattung die Dienstunfähigkeit eintritt, bestimmt.

85. Beispiel.

Welchen Pensionsbeitrag hat das Mitglied einer Beamtenklasse, bei welcher erfahrungsmässig die mittlere Zeit der Dienstunfähigkeit in das 55ste Lebensjahr fällt, von seinem 30. Lebensjahre an zu zahlen, wenn demselben vom 56sten Lebensjahre ab bis zum Tode eine jährliche Pension von 100 Thalern gegeben werden soll?

In der Formel (N) ist hier gegeben, $n = 30$, $k = 25$, ferner wenn wir 4% annehmen, $e = 1,04$ und s ist gesucht.

Wir suchen zunächst den Ausdruck

$$\frac{1}{a_{n+k}} \left(\frac{a_{n+k+1}}{e} + \frac{a_{n+k+2}}{e^2} + \dots \right) = \alpha,$$

indem wir uns der Tabelle auf pag. 122 bedienen. Es ist nämlich nach Formel (D) der Ausdruck (α) der baare Werth einer Rente von 1 Thlr. für eine Person von $n + k = 55$ Jahren, und wir finden in erwähneter Tabelle

$$\alpha = 11,173.$$

Dieser Werth ist nun noch zu multipliciren mit

$$\frac{a_{n+k}}{a_n} \cdot \frac{1}{e^k} = \frac{3631}{5005} \cdot 0,3751168 \text{ (vergl. Taf. V u. II.)}$$

Bezeichnen wir demnach die ganze rechte Seite der Formel (N) mit (β) , so haben wir

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{3631}{5005} \cdot 0,3751168 \cdot 11,173 \\ &= 3,0406. \end{aligned}$$

Gehen wir nun zurück zu dem Ausdrucke auf der linken Seite

$$\frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots + \frac{a_{n+k}}{e^k} \right) = \gamma,$$

so finden wir dessen Werth wegen (M), wenn wir vom Werthe einer sofort (im 30sten Jahre) beginnenden Rente, d. i. nach Tabelle auf pag. 122 von 16,810, den Werth einer $k=25$ Jahre aufgeschobenen subtrahiren. Letzterer Werth ist aber wegen (L) gleich dem vorhergefundenen (β) . Es ist somit

$$\begin{aligned} \gamma &= 16,810 - 3,0406 \\ &= 13,769. \end{aligned}$$

Wir erhalten demnach für die ganze Gleichung (N)

$$s(1 + 13,769) = 3,0406,$$

$$\text{also } s = \frac{3,0406}{14,769} = 0,20588.$$

Das wäre der jährliche Pensionsbeitrag für eine jährliche Pension von 1 Thlr., für 100 Thlr. wäre also jährlich 20,588 Thaler zu entrichten.

Anmerkung. Aus diesem Beispiele ersieht man, welche ungemeinen Vortheile die preussische Beamten-Pensionskasse ihren Interessenten gewährt, da ganz unter den eben berührten Verhältnissen einem Beamten nach 25jähriger Dienstzeit schon gegen einen jährlichen Beitrag von 6 Thlr. 24 Sgr. eine Pension von 200 Thalern gesichert wird. —

Werth einer Leibrente von 1 Thaler.

Nach Deparcieux' Sterblichkeitstafel und für 4% berechnet
von Bäntsch und Dannenberger.

Alter.	Thaler.	Alter.	Thaler.	Alter.	Thaler.
1	17,2236	33	16,4379	65	8,14204
2	17,8274	34	16,2810	66	7,83171
3	18,2606	35	16,1180	67	7,51430
4	18,5793	36	15,9487	68	7,18956
5	18,7706	37	15,7691	69	6,85722
6	18,8999	38	15,5787	70	6,51700
7	18,9771	39	15,3768	71	6,17217
8	19,0216	40	15,1629	72	5,82668
9	19,0358	41	14,9435	73	4,49284
10	19,0248	42	14,7147	74	5,18271
11	18,9788	43	14,4796	75	4,88930
12	18,9020	44	14,2378	76	4,62493
13	18,8025	45	13,9890	77	4,36685
14	18,6858	46	13,7328	78	4,11232
15	18,5577	47	13,4688	79	3,86168
16	18,4278	48	13,1966	80	3,62946
17	18,3028	49	12,9051	81	3,39743
18	18,1835	50	12,6143	82	3,17289
19	18,0694	51	12,3141	83	2,95709
20	17,9613	52	12,0028	84	2,74526
21	17,8562	53	11,7011	85	2,52736
22	17,7510	54	11,3993	86	2,29312
23	17,6457	55	11,1035	87	2,02157
24	17,5405	56	10,8112	88	1,72394
25	17,4354	57	10,5195	89	1,43651
26	17,3304	58	10,2254	90	1,18494
27	17,2257	59	9,92642	91	0,97175
28	17,1144	60	9,63082	92	0,80467
29	16,9960	61	9,33675	93	0,67370
30	16,8596	62	9,04148	94	0,63486
31	16,7249	63	8,74537	95	0,32051
32	16,5857	64	8,44551	96	0,00000

§. 56.

Ueber Wittwenkassen.

Die Einrichtung der Wittwenkassen ist im Allgemeinen folgende: Von zwei Eheleuten zahlt der Mann bei der Verheirathung eine Einlage und ausserdem sofort und später alljährlich einen Beitrag B bis zu seinem Tode; wogegen die Wittwenkasse seiner Wittwe bis zu deren Tode eine nachschussweise Pension P auszahlt. Um eine Berechnungsformel zwischen den drei Grössen E , B , P und dem angewandten Zinsfusse p , wo wir wieder $\frac{p+100}{100} = e$ setzen, zu finden, suchen wir die baaren Werthe der beiderseitigen Leistungen zu ermitteln. Für den einsteuernden Ehemann besteht der baare Werth der Leistung zunächst in der Einlage E , dem ersten Beitrage B und in der Summe der baaren Werthe der mathematischen Hoffnungen sämmtlicher späteren Beiträge. Diese Hoffnungen hängen aber ab von der Wahrscheinlichkeit, dass beide Eheleute an jedem Zahlungstermine noch leben. Ist nun der Mann n Jahre, die Frau hingegen k Jahre alt, so entsprechen den nachfolgenden Beiträgen die Wahrscheinlichkeiten

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k}, \quad \frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k}, \quad \text{u. s. f.},$$

mithin ist die Gesamtleistung des Mannes

$$E + B + \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k} \cdot \frac{B}{e} + \frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k} \cdot \frac{B}{e^2} + \dots$$

oder

$$X = E + B \left\{ 1 + \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k} \cdot \frac{1}{e} + \frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^2} + \dots \right\}$$

Die Gegenleistung der Wittwenkasse besteht nun in der Summe der baaren Werthe der mathematischen Hoffnungen sämmtlicher an die Wittwe zu zahlenden Pensionen. Diese Hoffnungen hängen aber ab von der Wahrscheinlichkeit, dass nach 1, 2, 3 u. s. w. Jahren der Mann gestorben, die Frau aber noch am Leben sei. Diese Wahrscheinlichkeiten sind nun

$$\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k}, \left(1 - \frac{a_{n+2}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k} \text{ u. s. f.,}$$

es ist somit der baare Werth der Leistung Seitens der Wittwenkasse

$$Y = P. \left\{ \begin{aligned} &\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k} \cdot \frac{1}{e} \dots \\ &+ \left(1 - \frac{a_{n+2}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^2} \dots \\ &+ \left(1 - \frac{a_{n+3}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+3}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^3} \dots \\ &+ \dots \end{aligned} \right\}$$

Setzen wir $X = Y$, so erhalten wir

$$E + B. \left\{ \begin{aligned} &1 + \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k} \cdot \frac{1}{e} \dots \\ &+ \frac{a_{n+2}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^2} \dots \\ &+ \frac{a_{n+3}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+3}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^3} \dots \\ &+ \dots \end{aligned} \right\}$$

$$= P. \left\{ \begin{aligned} &\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k} \cdot \frac{1}{e} \dots \\ &+ \left(1 - \frac{a_{n+2}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+2}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^2} \dots \\ &+ \left(1 - \frac{a_{n+3}}{a_n}\right) \cdot \frac{a_{k+3}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^3} \dots \\ &+ \dots \end{aligned} \right\} \dots (R)$$

Die eingeklammerten Reihen sind soweit fortzusetzen, bis sie nach den Sterblichkeitstafeln von selbst abbrechen.

Sind bei der Wittwenkasse noch sogenannte Gefahrjahre ausbedungen, d. h. ist festgesetzt, dass, wenn der Mann binnen der nächsten i Jahre stirbt, keine Pensionen gezahlt werden, sondern nur, wenn jener im $(i+1)$ sten Jahre oder später stirbt, so hängt die Zahlung der ersten Pension am Ende des $(i+1)$ sten Jahres davon ab, erstlich, dass der

Mann bis zum Ende des i ten Jahres am Leben, aber im Laufe des $(i + 1)$ ten Jahres gestorben sei; ferner aber davon, dass die Frau zur Zeit der Zahlung noch am Leben sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann am Ende des i ten Jahres noch lebt, ist

$$\frac{a_{n+i}}{a_n},$$

dass derselbe im Laufe des nächsten Jahres stirbt, davon ist die Wahrscheinlichkeit

$$1 - \frac{a_{n+i+1}}{a_{n+i}},$$

dass die Frau am Ende des $(i + 1)$ ten Jahres noch lebt, davon ist endlich die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{a_{k+i+1}}{a_k},$$

mithin ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei berührten Ereignisse gleichzeitig eintreffen,

$$\frac{a_{n+i}}{a_n} \cdot \left(1 - \frac{a_{n+i+1}}{a_{n+i}}\right) \cdot \frac{a_{k+i+1}}{a_k} =$$

$$\frac{a_{n+i} - a_{n+i+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+i+1}}{a_k}.$$

Wenn wir in dieser Weise weiter schliessen, so erhalten wir für die rechte Seite der Formel (R)

$$Y=P. \left\{ \begin{aligned} &\frac{a_{n+i} - a_{n+i+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+i+1}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^{i+1}} \\ &+ \frac{a_{n+i+1} - a_{n+i+2}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+i+2}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^{i+2}} \\ &+ \frac{a_{n+i+2} - a_{n+i+3}}{a_n} \cdot \frac{a_{k+i+3}}{a_k} \cdot \frac{1}{e^{i+3}} \\ &+ \dots \end{aligned} \right\}$$

Anmerkung. Bei der Allgemeinen Preussischen Beamten-Wittwenkasse sind 4 Gefahrjahre, es werden aber gleichwohl, wenn der Mann während dieser Zeit stirbt, der Wittwe steigende Parcellen, jenachdem der Todestag in's erste, zweite, dritte oder vierte Jahr fällt, von den versicherten Pensionen alljährlich gewährt.

§. 57.

Lebensversicherungs- und Sterbekassen-Rechnung.

A. Bei jährlicher Prämienzahlung.

Unter Lebensversicherung versteht man den Abschluss eines Contraktes zwischen einer Person und einem Versicherungsinstitute, nach welchem letzteres gegen Erlegung einer bestimmten Summe oder durch jährliche Prämienzahlung Seitens des Versicherten den Erben des letzteren nach dessen Tode eine bestimmte Summe auszahlt. Um die Berechnungsformel für diese Versicherungstert zu finden, stellen wir folgende allgemeine Aufgabe:

Welche Prämie muss eine Person von n Jahren jährlich pränumerando zahlen, damit den Erben derselben nach dem Tode des Versicherten ein Kapital von 1 Thaler ausgezahlt werden kann?

Wir haben natürlich sowohl die Leistungen des Versicherten als die der Bank ins Auge zu fassen und die baaren Werthe beider einander gleich zu setzen. Nehmen wir zu dem Ende an, dass a_n Personen sich versichern und jede die Prämie P Thlr. jährlich zahle, so besteht die erste der Bank zufließende Zahlung in $a_n \cdot P$ Thalern. Leben nach einem Jahre noch a_{n+1} Personen, so zahlen diese $a_{n+1} \cdot P$ Thaler, von denen der gegenwärtige Werth $\frac{a_{n+1} \cdot P}{e}$ Thlr. ist. Bei entsprechender Bezeichnung betragen die gegenwärtigen Werthe aller nachfolgenden Prämienzahlungen $\frac{a_{n+2} \cdot P}{e^2}$, $\frac{a_{n+3} \cdot P}{e^3}$, u. s. f., mithin ist die Gesamtleistung aller Versicherten, wenn wir den gemeinschaftlichen Faktor P ausscheiden,

$$X = P \left(a_n + \frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots \right).$$

(Die Reihe bricht natürlich mit der Sterblichkeitstabelle ab.)

Untersuchen wir nun die Leistungen des Versicherungsinstituts, so hat letzteres an die im ersten Versicherungsjahre Gestorbenen am Ende dieses Jahres je 1 Thlr. zu bezahlen, d. i. in Summa $(a_n - a_{n+1})$ Thaler. Diese sind heute werth $\frac{a_n - a_{n+1}}{e}$ Thaler. In entsprechender Weise haben

die nachfolgenden Zahlungen die gegenwärtigen Werthe

$$\frac{a_{n+1} - a_{n+2}}{e^2}, \quad \frac{a_{n+2} - a_{n+3}}{e^3} + \dots,$$

so dass die Gesamtleistung der Versicherungsbank gegenwärtig den Werth

$$Y = \frac{a_n - a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+1} - a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+2} - a_{n+3}}{e^3} + \dots,$$

welche Reihe ebenfalls mit der Sterblichkeitstabelle abbricht. Soll auf beiden Seiten kein Nachtheil sein, so muss $X = Y$ sein; wir erhalten deshalb die Formel

$$P \left(a_n + \frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) = \frac{a_n - a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+1} - a_{n+2}}{e^2} + \dots \quad (0)$$

Um die Berechnung des Werthes von P aus dieser Formel zu erleichtern, geben wir ihr noch eine etwas andere Form. Dividiren wir nämlich die einzelnen Glieder der Unterschiede auf der rechten Seite durch ihre Nenner und dividiren hierauf beide Seiten durch a_n , so erhalten wir, wie sich leicht übersehen lässt

$$\begin{aligned} & P \left[1 + \frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) \right] \\ &= \frac{1}{a_n} \left[\left(\frac{a_n}{e} + \frac{a_{n+1}}{e^2} + \dots \right) - \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) \right] \\ &= \frac{1}{e} + \frac{1}{e \cdot a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) - \frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{e} + \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \cdot \frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots \right) \end{aligned}$$

oder endlich

$$\begin{aligned} & P \left(1 + \frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots \right) \right) \\ &= \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{e} \right) \cdot \frac{1}{a_n} \cdot \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \frac{a_{n+3}}{e^3} + \dots \right) \dots (P). \end{aligned}$$

86. Beispiel.

Welche Prämie muss eine 32jährige Person jetzt gleich und künftig alljährlich bis zum Tode zahlen, um ihren Erben eine bei ihrem Ableben zahlbare Summe von 100 Thlr. zu sichern?

Mit Rücksicht auf (D) finden bei 4 % Zinsen in der Leibrententabelle auf pag. 122.

$$\frac{1}{a_n} \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) = 16,535,$$

folglich geht unsere Formel (P) über in folgende:

$$P(1 + 16,535) = 0,9615385 - 0,0384615 \cdot 16,535$$

$$\text{oder } P \cdot 17,535 = 0,9615385 - 0,63597 \\ = 0,32557,$$

$$\text{also } P = \frac{0,32557}{17,535} = 0,018586.$$

Bei einer Versicherung von 100 Thaler wäre demnach eine jährliche Prämie von 1,8586 Thlr. nöthig.

Nehmen wir 3 % Zinsen an, so haben wir nach den angezogenen Tabellen:

$$P(1 + 19,298) = 0,9708738 - 0,0291262 \cdot 19,298 \\ = 0,40879,$$

$$\text{also } P = \frac{0,40879}{20,298} = 0,02014.$$

Bei einer Versicherungssumme von 100 Thalern ist also eine jährliche Prämie von 2,014 Thaler = 2 Thlr. — Sgr. 6 Pf. nöthig. —

Zu der eben berechneten Prämie muss natürlich noch ein Verwaltungskostenaufschlag kommen.

Um auch für ausserordentliche Unglücksfälle gedeckt zu sein, nehmen die Versicherungsinstitute gewöhnlich auch einen anderweiten Aufschlag, lassen aber die Versicherten an dem hierdurch erzielten Gewinne mit participiren. — Wir theilen im Nachfolgenden die Prämiensätze verschiedener Versicherungsinstitute in aufsteigender Ordnung mit:

Vergleichende Tabelle der jährlichen Prämien zur Versicherung

Alter des Versi- cherten.	Normal- Prämien- satz *).	Medical, Invalid and General Life Assurance So- ciety in Lon- don.	Janus in Hamburg.	Frankfurter Lebens- versicherungs- Gesellschaft.	Crown Life Assurance Company in London.
Jahre.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.	Rth. Sgr. Sch.
21	1 24 4.	1 27 6**)	1 29 3.	2 — 4.	2 1 3.
22	1 25 7.	1 28 11.	2 — 9.	2 1 9.	2 2 8.
23	1 26 10.	2 — 3.	2 2 3.	2 3 4.	2 4 2.
24	1 28 3.	2 1 9.	2 4 —	2 4 9.	2 5 8.
25	1 29 9.	2 3 2.	2 5 9.	2 4 6.	2 7 3.
26	2 1 4.	2 4 8.	2 7 6.	2 7 9.	2 8 9.
27	2 2 11.	2 6 3.	2 9 3.	2 9 8.	2 10 5.
28	2 4 6.	2 7 9.	2 11 —	2 11 —	2 12 2.
29	2 6 3.	2 9 5.	2 13 —	2 13 —	2 13 9.
30	2 8 2.	2 11 2.	2 15 —	2 14 9.	2 15 6.
31	2 10 3.	2 13 —	2 17 —	2 16 9.	2 17 3.
32	2 12 7.	2 14 11.	2 19 —	2 18 8.	2 19 2.
33	2 15 1.	2 16 11.	2 21 —	2 20 9.	2 21 —
34	2 17 9.	2 19 —	2 23 3.	2 22 9.	2 23 —
35	2 20 8.	2 21 3.	2 25 9.	2 25 —	2 25 2.
36	2 23 8.	2 23 8.	2 28 3.	2 27 4.	2 27 3.
37	2 26 10.	2 26 —	3 — 9.	3 — —	2 29 9.
38	3 — 2.	2 28 9.	3 3 6.	3 2 9.	3 1 9.
39	3 1 8.	3 1 5.	3 6 6.	3 5 6.	3 4 3.
40	3 7 3.	3 4 3.	3 9 6.	3 8 6.	3 6 11.
41	3 10 11.	3 7 3.	3 12 6.	3 11 6.	3 9 8.
42	3 14 10.	3 10 6.	3 15 6.	3 14 9.	3 12 6.
43	3 18 11.	3 13 9.	3 18 6.	3 18 4.	3 15 9.
44	3 23 2.	3 17 5.	3 22 —	3 22 3.	3 19 —
45	3 27 8.	3 21 2.	3 25 6.	3 26 —	3 22 6.
46	4 2 4.	3 25 2.	3 29 3.	4 — 4.	3 26 3.
47	4 7 3.	3 29 3.	4 3 6.	4 4 6.	4 — 2.
48	4 12 6.	4 3 9.	4 8 —	4 9 4.	4 4 5.
49	4 17 11.	4 8 5.	4 13 —	4 14 6.	4 8 9.
50	4 23 10.	4 13 5.	4 18 6.	4 19 6.	4 13 5.

*) Diese Prämien sind nach der Sterblichkeitstafel für Sachsen (vergl. Dr. Heym, die Grabekassen. Leipz. 1850.) mit 3 % berechnet.

**) Nach der in England gewöhnlich gebrauchten Northamptoner Sterblichkeitstafel ergibt die Berechnung der jährlichen Prämie für eine 21jährige Person bei 3 % Zinsen 2 Thlr. 6 Sgr. 9 Pf. Es ist nämlich in England die Sterblich-

von 100 Thalern zahlbar beim Tode des Versicherten.

Alter des Ver- sicher- ten.	Gothaer Lebensver- sicherungs- bank.			Leipziger Lebensver- sicherungs- Gesellschaft.			Londoner Union Assecuranz- Gesellschaft.			Berlinische Lebens- versicherungs- Gesellschaft.			Deutsche Lebens- versicherungs- Gesellschaft in Lübeck.		
Jahre.	Rth.	Sgr.	S.	Rth.	Sgr.	S.	Rth.	Sgr.	S.	Rth.	Sgr.	S.	Rth.	Sgr.	S.
21	2	4	5.	2	4	5.	2	6	9.	2	6	9.	2	6	9.
22	2	6	—	2	6	1.	2	7	11.	2	8	—	2	8	—
23	2	7	6.	2	7	6.	2	9	5.	2	9	5.	2	9	4.
24	2	9	—	2	8	11.	2	10	6.	2	10	8.	2	10	8.
25	2	10	8.	2	10	8.	2	12	—	2	12	2.	2	12	1.
26	2	12	3.	2	12	4.	2	13	6.	2	13	8.	2	13	7.
27	2	13	10.	2	13	11.	2	15	—	2	15	2.	2	15	—
28	2	15	6.	2	15	7.	2	16	6.	2	16	8.	2	16	8.
29	2	17	2.	2	17	3.	2	18	5.	2	18	5.	2	18	4.
30	2	19	—	2	19	—	2	19	11.	2	20	2.	2	20	1.
31	2	20	11.	2	21	—	2	21	9.	2	21	11.	2	21	10.
32	2	22	11.	2	22	11.	2	23	8.	2	23	8.	2	23	8.
33	2	24	11.	2	24	11.	2	25	6.	2	25	8.	2	25	7.
34	2	26	11.	2	26	11.	2	27	9.	2	27	8.	2	27	8.
35	2	29	1.	2	29	1.	2	29	8.	2	29	9.	2	29	9.
36	3	1	4.	3	1	5.	3	1	11.	3	2	—	3	2	—
37	3	3	8.	3	3	8.	3	4	2.	3	4	3.	3	4	3.
38	3	6	2.	3	6	2.	3	6	9.	3	6	9.	3	6	8.
39	3	8	9.	3	8	9.	3	9	5.	3	9	3.	3	9	3.
40	3	11	7.	3	11	7.	3	12	—	3	12	—	3	12	—
41	3	14	7.	3	14	7.	3	14	8.	3	14	8.	3	14	8.
42	3	17	10.	3	17	10.	3	17	8.	3	17	6.	3	17	6.
43	3	21	3.	3	21	3.	3	20	8.	3	20	6.	3	20	6.
44	3	24	10.	3	24	10.	3	23	8.	3	23	8.	3	23	7.
45	3	28	10.	3	28	11.	3	27	—	3	27	—	3	26	10.
46	4	3	—	4	3	1.	4	—	5.	4	—	4.	4	—	3.
47	4	7	5.	4	7	5.	4	3	9.	4	3	11.	4	3	11.
48	4	12	—	4	12	—	4	7	6.	4	7	8.	4	7	8.
49	4	16	11.	4	16	11.	4	10	8.	4	11	9.	4	11	9.
50	4	22	—	4	22	—	4	16	2.	4	16	—	4	15	11.

keit bedeutender als in Deutschland, indem z.B. die mittlere Lebensdauer einer 20jährigen Person in England bis zum 53., in Deutschland hingegen bis zum 57. Lebensjahre reicht. Es steht deshalb dahin, ob die Medical etc. Society bei ihrem niedrigen Prämiensatze, der 9 Sgr. 3 Pfg. unter dem englischen Normalsatze steht, auf die Dauer wird bestehen können?

B. *Bei Zahlung in einer Summe.*

Wird gefragt, welche Summe eine Person von n Jahren sofort zu erlegen hat, um ihren Erben bei ihrem Tode ein Kapital von 1 Thlr. zu sichern, so ist die baare Leistung des Versicherten eben die Summe S , hingegen die Leistung der Bank, wie man leicht erkennen wird, der a_n te Theil von dem früherem Y , so haben wir also hier als Berechnungsformel

$$S = \frac{1}{a_n} \left(\frac{a_n - a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+1} - a_{n+2}}{e^2} + \dots \right)$$

oder

$$S = \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{e} \right) \cdot \frac{1}{a_n} \cdot \left(\frac{a_{n+1}}{e} + \frac{a_{n+2}}{e^2} + \dots \right) \dots (Q).$$

87. B e i s p i e l.

Welche Summe muss eine 32jährige Person sogleich erlegen, um ihren Erben beim Ableben 100 Thlr. zu sichern?

Aus dem 86sten Beispiele ersehen wir, dass für einen Thaler bei 4%

$$S = 0,32557$$

und bei 3% = 0,40879 ist. Bei einer Versicherungssumme von 100 Thlr. beträgt also die Summe bezüglich 32,557 und 40,879.

Anmerkung. Unter den obenerwähnten Verhältnissen nimmt

die Medical etc. Society 43 Thlr. 22 Sgr. 2 Pf.,

der Janus in Hamburg 44 „ 7 „ 6 „

die Lübecker Bank 48 „ 28 „ 10 „

Mit Rücksicht auf die 2te Note pag. 138. bemerken wir, dass diese Summe nach der Northamptoner Sterblichkeitstafel 48 Thlr. 27 Sgr. 5 Pf. beträgt.

C. *Schlussbemerkungen.*

Man hat auch Versicherungen verbundener Leben unter den vielfachsten Modalitäten, z. B. Versicherung von Hundert Thalern, zahlbar beim Tode der Person A, im Fall die Person B noch am Leben ist; Versicherung von Hundert Thalern zahlbar beim Tode des von zwei Personen Zuletztsterbenden, u. s. w. Was die hierauf bezüglichen Rechnungen

betrifft, so ist auch hier die Leistung jeder Partei nach dem baaren Werthe zu ermitteln, wobei die anzuwendenden Wahrscheinlichkeits-Coefficienten je nach den gestellten Bedingungen zu wählen sind. Wir begnügen uns hier, auf die analogen Fälle bei den Leibrenten zu verweisen.

Es giebt ferner Versicherungen, bei welchen die Prämien blos bis zu einer bestimmten Zeit, oder auch die Versicherungssummen zu einer festgesetzten Zeit gezahlt werden. Es wird in Bezug darauf die Bemerkung genügen, dass in diesen Fällen die Reihen der Berechnungsformel nicht erst mit der Sterblichkeitstabelle, sondern eben mit jenen festgesetzten Zeitabschnitten abbrechen.

Noch ein Wort möge über die zweite Ueberschrift unseres Paragraphen „Sterbekassen“ gesagt werden. Diese können nämlich, wenn sie vernünftig eingerichtet sind, auf gar keinen anderen Prinzipien beruhen, als die Lebensversicherungsinstitute. Sie sind nur dadurch ein Bedürfniss geworden, dass die Lebensversicherungsbanken die Versicherung kleiner Summen meist nicht zulassen. Der Janus in Hamburg allein lässt auch eine Versicherung von 50 Thlr. zu, die z. B. bei einer 26jährigen Person durch einen, sage einen täglich zurückgelegten Pfennig erworben werden kann.

Welche Sterbekasse kann diese Vortheile gewähren? Nach unserer festen Ueberzeugung ist aber nicht blos um der geringen Beiträge, sondern auch um der grösseren Sicherheit willen eine Lebensversicherungsbank stets vorzuziehen. Es ist nämlich bei den, natürlich doch nur immer einen kleinen Umfang habenden, Sterbekassen viel eher zu fürchten, dass eine Abweichung der Sterblichkeitsverhältnisse einer Stadt von der angewandten Sterblichkeitstabelle die Kasse in Gefahr bringe, als dies bei den, eine grosse Mitgliederzahl aus den verschiedensten Gegenden und Ortschaften umfassenden, Lebensversicherungsbanken der Fall ist.

Nachtrag.

A. Die wichtigsten Sätze über Logarithmen.

1. *Unter dem Logarithmus einer Zahl a für die Grundzahl 10, verstehen wir den Exponenten, auf welchen man 10 erheben muss, um jene Zahl a zu erhalten.*

Bezeichnet z. B. x den Logarithmus von a , oder nach kurzer Schreibweise, ist $\log a = x$, so ist $10^x = a$. Es ist deshalb $\log 1000 = 3$, weil $10^3 = 1000$ und $\log 1 = 0$, weil $10^0 = 1$ ist.

2. *Der Logarithmus eines Produktes ist gleich der Summe der Logarithmen der einzelnen Posten.*

Es ist z. B. $\log a \cdot b = \log a + \log b$. Nach diesem Satze kann man z. B. für $\log 12$ auch $\log 3 + \log 4$, oder auch $\log 2 + \log 6$ setzen. Ebenso ist $\log a \cdot b \cdot c = \log a + \log b + \log c$, u. s. f.

3. *Der Logarithmus eines Quotienten ist gleich dem Unterschiede aus den Logarithmen der einzelnen Glieder.*

So ist $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$; $\log \frac{13,5}{9,7} = \log 13,5 - \log 9,7$.

4. *Der Logarithmus einer Potenz ist gleich dem Logarithmus der Grundzahl multiplicirt mit dem Potenzexponenten.*

So ist $\log a^m = m \cdot \log a$; $\log 2^5 = 5 \log 2$; $\log 9 = \log 3^2 = 2 \log 3$.

5. *Der Logarithmus einer Wurzel ist gleich dem Logarithmus des Radicanden dividirt durch den Wurzelexponenten.*

So ist $\log \sqrt[n]{a} = \frac{\log a}{n}$ oder $= \frac{1}{n} \cdot \log a$; $\log \sqrt[5]{32} = \frac{1}{5} \cdot \log 32$, (und $\log 32 = 5 \cdot \log 2$ ist,) $= \frac{1}{5} \cdot 5 \log 2 = \log 2$; $\log \sqrt[2]{5,73} = \frac{1}{2} \cdot \log 5,73$.

Da nach 1. der $\log 100 = 2$, und der $\log 1000 = 3$ ist, so liegt auf der Hand, dass die Logarithmen aller Zahlen zwischen 100 und 1000 gleich 2 vermehrt um einen achten Bruch sind. Da ferner $\log \frac{1}{100} = \log 1 - \log 100 = 0 -$

$2 = -2$, ferner $\log \frac{1}{1000} = \log 1 - \log 1000 = 0$

$-3 = -3$ ist, so liegen die Logarithmen aller Brüche zwischen $\frac{1}{100}$ und $\frac{1}{1000}$ zwischen -2 und -3 , und es

ist deshalb z. B. $\log \frac{1}{250} = -3$ vermehrt um einen achten Bruch.

6. Die zu einem Logarithmus gehörige ganze (positive oder negative) Zahl heisst die *Charakteristik* oder die *Kennziffer*, hingegen der hinzu zu addirende ächte Bruch, die *Mantisse*.

7. Nennen wir die in dem Dezimalbruche

$$\overset{+3}{9} \overset{+2}{5} \overset{+1}{3} \overset{0}{2}, \overset{-1}{4} \overset{-2}{6} \overset{-3}{7} \overset{-4}{8}$$

über den einzelnen Ziffern stehenden Zeiger die *Stellenzahlen* der einzelnen Ziffern, so bekommen wir zur Bestimmung der Kennziffer eines Logarithmen folgende Regel:

Die Kennziffer des Logarithmus einer Zahl ist gleich der Stellenzahl der höchsten geltenden Ziffer jener Zahl.

So ist $\log 32,75 = 1, \dots$, $\log 3,275 = 0, \dots$, $\log 0,03275 = -2 +$ ächter Bruch.

8. Ist die Kennziffer negativ, so wird die, stets positive, Mantisse vorweg und die Kennziffer nachgesetzt.

Es ist also $\log 0,03275 = 0, \dots - 2$.

9. Alle Zahlen, die sich blos durch die Stelle des Kommas unterscheiden, haben ein und dieselbe Mantisse und unterscheiden sich also nur durch die Kennziffer.

B. Aufschlagen der Logarithmen auf Tafel VI.

Auf dieser Tafel befinden sich in den beiden mit *N* überschriebenen Spalten alle Zahlen von 10 bis 99 und unmittelbar daneben in der mit 0 überschriebenen Spalte die zu jeder Zahl gehörige Mantisse, so dass man mittelst dieser beiden Spalten schon die Logarithmen aller zweiziffrigen Zahlen finden kann. Suche ich z. B. den Logarithmus der Zahl 35, so bestimme ich zuerst deren Kennziffer, diese ist 1, und hänge dann rechts an diese gleich die zugehörige Mantisse, d. h. also die neben der Zahl 35 in der Null-Spalte stehende Zahl 5441 an, so dass ich also erhalte

$$\log 35 = 1,5441.$$

Ebenso verfähre ich, wenn die Zahl, deren Logarithmus ich suche, nur in den beiden ersten Stellen geltende Ziffern, in den nachfolgenden aber Nullen hat. Suche ich z. B. den Logarithmus von 87000, so ist die Kennziffer 4, und ich habe an diese nur die neben der Zahl 87 in der Null-Spalte stehende Mantisse 9395 anzuhängen, so dass ich also erhalte

$$\log 87000 = 4,9395.$$

Endlich reichen auch die erwähnten Spalten aus, wenn die Zahl, deren Logarithmus ich suche, nur in den beiden letzten Stellen geltende Ziffern, vorher aber Nullen hat. Suche ich z. B. den Logarithmus von 0,00059, so setze ich zunächst in die Stelle der Einer, weil die Kennziffer — 5, also negativ ist, 0 mit dem Komma und in einiger Entfernung rechts davon die negative Kennziffer, nämlich:

$$0, \quad -5 ;$$

dann suche ich die neben 59 stehende Mantisse 7709 auf und hänge dieselbe an die 0 mit dem Komma an, wodurch ich dann erhalte

$$\log 0,00059 = 0,7709 - 5.$$

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass auch die Logarithmen aller einziffrigen Zahlen mittelst der ersten beiden Spalten gefunden werden können, da die Zahlen 1, 2, 3... bis 9 mit den Zahlen 10, 20, 30, bis 90 bezüglich gleiche Mantissen haben.

Ist die Zahl, deren Logarithmus man finden will, dreiziffrig, so suche man zuerst die beiden ersten Ziffern in der mit N überschriebenen Spalte auf und setze an die vorher niedergeschriebene Kennziffer die erste abgesonderte Ziffer der Nullspalte als Zehntel daran. Die drei übrigen Ziffern findet man, wenn man in derselben Horizontalreihe fortgeht, bis man zu der Vertikalspalte kommt, die mit der noch nicht berücksichtigten Ziffer der gegebenen Zahl überschrieben ist. Soll z. B. $\log 357$ gefunden werden, so ist die Kennziffer 2, und die neben 35 stehende abgesonderte Ziffer ist 5, so dass man vorläufig 2,5... hat. Die drei folgenden Ziffern findet man in derselben Horizontalreihe in der mit 7 überschriebenen Spalte, wo sich nämlich die Zahlen 527 finden, so dass man vollständig

$$\log 357 = 2,5527$$

hat.

Man wird bemerken, dass einzelne der Gruppen von je drei Ziffern mit einem Sternchen (*) behaftet sind. Ist dies der Fall, so ist statt der einzelnstehenden Ziffer der Nullspalte, die darauf folgende, d. h. immer die um 1 höhere zu nehmen. Sucht man z. B. den $\log 7,96$, so ist die Kennziffer 0 und es hat die Zahl 79 die einzelnstehende Ziffer 8 neben sich. Da aber die zu 6 gehörigen übrigen Ziffern, nämlich 009, mit einem Sternchen behaftet sind, so ist statt 8 die Zahl 9 zu nehmen, und man hat

$$\log 7,96 = 0,9009.$$

Ist die Zahl, deren Logarithmus gefunden werden soll, vierziffrig, so lasse man die vierte Ziffer vorläufig unberücksichtigt und suche den Logarithmus für die drei ersten ganz so, wie vorher angegeben wurde und schreibe denselben nieder. Ist z. B. $\log 5738$ zu finden, so ist die Kennziffer 3, und die Mantisse zu $\log 573$ ist 7582, folglich hat man zunächst 3,7582. Dies ist aber nur der Logarithmus von 5730, während der folgende in den Tafeln noch zu findende, nämlich 3,7589 der Logarithmus von 5740 ist. Die beiden Logarithmen unterscheiden sich nur um 7 Einheiten, während die Zahlen, zu denen sie gehören, sich um 10 Einheiten un-

terscheiden; es ist deshalb zu deren Logarithmus 3,7582 für jede der letzteren Einheiten $\frac{7}{10}$ oder 0,7 hinzuzunehmen, mithin für 8 Einheiten $8 \cdot 0,7 = 5,6$. Da $\frac{6}{10}$ mehr als eine halbe Einheit beträgt, so wird man statt 5,6 die ganze Zahl 6 zu dem vorigen Logarithmus addiren, wodurch man erhält $\log 5738 = 3,7588$.

Fassen wir das so eben detaillirte Verfahren in eine kurze Regel, so lautet diese so:

Beim Aufschlagen des Logarithmus einer 4ziffrigen Zahl suche man den Logarithmus für die drei ersten Ziffern und schreibe diesen nieder. Hierauf suche man die Differenz zwischen diesem Logarithmus und dem nächsten in der Tafel stehenden, nehme davon den 10ten Theil, multiplircire diesen mit der noch nicht berücksichtigten vierten Ziffer der gegebenen Zahl und addire die Ganzen dieses Produkts zu dem niedergeschriebenen Logarithmus.

In der mit *D. 1.* überschriebenen Spalte findet sich hinter jeder Querreihe die Differenz zwischen der letzten Mantisse dieser Reihe und der ersten der darauf folgenden Reihe verzeichnet. Diese Differenz gilt nun zwar nicht für die ganze Reihe, allein die übrigen Differenzen unterscheiden sich allermeist nur in der letzten Ziffer von der verzeichneten und es wird im Hinblick auf die verzeichnete Differenz schon die Subtraktion der letzten Ziffern zweier auf einander folgenden Mantissen genügen, um gleich die ganze Differenz zu erkennen. Um zu verhüten, dass etwa die Division dieser Differenz durch 10 übersehen werde, ist auch diese an den verzeichneten Differenzen durch Abschneiden der letzten Ziffer durch ein Komma bereits ausgeführt worden. Nehmen wir noch ein Beispiel und suchen z. B. $\log 2447$, so finden wir zunächst $\log 2440 = 3,3874$. Um die Tafeldifferenz zu finden, haben wir 874 von 892 abzuziehen. Da 4 von 12 die Zahl 8 giebt, so sehen wir an der in der Spalte *D. 1.* verzeichneten Differenz 1,7 sofort, dass hier 18 die Differenz ist; wir haben also $1,8 \cdot 7 = 12,6$, d. i. 13 Ganze zu 3,3874 hinzuzunehmen und erhalten so $\log 2447 = 3,3887$.

Ist der Logarithmus von einer 5ziffrigen Zahl zu nehmen, z. B. $\log 12437$, so suche man wieder zuerst den Logarithmus der drei ersten Ziffern, also $\log 12400 = 4,0934$, multiplicire die Tafeldifferenz, 35, mit den beiden nicht berücksichtigten Ziffern, d. i. mit 37, also $35 \cdot 37 = 1295$ und dividire das erhaltene Produkt jetzt durch 100. Dies giebt hier also 12,95, wovon die Ganzen, d. i. 13 nach dem vorigen Logarithmus 4,0934 zuzuzählen sind. Man erhält somit $\log 12437 = 4,0947$.

Bei 6 und mehrziffrigen Zahlen haben nach unseren Tafeln die auf die 5te Stelle folgenden Ziffern keinen Einfluss mehr.

C. Aufsuchen der zu einem gegebenen Logarithmus gehörigen Zahl mittelst der Taf. VI.

Ist ein Logarithmus gegeben und soll die dazu gehörige Zahl gefunden werden, so hat man vor Allem zu bedenken, dass die Kennziffer nicht mit in der Tafel steht, also dort auch nicht aufgesucht werden kann. Man wird also die Mantisse bloß aufzusuchen haben und zwar deren erste Ziffer unter den einzeln stehenden Ziffern der Null-Spalte, die übrigen Ziffern aber unter den dazu gehörigen Gruppen von je drei Ziffern. Es versteht sich, dass der gegebene Logarithmus vorher erst auf 4 Bruchziffern gekürzt werden muss. Ist z. B. $\log x = 1,5832$ gegeben und wird x gesucht, so finden wir die erste Ziffer 5 der Mantisse in der Null-Spalte und die übrigen 832 in der zur Zahl 38 gehörigen Querspalte unter der Ziffer 3. Es gehört also die gegebene Mantisse zu der Zahl 383. Wie nun beim Aufschlagen des Logarithmus einer Zahl die Stelle des Komma's die Kennziffer bestimmt, so muss hier auch wieder die Stelle des Komma's in der gefundenen Zahl durch die Kennziffer des gegebenen Logarithmus bestimmt werden. Wir hatten die Regel gegeben: Die Kennziffer ist gleich der Stellenzahl der höchsten geltenden Ziffer, folglich sehen wir, dass die höchste geltende Ziffer unserer gefundenen Zahl die Kennziffer zur Stellenzahl bekommen muss. In unserer Zahl 383 muss also die erste

3 die Stellenzahl 1 bekommen, d. h. diese 3 steht in der Stelle der Zehner, es kommt also das Komma hinter die 8, und wir haben

$$1,5832 = \log 38,3.$$

Wäre ferner $\log x = 0,4082 - 2$, so findet man in der Nullspalte neben der ersten 4 schon die Gruppe 150, also mehr als 082, deshalb muss in die vorhergehende Zeile, aus welcher die besternten Zahlgruppen noch zu 4 gehören, zurückgegangen werden. Hier findet man 082 in der mit 6 überschriebenen Spalte, es gehört somit zur Mantisse 4082 die Zahl 256. In dieser ist nun noch das Komma durch die Kennziffer -2 zu bestimmen, indem die höchste geltende Ziffer 2 jene -2 zur Stellenzahl erhalten, d. h. in die Stelle der Hundertel kommen muss. Wir erhalten demnach

$$x = 0,0256.$$

Wäre $\log x = 2,5382$, so findet sich in der Tafel unter den zu 5 gehörigen Gruppen keine, welche gleich 382 ist. In diesem Falle nehme man die nächst kleinere, d. i. 378 und schreibe sich vorläufig die Zahl 345, die zur Mantisse 5378 gehört, nieder. Hierauf ziehe man die gefundene Mantisse 378 von der gesuchten 382 ab und dividire diesen Unterschied $382 - 378 = 4$ durch den 10ten Theil der Ta-

feldifferenz $\frac{391 - 378}{10} = 1,3$. Wir erhalten dann $\frac{4}{1,3}$

$$= \frac{40}{13} = 3 \frac{1}{3}.$$

Die ganze Zahl 3 dieses Quotienten wird hierauf noch an die vorher gefundene Zahl 345 angehängt und in der nun erhaltenen Zahl 3453 das Komma aus der Kennziffer 2 wie vorher bestimmt. Wir erhalten somit

$$x = 345,3.$$

D. Anderweite Regeln beim Rechnen mit Logarithmen.

1) Hat man Logarithmen von Quotienten zu nehmen, so wird nach der früheren Regel der Logarithmus des Divisors (Nenners) von dem Logarithmus des Dividenden (Zählers)

subtrahirt. Ist der Quotient ein ächter Bruch, z. B. $\frac{378}{523}$, so hat man

$$\begin{aligned}\log \frac{378}{523} &= \log 378 - \log 523 \\ &= 2,5775 - 2,7185.\end{aligned}$$

Würde man diese Division ausführen, so würde man einen negativen Werth bekommen, zu welchem man mittelst unserer Tafel die zugehörige Zahl deshalb nicht finden würde, weil negative Mantissen in den Tafeln nicht stehen. Man hat deshalb die negativen Mantissen zu vermeiden, was dadurch geschieht, dass man das Negative in die Kennziffer bringt. — Man hat nämlich die Kennziffer des Logarithmen vom Zähler um soviel Einheiten zu vermehren, dass die Subtraktion ausführbar wird, später dem Reste die zugezählten Einheiten als negative Kennziffer wieder beizugeben. In unserem obigen Beispiele würden wir also statt 2,5775 jetzt 3,5775 nehmen, dann haben wir $3,5775 - 2,7185 = 0,8590$. Die zugezählte Einheit bringen wir jetzt wieder durch Hinzufügung von -1 in Abzug und haben deshalb

$$\log \frac{378}{523} = 0,8590 - 1.$$

Für den der mathematischen Sätze von der Subtraktion weniger Kundigen möge an einem Beispiele das Verfahren bei der Subtraktion zweier Dezimalbrüche, von denen der Subtrahend oder beide Glieder negative Kennziffern haben, noch erläutert werden. Ist z. B. folgende Subtraktion

$$\begin{array}{r} 0,8572 - 1 \\ 0,5283 - 2 \\ \hline \end{array}$$

auszuführen, so gebe man hier im Minuend vorn eine Einheit zu und nehme sie aber auch hinten wieder weg, damit beide Dezimalbrüche dieselbe Kennziffer haben, und subtrahire nun so:

$$\begin{array}{r} 1,8572 - 2 \\ 0,5283 - 2 \\ \hline 1,3279.\end{array}$$

Da nämlich jetzt von beiden Gliedern der Differenz gleich viel

wegzunehmen ist, so haben die Kennziffern keinen Einfluss mehr auf die Grösse des Unterschiedes. Wäre

$$0,8572$$

$$0,5283 - 2$$

zu subtrahiren, so setze man an:

$$2,8572 - 2$$

$$0,5283 - 2,$$

wodurch man 2,3279 erhält.

2) Hat man Logarithmen von Wurzelausdrücken zu nehmen, so muss nach der früheren Regel der Logarithmus des Radicanden (d. i. der Zahl, aus welcher die Wurzel zu ziehen ist), durch den Wurzelexponenten dividirt werden. — Wäre z. B. $\log \sqrt[7]{0,007345}$ zu suchen, so findet man

$$\log 0,007345 = 0,8660 - 3,$$

und mithin

$$\log \sqrt[7]{0,007345} = \frac{0,8660 - 3}{7} \dots$$

Hier ist nun jedes Glied der Differenz im Zähler durch 7 zu dividiren; dies würde aber die Kennziffer $= \frac{3}{7}$ geben. —

Eine solche Kennziffer hat aber keinen Sinn, weil ja die Kennziffer gleich der Stellenzahl der höchsten geltenden Ziffer, d. h. also immer eine ganze Zahl sein muss. Um deshalb eine ganze Zahl als Kennziffer zu erhalten, hat man in dem Zähler $0,8660 - 3$ vorn so viel Einheiten zuzuzählen und hinten wieder in Abzug zu bringen, dass die dadurch entstehende Kennziffer durch 7 dividirt eine ganze Zahl giebt. Man wird also erhalten

$$\frac{4,8660 - 7}{7} = 0,6951 - 1.$$



$$2,8572 - 2$$

$$0,5283 - 2$$

$$2,3279$$

Berichtigungen.

S. 20. Z. 21. ist aus Versehen $C = 2$ Thlr. 20 Sgr. statt $C = 3$ Thlr. 20 Sgr. gesetzt worden und es passt deshalb die Ausrechnung nicht zur Aufgabe. Der richtige Ansatz ist

$$100 = \frac{11}{3} \cdot \frac{e(e^{18}-1)}{e-1} \quad \text{oder} \quad 27,27 \dots = \frac{e(e^{18}-1)}{e-1}.$$

Sucht man 27,27... in der zu 18 Jahren gehörigen Querspalte der Taf. III., so findet man 26,67... bei 4^o/_o und 28,06... bei 4½^o/_o. Der gesuchte Zinsfuss ist demnach c. 4¼^o/_o.

S. 94. muss die Formel (f) heissen:

$$1 - \left(1 - \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \left(1 - \frac{a_{p+k}}{a_p}\right) \quad \text{und}$$

S. 95. muss die Formel (e) heissen:

$$\left(1 - \frac{a_{n+k}}{a_n}\right) \left(1 - \frac{a_{p+k}}{a_p}\right).$$

S. 131. ist der Name „Dannenberger“ in „Dannenberg“ zu ändern.

Ebendas. gehört zum Alter von 73 Jahren die Rente 5,49284, nicht 4,49284.

Durch ein Versehen ist die zweite Hälfte der Taf. I. auf die Rückseite der ersten gedruckt worden. Um nun denen, die viel mit den Tabellen zu rechnen haben, es möglich zu machen, sich dieselben auf Pappe ziehen zu lassen, ist die erwähnte zweite Hälfte noch einmal besonders gedruckt worden.



Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
1	1,01	1,045	1,05	1,06	1,07	1
2	1,0201	1,092025	1,1025	1,1236	1,1449	2
3	1,030301	1,141166	1,157625	1,191016	1,225043	3
4	1,040604	1,192519	1,215506	1,262477	1,310796	4
5	1,051011	1,246182	1,276282	1,338226	1,402552	5
6	1,061521	1,302260	1,340096	1,418519	1,500730	6
7	1,072131	1,360862	1,407100	1,503630	1,605781	7
8	1,082851	1,422101	1,477455	1,593848	1,718186	8
9	1,093681	1,486095	1,551328	1,689479	1,838459	9
10	1,104621	1,552969	1,628895	1,790848	1,967151	10
11	1,115661	1,622853	1,710339	1,898299	2,104852	11
12	1,126821	1,695881	1,795856	2,012196	2,252192	12
13	1,138091	1,772196	1,885649	2,132928	2,409845	13
14	1,149471	1,851945	1,979932	2,260904	2,578534	14
15	1,160961	1,935282	2,078928	2,396558	2,759032	15
16	1,172572	2,022370	2,182875	2,540352	2,952164	16
17	1,184302	2,113377	2,292018	2,692773	3,158815	17
18	1,196142	2,208479	2,406619	2,854339	3,379932	18
19	1,208102	2,307860	2,526950	3,025600	3,616528	19
20	1,220192	2,411714	2,653298	3,207135	3,869684	20
21	1,232392	2,520241	2,785963	3,399564	4,140562	21
22	1,244712	2,633652	2,925261	3,603537	4,430402	22
23	1,257162	2,752166	3,071524	3,819750	4,740530	23
24	1,269732	2,876014	3,225100	4,048935	5,072367	24
25	1,282433	3,005434	3,386355	4,291871	5,427433	25
26	1,295253	3,140679	3,555673	4,549383	5,807353	26
27	1,308203	3,282010	3,733456	4,822346	6,213868	27
28	1,321293	3,429700	3,920129	5,111687	6,648838	28
29	1,334503	3,584036	4,116136	5,418388	7,114257	29
30	1,347843	3,745318	4,321942	5,743491	7,612255	30
31	1,361323	3,913857	4,538039	6,088101	8,145113	31
32	1,374941	4,089981	4,764941	6,453387	8,715271	32
33	1,388694	4,274030	5,003189	6,840590	9,325340	33
34	1,402571	4,466362	5,253348	7,251025	9,978114	34
35	1,416601	4,667348	5,516015	7,686087	10,676581	35
36	1,430761	4,877378	5,791816	8,147252	11,423942	36
37	1,445076	5,096860	6,081407	8,636087	12,223618	37
38	1,459525	5,326219	6,385477	9,154252	13,079271	38
39	1,474125	5,565899	6,704751	9,703507	13,994820	39
40	1,488865	5,816365	7,039989	10,285718	14,974458	40
41	1,503753	6,078101	7,391988	10,902861	16,022670	41
42	1,518796	6,351615	7,761588	11,557033	17,144257	42
43	1,533978	6,637438	8,149667	12,250455	18,344355	43
44	1,549318	6,936123	8,557150	12,985482	19,628460	44
45	1,564817	7,248248	8,985008	13,764611	21,002452	45
46	1,580459	7,574420	9,434258	14,590487	22,472623	46
47	1,596267	7,915268	9,905971	15,465917	24,045707	47
48	1,612226	8,271456	10,401270	16,393872	25,728907	48
49	1,628348	8,643671	10,921333	17,377504	27,529930	49
50	1,644632	9,032636	11,467400	18,420154	29,457025	50

I.

Jahr	4 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
5	7,390951	9,439105	12,040770	19,525364	31,519017	51
5	7,686589	9,863865	12,642808	20,696885	33,725348	52
5	7,994052	10,307739	13,274949	21,938698	36,086122	53
5	8,313814	10,771587	13,938696	23,255020	38,612151	54
5	8,646367	11,256308	14,635631	24,650322	41,315001	55
5	8,992222	11,762842	15,367412	26,129341	44,207052	56
5	9,351910	12,292170	16,135783	27,697101	47,301545	57
5	9,725987	12,845318	16,942572	29,358927	50,612653	58
5	10,115026	13,423357	17,789701	31,120463	54,155539	59
6	10,519627	14,027408	18,679186	32,987691	57,946427	60
6	10,940413	14,658641	19,613145	34,966952	62,002677	61
6	11,378029	15,318280	20,593802	37,064969	66,342864	62
6	11,833150	16,007603	21,623493	39,288868	70,986865	63
6	12,306476	16,727945	22,704667	41,646200	75,955945	64
6	12,798735	17,480702	23,839901	44,144972	81,272861	65
6	13,310685	18,267334	25,031896	46,793700	86,961962	66
6	13,843112	19,089364	26,283490	49,601290	93,049299	67
6	14,396836	19,948385	27,597665	52,577368	99,562750	68
6	14,972710	20,846063	28,977548	55,732010	106,532142	69
6	15,571618	21,784136	30,426426	59,075930	113,989392	70
6	16,194483	22,764422	31,947747	62,620486	121,968650	71
6	16,842262	23,788821	33,545134	66,387715	130,506455	72
6	17,515953	24,859318	35,222391	70,360378	139,641907	73
6	18,216591	25,977987	36,983510	74,582001	149,416840	74
6	18,945255	27,146996	38,832686	79,056921	159,876019	75
6	19,703065	28,368611	40,774320	83,800336	171,067341	76
6	20,491187	29,645199	42,813036	88,828356	183,042055	77
6	21,310835	30,979233	44,953688	94,158058	195,854998	78
6	22,163268	32,373298	47,201372	99,807541	209,564848	79
6	23,049799	33,830096	49,561441	105,795993	224,234388	80
6	23,971791	35,352451	52,039513	112,143753	239,930795	81
6	24,930663	36,943311	54,641489	118,872378	256,725950	82
6	25,927889	38,605760	57,373563	126,004721	274,696766	83
6	26,965005	40,343019	60,242241	133,565004	293,925541	84
6	28,043605	42,158455	63,254353	141,578904	314,500328	85
6	29,165349	44,055586	66,417071	150,073639	336,515351	86
6	30,331963	46,038087	69,737925	159,078057	360,071426	87
6	31,545242	48,109801	73,224821	168,622741	385,276426	88
6	32,807051	50,274742	76,886062	178,740105	412,245776	89
6	34,119333	52,537105	80,730365	189,464511	441,102980	90
6	35,484107	54,901275	84,766883	200,832382	471,980188	91
6	36,903471	57,371832	89,005227	212,882325	505,018802	92
6	38,379610	59,953565	93,455489	225,655264	540,370118	93
6	39,914794	62,651475	98,128263	239,194580	578,196026	94
6	41,511386	65,470792	103,034676	253,546255	618,669748	95
6	43,171841	68,416977	108,186410	268,759030	661,976630	96
6	44,898715	71,495741	113,595731	284,884572	708,314994	97
6	46,694664	74,713050	119,275517	301,977646	757,897044	98
6	48,562450	78,075137	125,239293	320,096305	810,949837	99
6	50,504948	81,588518	131,501258	339,302084	867,716326	100

Jahre.	1 %	$\frac{1}{2}$ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
51	1,6610	439105	12,040770	19,525364	31,519017	51
52	1,6776	863865	12,642808	20,696885	33,725348	52
53	1,6944	307739	13,274949	21,938698	36,086122	53
54	1,7114	771587	13,938696	23,255020	38,612151	54
55	1,7285	256308	14,635631	24,650322	41,315001	55
56	1,7458	762842	15,367412	26,129341	44,207052	56
57	1,7632	292170	16,135783	27,697101	47,301545	57
58	1,7809	845318	16,942572	29,358927	50,612653	58
59	1,7987	423357	17,789701	31,120463	54,155539	59
60	1,8166	027408	18,679186	32,987691	57,946427	60
61	1,8348	658641	19,613145	34,966952	62,002677	61
62	1,8532	318280	20,593802	37,064969	66,342864	62
63	1,8717	007603	21,623493	39,288868	70,986865	63
64	1,8904	727945	22,704667	41,646200	75,955945	64
65	1,9093	480702	23,839901	44,144972	81,272861	65
66	1,9284	267334	25,031896	46,793700	86,961962	66
67	1,9477	089364	26,283490	49,601290	93,049299	67
68	1,9672	948385	27,597665	52,577368	99,562750	68
69	1,9868	846063	28,977548	55,732010	106,532142	69
70	2,0067	784136	30,426426	59,075930	113,989392	70
71	2,0268	764422	31,947747	62,620486	121,968650	71
72	2,0470	788821	33,545134	66,387715	130,506455	72
73	2,0675	859318	35,222391	70,360378	139,641907	73
74	2,0882	977987	36,983510	74,582001	149,416840	74
75	2,1091	146996	38,832686	79,056921	159,876019	75
76	2,1302	368611	40,774320	83,800336	171,067341	76
77	2,1515	645199	42,813036	88,828356	183,042055	77
78	2,1730	979233	44,953688	94,158058	195,854998	78
79	2,1947	373298	47,201372	99,807541	209,564848	79
80	2,2167	830096	49,561441	105,795993	224,234388	80
81	2,2388	352451	52,039513	112,143753	239,930795	81
82	2,2612	943311	54,641489	118,872378	256,725950	82
83	2,2838	605760	57,373563	126,004721	274,696766	83
84	2,3067	343019	60,242241	133,565004	293,925541	84
85	2,3297	158455	63,254353	141,578904	314,500328	85
86	2,3530	055586	66,417071	150,073639	336,515351	86
87	2,3766	038087	69,737925	159,078057	360,071426	87
88	2,4003	109801	73,224821	168,622741	385,276426	88
89	2,4243	274742	76,886062	178,740105	412,245776	89
90	2,4486	537105	80,730365	189,464511	441,102980	90
91	2,4731	901275	84,766883	200,832382	471,980188	91
92	2,4978	371832	89,005227	212,882325	505,018802	92
93	2,5228	953565	93,455489	225,655264	540,370118	93
94	2,5480	651475	98,128263	239,194580	578,196026	94
95	2,5735	470792	103,034676	253,546255	618,669748	95
96	2,5992	416977	108,186410	268,759030	661,976630	96
97	2,6252	495741	113,595731	284,884572	708,314994	97
98	2,6515	713050	119,275517	301,977646	757,897044	98
99	2,6780	075137	125,239293	320,096305	810,949837	99
100	2,7048	588518	131,501258	339,302084	867,716326	100

100	90	80	70	60	50
1000000	9000000	8000000	7000000	6000000	5000000
9900000	8900000	7900000	6900000	5900000	4900000
9800000	8800000	7800000	6800000	5800000	4800000
9700000	8700000	7700000	6700000	5700000	4700000
9600000	8600000	7600000	6600000	5600000	4600000
9500000	8500000	7500000	6500000	5500000	4500000
9400000	8400000	7400000	6400000	5400000	4400000
9300000	8300000	7300000	6300000	5300000	4300000
9200000	8200000	7200000	6200000	5200000	4200000
9100000	8100000	7100000	6100000	5100000	4100000
9000000	8000000	7000000	6000000	5000000	4000000
8900000	7900000	6900000	5900000	4900000	3900000
8800000	7800000	6800000	5800000	4800000	3800000
8700000	7700000	6700000	5700000	4700000	3700000
8600000	7600000	6600000	5600000	4600000	3600000
8500000	7500000	6500000	5500000	4500000	3500000
8400000	7400000	6400000	5400000	4400000	3400000
8300000	7300000	6300000	5300000	4300000	3300000
8200000	7200000	6200000	5200000	4200000	3200000
8100000	7100000	6100000	5100000	4100000	3100000
8000000	7000000	6000000	5000000	4000000	3000000
7900000	6900000	5900000	4900000	3900000	2900000
7800000	6800000	5800000	4800000	3800000	2800000
7700000	6700000	5700000	4700000	3700000	2700000
7600000	6600000	5600000	4600000	3600000	2600000
7500000	6500000	5500000	4500000	3500000	2500000
7400000	6400000	5400000	4400000	3400000	2400000
7300000	6300000	5300000	4300000	3300000	2300000
7200000	6200000	5200000	4200000	3200000	2200000
7100000	6100000	5100000	4100000	3100000	2100000
7000000	6000000	5000000	4000000	3000000	2000000
6900000	5900000	4900000	3900000	2900000	1900000
6800000	5800000	4800000	3800000	2800000	1800000
6700000	5700000	4700000	3700000	2700000	1700000
6600000	5600000	4600000	3600000	2600000	1600000
6500000	5500000	4500000	3500000	2500000	1500000
6400000	5400000	4400000	3400000	2400000	1400000
6300000	5300000	4300000	3300000	2300000	1300000
6200000	5200000	4200000	3200000	2200000	1200000
6100000	5100000	4100000	3100000	2100000	1100000
6000000	5000000	4000000	3000000	2000000	1000000
5900000	4900000	3900000	2900000	1900000	900000
5800000	4800000	3800000	2800000	1800000	800000
5700000	4700000	3700000	2700000	1700000	700000
5600000	4600000	3600000	2600000	1600000	600000
5500000	4500000	3500000	2500000	1500000	500000
5400000	4400000	3400000	2400000	1400000	400000
5300000	4300000	3300000	2300000	1300000	300000
5200000	4200000	3200000	2200000	1200000	200000
5100000	4100000	3100000	2100000	1100000	100000
5000000	4000000	3000000	2000000	1000000	0

Jahre.	1 % /o	4½ % /o	5 % /o	6 % /o	Jahre.
1	0,9900990385	0,9569378	0,9523810	0,9433962	1
2	0,9802960562	0,9157300	0,9070295	0,8899964	2
3	0,9705909964	0,8762966	0,8638376	0,8396193	3
4	0,9609803042	0,8385613	0,8227025	0,7920937	4
5	0,9514659271	0,8024510	0,7835262	0,7472582	5
6	0,9420453145	0,7678957	0,7462154	0,7049605	6
7	0,9327189178	0,7348285	0,7106813	0,6650571	7
8	0,9234833902	0,7031851	0,6768394	0,6274124	8
9	0,9143395867	0,6729044	0,6446089	0,5918985	9
10	0,9052876642	0,6439277	0,6139133	0,5583948	10
11	0,8963235809	0,6161987	0,5846793	0,5267875	11
12	0,8874495970	0,5896639	0,5568374	0,4969694	12
13	0,8786626741	0,5642716	0,5303214	0,4688390	13
14	0,8699634751	0,5399729	0,5050680	0,4423010	14
15	0,8613492645	0,5167204	0,4810171	0,4172651	15
16	0,8528219082	0,4944693	0,4581115	0,3936463	16
17	0,8443773732	0,4731764	0,4362967	0,3713644	17
18	0,8360173281	0,4528004	0,4155207	0,3503438	18
19	0,8277396424	0,4333018	0,3957340	0,3305130	19
20	0,8195443869	0,4146429	0,3768895	0,3118047	20
21	0,8114308336	0,3967874	0,3589424	0,2941554	21
22	0,8033969554	0,3797009	0,3418499	0,2775051	22
23	0,7954417263	0,3633501	0,3255713	0,2617973	23
24	0,7875661215	0,3477035	0,3100679	0,2469785	24
25	0,7797684168	0,3327306	0,2953028	0,2329986	25
26	0,7720486892	0,3184025	0,2812407	0,2198100	26
27	0,7644038166	0,3046914	0,2678483	0,2073680	27
28	0,7568354775	0,2915707	0,2550936	0,1956301	28
29	0,7493426514	0,2790150	0,2429463	0,1845567	29
30	0,7419228187	0,2670000	0,2313774	0,1741101	30
31	0,7345774603	0,2555024	0,2203595	0,1642548	31
32	0,7273040579	0,2444999	0,2098662	0,1549574	32
33	0,7201030942	0,2339712	0,1998725	0,1461862	33
34	0,7129735521	0,2238959	0,1903548	0,1379115	34
35	0,7059144155	0,2142544	0,1812903	0,1301052	35
36	0,6899246687	0,2050282	0,1726574	0,1227408	36
37	0,6920042968	0,1961992	0,1644356	0,1157932	37
38	0,6851532854	0,1877504	0,1566054	0,1092388	38
39	0,6783696206	0,1796655	0,1491480	0,1030555	39
40	0,6716532890	0,1719287	0,1420457	0,0972222	40
41	0,6650032779	0,1645251	0,1352816	0,0917190	41
42	0,6584185749	0,1574403	0,1288396	0,0865274	42
43	0,65189991682	0,1506605	0,1227044	0,0816296	43
44	0,6454450463	0,1441728	0,1168613	0,0770091	44
45	0,63905491984	0,1379644	0,1112965	0,0726501	45
46	0,63272766139	0,1320233	0,1059967	0,0685378	46
47	0,62646302826	0,1263381	0,1009492	0,0646583	47
48	0,62026041948	0,1208977	0,0961421	0,0609984	48
49	0,61411923411	0,1156916	0,0915639	0,0575457	49
50	0,60803887126	0,1107097	0,0872037	0,0542884	50

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	Jahre.
51	0,6020183006	0,1059422	0,0830512	0,0512154	51
52	0,5960589967	0,1013801	0,0790964	0,0483164	52
53	0,5901560930	0,0970145	0,0753299	0,0455816	53
54	0,5843132817	0,0928368	0,0717427	0,0430015	54
55	0,5785285555	0,0888391	0,0683264	0,0405674	55
56	0,5728002072	0,0850135	0,0650728	0,0382712	56
57	0,567128300	0,0813526	0,0619741	0,0361049	57
58	0,561513173	0,0778494	0,0590229	0,0340612	58
59	0,555954628	0,0744970	0,0562123	0,0321332	59
60	0,550449604	0,0712890	0,0535355	0,0303143	60
61	0,544994042	0,0682191	0,0509862	0,0285984	61
62	0,539603887	0,0652815	0,0485583	0,0269797	62
63	0,534265084	0,0624703	0,0462460	0,0254525	63
64	0,528972580	0,0597802	0,0440438	0,0240118	64
65	0,523731327	0,0572059	0,0419465	0,0226526	65
66	0,518541276	0,0547425	0,0399490	0,0213704	66
67	0,513412381	0,0523852	0,0380467	0,0201608	67
68	0,508331597	0,0501294	0,0362349	0,0190196	68
69	0,503297882	0,0479707	0,0345095	0,0179430	69
70	0,498312194	0,0459050	0,0328662	0,0169274	70
71	0,493387494	0,0439282	0,0313011	0,0159692	71
72	0,488493744	0,0420366	0,0298106	0,0150653	72
73	0,483650908	0,0402264	0,0283910	0,0142125	73
74	0,478873950	0,0384941	0,0270391	0,0134081	74
75	0,474127837	0,0368365	0,0257515	0,0126491	75
76	0,469437535	0,0352502	0,0245252	0,0119331	76
77	0,464783015	0,0337323	0,0233574	0,0112577	77
78	0,460189245	0,0322797	0,0222451	0,0106204	78
79	0,455621197	0,0308897	0,0211858	0,0100193	79
80	0,451113843	0,0295595	0,0201770	0,0094522	80
81	0,446657157	0,0282866	0,0192162	0,0089171	81
82	0,442221112	0,0270685	0,0183011	0,0084124	82
83	0,437855685	0,0259029	0,0174296	0,0079362	83
84	0,433510851	0,0247874	0,0165996	0,0074870	84
85	0,429225588	0,0237200	0,0158092	0,0070632	85
86	0,424972873	0,0226986	0,0150564	0,0066634	86
87	0,420769685	0,0217211	0,0143394	0,0062862	87
88	0,416597005	0,0207858	0,0136566	0,0059304	88
89	0,412474813	0,0198907	0,0130063	0,0055947	89
90	0,408393089	0,0190342	0,0123869	0,0052780	90
91	0,404341816	0,0182145	0,0117971	0,0049793	91
92	0,400340977	0,0174302	0,0112353	0,0046974	92
93	0,396380555	0,0166796	0,0107003	0,0044315	93
94	0,392450534	0,0159613	0,0101907	0,0041807	94
95	0,388570898	0,0152740	0,0097055	0,0039441	95
96	0,384721632	0,0146163	0,0092433	0,0037208	96
97	0,380912724	0,0139868	0,0088031	0,0035102	97
98	0,377144157	0,0133845	0,0083840	0,0033115	98
99	0,373405920	0,0128082	0,0079847	0,0031241	99
100	0,369713000	0,0122566	0,0076045	0,0029472	100

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
1	1,01	1,045	1,05	1,06	1,07	1
2	1,0201	1,092025	1,1025	1,1236	1,1449	2
3	1,030301	1,141166	1,157625	1,191016	1,225043	3
4	1,040604	1,192519	1,215506	1,262477	1,310796	4
5	1,051011	1,246182	1,276282	1,338226	1,402552	5
6	1,061521	1,302260	1,340096	1,418519	1,500730	6
7	1,072131	1,360862	1,407100	1,503630	1,605781	7
8	1,082851	1,422101	1,477455	1,593848	1,718186	8
9	1,093681	1,486095	1,551328	1,689479	1,838459	9
10	1,104621	1,552969	1,628895	1,790848	1,967151	10
11	1,115661	1,622853	1,710339	1,898299	2,104852	11
12	1,126821	1,695881	1,795856	2,012196	2,252192	12
13	1,138091	1,772196	1,885649	2,132928	2,409845	13
14	1,149471	1,851945	1,979932	2,260904	2,578534	14
15	1,160961	1,935282	2,078928	2,396558	2,759032	15
16	1,172572	2,022370	2,182875	2,540352	2,952164	16
17	1,184302	2,113377	2,292018	2,692773	3,158815	17
18	1,196142	2,208479	2,406619	2,854339	3,379932	18
19	1,208102	2,307860	2,526950	3,025600	3,616528	19
20	1,220192	2,411714	2,653298	3,207135	3,869684	20
21	1,232392	2,520241	2,785963	3,399564	4,140562	21
22	1,244712	2,633652	2,925261	3,603537	4,430402	22
23	1,257162	2,752166	3,071524	3,819750	4,740530	23
24	1,269732	2,876014	3,225100	4,048935	5,072367	24
25	1,282433	3,005434	3,386355	4,291871	5,427433	25
26	1,295253	3,140679	3,555673	4,549383	5,807353	26
27	1,308203	3,282010	3,733456	4,822346	6,213868	27
28	1,321293	3,429700	3,920129	5,111687	6,648838	28
29	1,334503	3,584036	4,116136	5,418388	7,114257	29
30	1,347843	3,745318	4,321942	5,743491	7,612255	30
31	1,361323	3,913857	4,538039	6,088101	8,145113	31
32	1,374941	4,089981	4,764941	6,453387	8,715271	32
33	1,388694	4,274030	5,003189	6,840590	9,325340	33
34	1,402571	4,466362	5,253348	7,251025	9,978114	34
35	1,416601	4,667348	5,516015	7,686087	10,676581	35
36	1,430764	4,877378	5,791816	8,147252	11,423942	36
37	1,445076	5,096860	6,081407	8,636087	12,223618	37
38	1,459525	5,326219	6,385477	9,154252	13,079271	38
39	1,474125	5,565899	6,704751	9,703507	13,994820	39
40	1,488865	5,816365	7,039989	10,285718	14,974458	40
41	1,503753	6,078101	7,391988	10,902861	16,022670	41
42	1,518793	6,351615	7,761588	11,557033	17,144257	42
43	1,533978	6,637438	8,149667	12,250455	18,344355	43
44	1,549318	6,936123	8,557150	12,985482	19,628460	44
45	1,564817	7,248248	8,985008	13,764611	21,002452	45
46	1,580459	7,574420	9,434258	14,590487	22,472623	46
47	1,596267	7,915268	9,905971	15,465917	24,045707	47
48	1,612226	8,271456	10,401270	16,393872	25,728907	48
49	1,628348	8,643671	10,921333	17,377504	27,529930	49
50	1,644632	9,032636	11,467400	18,420154	29,457025	50

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
1	1,01	1,045	1,05	1,06	1,07	1
2	1,0201	1,092025	1,1025	1,1236	1,1449	2
3	1,030301	1,141166	1,157625	1,191016	1,225043	3
4	1,040604	1,192519	1,215506	1,262477	1,310796	4
5	1,051010	1,246182	1,276282	1,338226	1,402552	5
6	1,061521	1,302260	1,340096	1,418519	1,500730	6
7	1,072131	1,360862	1,407100	1,503630	1,605781	7
8	1,082851	1,422101	1,477455	1,593848	1,718186	8
9	1,093681	1,486095	1,551328	1,689479	1,838459	9
10	1,104621	1,552969	1,628895	1,790848	1,967151	10
11	1,115661	1,622853	1,710339	1,898299	2,104852	11
12	1,126821	1,695881	1,795856	2,012196	2,252192	12
13	1,138091	1,772196	1,885649	2,132928	2,409845	13
14	1,149471	1,851945	1,979932	2,260904	2,578534	14
15	1,160961	1,935282	2,078928	2,396558	2,759032	15
16	1,172572	2,022370	2,182875	2,540352	2,952164	16
17	1,184302	2,113377	2,292018	2,692773	3,158815	17
18	1,196142	2,208479	2,406619	2,854339	3,379932	18
19	1,208102	2,307860	2,526950	3,025600	3,616528	19
20	1,220192	2,411714	2,653298	3,207135	3,869684	20
21	1,232392	2,520241	2,785963	3,399564	4,140562	21
22	1,244712	2,633652	2,925261	3,603537	4,430402	22
23	1,257162	2,752166	3,071524	3,819750	4,740530	23
24	1,269732	2,876014	3,225100	4,048935	5,072367	24
25	1,282433	3,005434	3,386355	4,291871	5,427433	25
26	1,295253	3,140679	3,555673	4,549383	5,807353	26
27	1,308203	3,282010	3,733456	4,822346	6,213868	27
28	1,321293	3,429700	3,920129	5,111687	6,648838	28
29	1,334503	3,584036	4,116136	5,418388	7,114257	29
30	1,347843	3,745318	4,321942	5,743491	7,612255	30
31	1,361323	3,913857	4,538039	6,088101	8,145113	31
32	1,374944	4,089981	4,764941	6,453387	8,715271	32
33	1,388694	4,274030	5,003189	6,840590	9,325340	33
34	1,402574	4,466362	5,253348	7,251025	9,978114	34
35	1,416604	4,667348	5,516015	7,686087	10,676581	35
36	1,430764	4,877378	5,791816	8,147252	11,423942	36
37	1,445076	5,096860	6,081407	8,636087	12,223618	37
38	1,459525	5,326219	6,385477	9,154252	13,079271	38
39	1,474125	5,565899	6,704751	9,703507	13,994820	39
40	1,488865	5,816365	7,039989	10,285718	14,974458	40
41	1,503753	6,078101	7,391988	10,902861	16,022670	41
42	1,518793	6,351615	7,761588	11,557033	17,144257	42
43	1,533978	6,637438	8,149667	12,250455	18,344355	43
44	1,549318	6,936123	8,557150	12,985482	19,628460	44
45	1,564817	7,248248	8,985008	13,764611	21,002452	45
46	1,580457	7,574420	9,434258	14,590487	22,472623	46
47	1,596267	7,915268	9,905971	15,465917	24,045707	47
48	1,612226	8,271456	10,401270	16,393872	25,728907	48
49	1,628348	8,643671	10,921333	17,377504	27,529930	49
50	1,644632	9,032636	11,467400	18,420154	29,457025	50

Jahr	4 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
5	7,390951	9,439105	12,040770	19,525364	31,519017	51
5	7,686589	9,863865	12,642808	20,696885	33,725348	52
5	7,994052	10,307739	13,274949	21,938698	36,086122	53
5	8,313814	10,771587	13,938696	23,255020	38,612151	54
5	8,646367	11,256308	14,635631	24,650322	41,315001	55
5	8,992222	11,762842	15,367412	26,129341	44,207052	56
5	9,351910	12,292170	16,135783	27,697101	47,301545	57
5	9,725987	12,845318	16,942572	29,358927	50,612653	58
5	10,115026	13,423357	17,789701	31,120463	54,155539	59
6	10,519627	14,027408	18,679186	32,987691	57,946427	60
6	10,940413	14,658641	19,613145	34,966952	62,002677	61
6	11,378029	15,318280	20,593802	37,064969	66,342864	62
6	11,833150	16,007603	21,623493	39,288868	70,986865	63
6	12,306476	16,727945	22,704667	41,646200	75,955945	64
6	12,798735	17,480702	23,839901	44,144972	81,272861	65
6	13,310685	18,267334	25,031896	46,793700	86,961962	66
6	13,843112	19,089364	26,283490	49,601290	93,049299	67
6	14,396836	19,948385	27,597665	52,577368	99,562750	68
6	14,972710	20,846063	28,977548	55,732010	106,532142	69
6	15,571618	21,784136	30,426426	59,075930	113,989392	70
6	16,194483	22,764422	31,947747	62,620486	121,968650	71
6	16,842262	23,788821	33,545134	66,387715	130,506455	72
6	17,515953	24,859318	35,222391	70,360378	139,641907	73
6	18,216591	25,977987	36,983510	74,582001	149,416840	74
6	18,945255	27,146996	38,832686	79,056921	159,876019	75
6	19,703065	28,368611	40,774320	83,800336	171,067341	76
6	20,491187	29,645199	42,813036	88,828356	183,042055	77
6	21,310835	30,979233	44,953688	94,158058	195,854998	78
6	22,163268	32,373298	47,201372	99,807541	209,564848	79
6	23,049799	33,830096	49,561441	105,795993	224,234388	80
6	23,971791	35,352451	52,039513	112,143753	239,930795	81
6	24,930663	36,943311	54,641489	118,872378	256,725950	82
6	25,927889	38,605760	57,373563	126,004721	274,696766	83
6	26,965005	40,343019	60,242241	133,565004	293,925541	84
6	28,043605	42,158455	63,254353	141,578904	314,500328	85
6	29,165349	44,055586	66,417071	150,073639	336,515351	86
6	30,331963	46,038087	69,737925	159,078057	360,071426	87
6	31,545242	48,109801	73,224821	168,622741	385,276426	88
6	32,807051	50,274742	76,886062	178,740105	412,245776	89
6	34,119333	52,537105	80,730365	189,464511	441,102980	90
6	35,484107	54,901275	84,766883	200,832382	471,980188	91
6	36,903471	57,371832	89,005227	212,882325	505,018802	92
6	38,379610	59,953565	93,455489	225,655264	540,370118	93
6	39,914794	62,651475	98,128263	239,194580	578,196026	94
6	41,511386	65,470792	103,034676	253,546255	618,669748	95
6	43,171841	68,416977	108,186410	268,759030	661,976630	96
6	44,898715	71,495741	113,595731	284,884572	708,314994	97
6	46,694664	74,713050	119,275517	301,977646	757,897044	98
6	48,562450	78,075137	125,239293	320,096305	810,949837	99
10	50,504948	81,588518	131,501258	339,302084	867,716326	100

Jahre.	1 %	$\frac{1}{2}$ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
51	1,6610	439105	12,040770	19,525364	31,519017	51
52	1,6776	863865	12,642808	20,696885	33,725348	52
53	1,6944	307739	13,274949	21,938698	36,086122	53
54	1,7114	771587	13,938696	23,255020	38,612151	54
55	1,7285	256308	14,635631	24,650322	41,315001	55
56	1,7458	762842	15,367412	26,129341	44,207052	56
57	1,7632	292170	16,135783	27,697101	47,301545	57
58	1,7809	845318	16,942572	29,358927	50,612653	58
59	1,7987	423357	17,789701	31,120463	54,155539	59
60	1,8166	027408	18,679186	32,987691	57,946427	60
61	1,8348	658641	19,613145	34,966952	62,002677	61
62	1,8532	318280	20,593802	37,064969	66,342864	62
63	1,8717	007603	21,623493	39,288868	70,986865	63
64	1,8904	727945	22,704667	41,646200	75,955945	64
65	1,9093	480702	23,839901	44,144972	81,272861	65
66	1,9284	267334	25,031896	46,793700	86,961962	66
67	1,9477	089364	26,283490	49,601290	93,049299	67
68	1,9672	948385	27,597665	52,577368	99,562750	68
69	1,9868	846063	28,977548	55,732010	106,532142	69
70	2,0067	784136	30,426426	59,075930	113,989392	70
71	2,0268	764422	31,947747	62,620486	121,968650	71
72	2,0470	788821	33,545134	66,387715	130,506455	72
73	2,0675	859318	35,222391	70,360378	139,641907	73
74	2,0882	977987	36,983510	74,582001	149,416840	74
75	2,1091	146996	38,832686	79,056921	159,876019	75
76	2,1302	368611	40,774320	83,800336	171,067341	76
77	2,1515	645199	42,813036	88,828356	183,042055	77
78	2,1730	979233	44,953688	94,158058	195,854998	78
79	2,1947	373298	47,201372	99,807541	209,564848	79
80	2,2167	830096	49,561441	105,795993	224,234388	80
81	2,2388	352451	52,039513	112,143753	239,930795	81
82	2,2612	943311	54,641489	118,872378	256,725950	82
83	2,2838	605760	57,373563	126,004721	274,696766	83
84	2,3067	343019	60,242241	133,565004	293,925541	84
85	2,3297	158455	63,254353	141,578904	314,500328	85
86	2,3530	055586	66,417071	150,073639	336,515351	86
87	2,3766	038087	69,737925	159,078057	360,071426	87
88	2,4003	109801	73,224821	168,622741	385,276426	88
89	2,4243	274742	76,886062	178,740105	412,245776	89
90	2,4486	537105	80,730365	189,464511	441,102980	90
91	2,4731	901275	84,766883	200,832382	471,980188	91
92	2,4978	371832	89,005227	212,882325	505,018802	92
93	2,5228	953565	93,455489	225,655264	540,370118	93
94	2,5480	651475	98,128263	239,194580	578,196026	94
95	2,5735	470792	103,034676	253,546255	618,669748	95
96	2,5992	416977	108,186410	268,759030	661,976630	96
97	2,6252	495741	113,595731	284,884572	708,314994	97
98	2,6515	713050	119,275517	301,977646	757,897044	98
99	2,6780	075137	125,239293	320,096305	810,949837	99
100	2,7048	588518	131,501258	339,302084	867,716326	100

Jahre.	1 %	%	4½ %	5 %	6 %	Jahre.
1	0,990099	0,990099	0,9569378	0,9523810	0,9433962	1
2	0,980296	0,980296	0,9157300	0,9070295	0,8899964	2
3	0,970590	0,970590	0,8762966	0,8638376	0,8396193	3
4	0,960980	0,960980	0,8385613	0,8227025	0,7920937	4
5	0,951465	0,951465	0,8024510	0,7835262	0,7472582	5
6	0,942045	0,942045	0,7678957	0,7462154	0,7049605	6
7	0,932718	0,932718	0,7348285	0,7106813	0,6650571	7
8	0,923483	0,923483	0,7031851	0,6768394	0,6274124	8
9	0,914339	0,914339	0,6729044	0,6446089	0,5918985	9
10	0,905287	0,905287	0,6439277	0,6139133	0,5583948	10
11	0,896323	0,896323	0,6161987	0,5846793	0,5267875	11
12	0,887449	0,887449	0,5896639	0,5568374	0,4969694	12
13	0,878662	0,878662	0,5642716	0,5303214	0,4688390	13
14	0,869963	0,869963	0,5399729	0,5050680	0,4423010	14
15	0,861349	0,861349	0,5167204	0,4810171	0,4172651	15
16	0,852821	0,852821	0,4944693	0,4581115	0,3936463	16
17	0,844377	0,844377	0,4731764	0,4362967	0,3713644	17
18	0,836017	0,836017	0,4528004	0,4155207	0,3503438	18
19	0,827739	0,827739	0,4333018	0,3957340	0,3305130	19
20	0,819544	0,819544	0,4146429	0,3768895	0,3118047	20
21	0,811430	0,811430	0,3967874	0,3589424	0,2941554	21
22	0,803396	0,803396	0,3797009	0,3418499	0,2775051	22
23	0,795441	0,795441	0,3633501	0,3255713	0,2617973	23
24	0,787566	0,787566	0,3477035	0,3100679	0,2469785	24
25	0,779768	0,779768	0,3327306	0,2953028	0,2329986	25
26	0,772048	0,772048	0,3184025	0,2812407	0,2198100	26
27	0,764403	0,764403	0,3046914	0,2678483	0,2073680	27
28	0,756835	0,756835	0,2915707	0,2550936	0,1956301	28
29	0,749342	0,749342	0,2790150	0,2429463	0,1845567	29
30	0,741922	0,741922	0,2670000	0,2313774	0,1741101	30
31	0,734577	0,734577	0,2555024	0,2203595	0,1642548	31
32	0,727304	0,727304	0,2444999	0,2098662	0,1549574	32
33	0,720103	0,720103	0,2339712	0,1998725	0,1461862	33
34	0,712973	0,712973	0,2238959	0,1903548	0,1379115	34
35	0,705914	0,705914	0,2142544	0,1812903	0,1301052	35
36	0,689924	0,689924	0,2050282	0,1726574	0,1227408	36
37	0,692004	0,692004	0,1961992	0,1644356	0,1157932	37
38	0,685153	0,685153	0,1877504	0,1566054	0,1092388	38
39	0,678369	0,678369	0,1796655	0,1491480	0,1030555	39
40	0,671653	0,671653	0,1719287	0,1420457	0,0972222	40
41	0,665003	0,665003	0,1645251	0,1352816	0,0917190	41
42	0,658418	0,658418	0,1574403	0,1288396	0,0865274	42
43	0,651899	0,651899	0,1506605	0,1227044	0,0816296	43
44	0,645445	0,645445	0,1441728	0,1168613	0,0770091	44
45	0,639054	0,639054	0,1379644	0,1112965	0,0726501	45
46	0,632727	0,632727	0,1320233	0,1059967	0,0685378	46
47	0,626463	0,626463	0,1263381	0,1009492	0,0646583	47
48	0,620260	0,620260	0,1208977	0,0961421	0,0609984	48
49	0,614119	0,614119	0,1156916	0,0915639	0,0575457	49
50	0,608038	0,608038	0,1107097	0,0872037	0,0542884	50

Table	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th
1	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
2	2.00000	2.00000	2.00000	2.00000	2.00000
3	3.00000	3.00000	3.00000	3.00000	3.00000
4	4.00000	4.00000	4.00000	4.00000	4.00000
5	5.00000	5.00000	5.00000	5.00000	5.00000
6	6.00000	6.00000	6.00000	6.00000	6.00000
7	7.00000	7.00000	7.00000	7.00000	7.00000
8	8.00000	8.00000	8.00000	8.00000	8.00000
9	9.00000	9.00000	9.00000	9.00000	9.00000
10	10.00000	10.00000	10.00000	10.00000	10.00000
11	11.00000	11.00000	11.00000	11.00000	11.00000
12	12.00000	12.00000	12.00000	12.00000	12.00000
13	13.00000	13.00000	13.00000	13.00000	13.00000
14	14.00000	14.00000	14.00000	14.00000	14.00000
15	15.00000	15.00000	15.00000	15.00000	15.00000
16	16.00000	16.00000	16.00000	16.00000	16.00000
17	17.00000	17.00000	17.00000	17.00000	17.00000
18	18.00000	18.00000	18.00000	18.00000	18.00000
19	19.00000	19.00000	19.00000	19.00000	19.00000
20	20.00000	20.00000	20.00000	20.00000	20.00000
21	21.00000	21.00000	21.00000	21.00000	21.00000
22	22.00000	22.00000	22.00000	22.00000	22.00000
23	23.00000	23.00000	23.00000	23.00000	23.00000
24	24.00000	24.00000	24.00000	24.00000	24.00000
25	25.00000	25.00000	25.00000	25.00000	25.00000
26	26.00000	26.00000	26.00000	26.00000	26.00000
27	27.00000	27.00000	27.00000	27.00000	27.00000
28	28.00000	28.00000	28.00000	28.00000	28.00000
29	29.00000	29.00000	29.00000	29.00000	29.00000
30	30.00000	30.00000	30.00000	30.00000	30.00000
31	31.00000	31.00000	31.00000	31.00000	31.00000
32	32.00000	32.00000	32.00000	32.00000	32.00000
33	33.00000	33.00000	33.00000	33.00000	33.00000
34	34.00000	34.00000	34.00000	34.00000	34.00000
35	35.00000	35.00000	35.00000	35.00000	35.00000
36	36.00000	36.00000	36.00000	36.00000	36.00000
37	37.00000	37.00000	37.00000	37.00000	37.00000
38	38.00000	38.00000	38.00000	38.00000	38.00000
39	39.00000	39.00000	39.00000	39.00000	39.00000
40	40.00000	40.00000	40.00000	40.00000	40.00000
41	41.00000	41.00000	41.00000	41.00000	41.00000
42	42.00000	42.00000	42.00000	42.00000	42.00000
43	43.00000	43.00000	43.00000	43.00000	43.00000
44	44.00000	44.00000	44.00000	44.00000	44.00000
45	45.00000	45.00000	45.00000	45.00000	45.00000
46	46.00000	46.00000	46.00000	46.00000	46.00000
47	47.00000	47.00000	47.00000	47.00000	47.00000
48	48.00000	48.00000	48.00000	48.00000	48.00000
49	49.00000	49.00000	49.00000	49.00000	49.00000
50	50.00000	50.00000	50.00000	50.00000	50.00000

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	Jahre.
51	0,6020183006	0,1059422	0,0830512	0,0512154	51
52	0,596058967	0,1013801	0,0790964	0,0483164	52
53	0,590156930	0,0970145	0,0753299	0,0455816	53
54	0,584313817	0,0928368	0,0717427	0,0430015	54
55	0,578528555	0,0888391	0,0683264	0,0405674	55
56	0,5728002072	0,0850135	0,0650728	0,0382712	56
57	0,567128300	0,0813526	0,0619741	0,0361049	57
58	0,561513173	0,0778494	0,0590229	0,0340612	58
59	0,555954628	0,0744970	0,0562123	0,0321332	59
60	0,550449604	0,0712890	0,0535355	0,0303143	60
61	0,544994042	0,0682191	0,0509862	0,0285984	61
62	0,539603887	0,0652815	0,0485583	0,0269797	62
63	0,534261084	0,0624703	0,0462460	0,0254525	63
64	0,528972580	0,0597802	0,0440438	0,0240118	64
65	0,523731327	0,0572059	0,0419465	0,0226526	65
66	0,518548276	0,0547425	0,0399490	0,0213704	66
67	0,513412381	0,0523852	0,0380467	0,0201608	67
68	0,508331597	0,0501294	0,0362349	0,0190196	68
69	0,503297882	0,0479707	0,0345095	0,0179430	69
70	0,498312194	0,0459050	0,0328662	0,0169274	70
71	0,493387494	0,0439282	0,0313011	0,0159692	71
72	0,488496744	0,0420366	0,0298106	0,0150653	72
73	0,483650908	0,0402264	0,0283910	0,0142125	73
74	0,478878950	0,0384941	0,0270391	0,0134081	74
75	0,474127837	0,0368365	0,0257515	0,0126491	75
76	0,469437535	0,0352502	0,0245252	0,0119331	76
77	0,464783015	0,0337323	0,0233574	0,0112577	77
78	0,460189245	0,0322797	0,0222451	0,0106204	78
79	0,455621197	0,0308897	0,0211858	0,0100193	79
80	0,451113843	0,0295595	0,0201770	0,0094522	80
81	0,446657157	0,0282866	0,0192162	0,0089171	81
82	0,442221112	0,0270685	0,0183011	0,0084124	82
83	0,437855685	0,0259029	0,0174296	0,0079362	83
84	0,433510851	0,0247874	0,0165996	0,0074870	84
85	0,429225588	0,0237200	0,0158092	0,0070632	85
86	0,424972873	0,0226986	0,0150564	0,0066634	86
87	0,420769685	0,0217211	0,0143394	0,0062862	87
88	0,416597005	0,0207858	0,0136566	0,0059304	88
89	0,412474813	0,0198907	0,0130063	0,0055947	89
90	0,408393089	0,0190342	0,0123869	0,0052780	90
91	0,404341816	0,0182145	0,0117971	0,0049793	91
92	0,400340977	0,0174302	0,0112353	0,0046974	92
93	0,396380555	0,0166796	0,0107003	0,0044315	93
94	0,392450534	0,0159613	0,0101907	0,0041807	94
95	0,388570898	0,0152740	0,0097055	0,0039441	95
96	0,384721632	0,0146163	0,0092433	0,0037208	96
97	0,380912724	0,0139868	0,0088031	0,0035102	97
98	0,377144157	0,0133845	0,0083840	0,0033115	98
99	0,373405920	0,0128082	0,0079847	0,0031241	99
100	0,369713000	0,0122566	0,0076045	0,0029472	100

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
1	0,990090	0,9569378	0,9523810	0,9433962	0,9346	1
2	1,970391	1,8726678	1,8594104	1,8333927	1,8080	2
3	2,940982	2,7489644	2,7232480	2,6730119	2,6243	3
4	3,901963	3,5875257	3,5459505	3,4651056	3,3872	4
5	4,853434	4,3899767	4,3294767	4,2123638	4,1002	5
6	5,795475	5,1578725	5,0756921	4,9173243	4,7665	6
7	6,728195	6,8927009	5,7863734	5,5823814	5,3893	7
8	7,651675	7,5958861	6,4632128	6,2097938	5,9713	8
9	8,566017	8,2687905	7,1078217	6,8016923	6,5152	9
10	9,471307	9,127182	7,7217349	7,3600871	7,0236	10
11	10,367623	10,5289169	8,3064142	7,8868746	7,4987	11
12	11,255077	11,185808	8,8632516	8,3838439	7,9427	12
13	12,133749	12,6828524	9,3935730	8,8526830	8,3577	13
14	13,003702	13,2228253	9,8986409	9,2949839	8,7455	14
15	13,865059	13,7395457	10,3796580	9,7122490	9,1079	15
16	14,717872	14,2340150	10,8377696	10,1058953	9,4466	16
17	15,562257	15,7071914	11,2740662	10,4772597	9,7632	17
18	16,398206	16,1599918	11,6895869	10,8276035	10,0591	18
19	17,226005	17,5932936	12,0853209	11,1581165	10,3356	19
20	18,045555	18,0079365	12,4622103	11,4699212	10,5940	20
21	18,856984	18,4047239	12,8211527	11,7640766	10,8355	21
22	19,660377	19,7844248	13,1630026	12,0415817	11,0612	22
23	20,455821	20,1477749	13,4885739	12,3033790	11,2722	23
24	21,243384	21,4954784	13,7986418	12,5503575	11,4693	24
25	22,023138	22,8282090	14,0939446	12,7833562	11,6536	25
26	22,795201	23,1466114	14,3751853	13,0031662	11,8258	26
27	23,559604	23,4513028	14,6430336	13,2105341	11,9867	27
28	24,316447	24,7428735	14,8981273	13,4061643	12,1371	28
29	25,065780	25,0218885	15,1410736	13,5907210	12,2777	29
30	25,807702	25,2888885	15,3724510	13,7648312	12,4090	30
31	26,542285	26,5443910	15,5928105	13,9290860	12,5318	31
32	27,269587	27,7888909	15,8026767	14,0840434	12,6466	32
33	27,989690	28,0228621	16,0025492	14,2302296	12,7538	33
34	28,702662	28,2467580	16,1929040	14,3681411	12,8540	34
35	29,408584	29,4610124	16,3741943	14,4982464	12,9477	35
36	30,107506	30,6660406	16,5468517	14,6209871	13,0352	36
37	30,799508	30,8622398	16,7112873	14,7367803	13,1170	37
38	31,484660	31,0499902	16,8678927	14,8460192	13,1935	38
39	32,163032	32,2296557	17,0170407	14,9490747	13,2649	39
40	32,834684	32,4015844	17,1590864	15,0462969	13,3317	40
41	33,499685	33,5661095	17,2943680	15,1380159	13,3941	41
42	34,158107	34,7235498	17,4232076	15,2245433	13,4524	42
43	34,810008	34,8742103	17,5459120	15,3061729	13,5070	43
44	35,455450	35,0183831	17,6627733	15,3831820	13,5579	44
45	36,094501	36,1563474	17,7740698	15,4558321	13,6055	45
46	36,727232	36,2883707	17,8800665	15,5243699	13,6500	46
47	37,353694	37,4147088	17,9810157	15,5890282	13,6916	47
48	37,973955	37,5356065	18,0771578	15,6500266	13,7305	48
49	38,588076	38,6512981	18,1687217	15,7075723	13,7668	49
50	39,196117	39,7620078	18,2559255	15,7618606	13,8007	50

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
51	39,79819	8679500	18,3389766	15,8130761	13,8325	51
52	40,39419	9693302	18,4180730	15,8613925	13,8621	52
53	40,98439	0663447	18,4934028	15,9069741	13,8898	53
54	41,56869	1591815	18,5651456	15,9499755	13,9157	54
55	42,14719	2480206	18,6334720	15,9905430	13,9399	55
56	42,71999	3330340	18,6985447	16,0288141	13,9626	56
57	43,28719	4143866	18,7605188	16,0649190	13,9837	57
58	43,84869	4922360	18,8195417	16,0989802	14,0035	58
59	44,40459	5667330	18,8757540	16,1311134	14,0219	59
60	44,95509	6380220	18,9292895	16,1614277	14,0392	60
61	45,50009	7062412	18,9802757	16,1900261	14,0553	61
62	46,03969	7715227	19,0288340	16,2170058	14,0704	62
63	46,57399	8339930	19,0750800	16,2424583	14,0845	63
64	47,10289	8937732	19,1191238	16,2664701	14,0976	64
65	47,62669	9509791	19,1610703	16,2891227	14,1099	65
66	48,14519	0057217	19,2010194	16,3104931	14,1214	66
67	48,65859	0581068	19,2390661	16,3306539	14,1322	67
68	49,16699	1082362	19,2753010	16,3496735	14,1422	68
69	49,67019	1562069	19,3098105	16,3676165	14,1516	69
70	50,16859	2021119	19,3426766	16,3845439	14,1604	70
71	50,66189	2460401	19,3739778	16,4005131	14,1686	71
72	51,15039	2880766	19,4037883	16,4155784	14,1763	72
73	51,63409	3283030	19,4321794	16,4297909	14,1834	73
74	52,11299	3667971	19,4592185	16,4431990	14,1901	74
75	52,58709	4036336	19,4849700	16,4558481	14,1964	75
76	53,05649	4388838	19,5094952	16,4677812	14,2022	76
77	53,52129	4726161	19,5328526	16,4790389	14,2077	77
78	53,98149	5048958	19,5550977	16,4896593	14,2128	78
79	54,43709	5357854	19,5762835	16,4996786	14,2175	79
80	54,88829	5653449	19,5964605	16,5091308	14,2220	80
81	55,33489	5936315	19,6156767	16,5180479	14,2262	81
82	55,77709	6207000	19,6339778	16,5264603	14,2301	82
83	56,21499	6466029	19,6514074	16,5343965	14,2337	83
84	56,64849	6713903	19,6680070	16,5418835	14,2371	84
85	57,07769	6951103	19,6838162	16,5489467	14,2403	85
86	57,50269	7178089	19,6988726	16,5556101	14,2433	86
87	57,92349	7395301	19,7132120	16,5618963	14,2460	87
88	58,34009	7603159	19,7268686	16,5678267	14,2486	88
89	58,75249	7802066	19,7398748	16,5734214	14,2511	89
90	59,16089	7992407	19,7522617	16,5786994	14,2533	90
91	59,56529	8174553	19,7640588	16,5836787	14,2554	91
92	59,96559	8348854	19,7752941	16,5883762	14,2574	92
93	60,36199	8515650	19,7859944	16,5928077	14,2593	93
94	60,75449	8675263	19,7961851	16,5969884	14,2610	94
95	61,14299	8828003	19,8058906	16,6009324	14,2626	95
96	61,52779	8974166	19,8151339	16,6046532	14,2641	96
97	61,90869	9114034	19,8239370	16,6081634	14,2655	97
98	62,28579	9247879	19,8323210	16,6114749	14,2669	98
99	62,65919	9375961	19,8403057	16,6145990	14,2681	99
100	63,02889	9498527	19,8479102	16,6175462	14,2693	100

1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o
100	99	98	97	96	95
94	93	92	91	90	89
88	87	86	85	84	83
82	81	80	79	78	77
76	75	74	73	72	71
70	69	68	67	66	65
64	63	62	61	60	59
58	57	56	55	54	53
52	51	50	49	48	47
46	45	44	43	42	41
40	39	38	37	36	35
34	33	32	31	30	29
28	27	26	25	24	23
22	21	20	19	18	17
16	15	14	13	12	11
10	9	8	7	6	5
4	3	2	1		

Alter.	Süssmil Bauma
	Lebende.
0	1000
1	750
2	661
3	618
4	593
5	579
6	567
7	556
8	547
9	539
10	532
11	527
12	523
13	519
14	515
15	511
16	507
17	503
18	499
19	495
20	491
21	486
22	481
23	476
24	471
25	466
26	461
27	456
28	451
29	445
30	439
31	433
32	427
33	421
34	415
35	409
36	402
37	395
38	388
39	381
40	374
41	367
42	360
43	353
44	346
45	339
46	332
47	324
48	316

	9	D. 1.
6	474	0,8
3	551	0,8
9	627	0,8
4	701	0,8
7	774	0,8
9	846	0,7
0	917	0,7
0	987	0,6
3	*055	0,7
6	122	0,7
2	189	0,6
3	254	0,7
2	319	0,6
3	382	0,6
9	445	0,6
0	506	0,7
1	567	0,6
1	627	0,6
1	686	0,6
9	745	0,6
7	802	0,6
4	859	0,6
0	915	0,6
9	971	0,5
9	*025	0,6
7	079	0,6
4	133	0,5
1	186	0,5
9	238	0,5
7	289	0,5
4	340	0,5
1	390	0,5
9	440	0,5
7	489	0,5
4	538	0,4
1	586	0,4
9	633	0,5
7	680	0,5
4	727	0,4
1	773	0,4
9	818	0,5
7	863	0,5
4	908	0,4
1	952	0,4
9	996	0,4
	9	D. 1.

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
1	0,990090	0,9569378	0,9523810	0,9433962	0,9346	1
2	1,970391	1,8726678	1,8594104	1,8333927	1,8080	2
3	2,940982	2,7489644	2,7232480	2,6730119	2,6243	3
4	3,901963	3,5875257	3,5459505	3,4651056	3,3872	4
5	4,853434	4,3899767	4,3294767	4,2123638	4,1002	5
6	5,795475	5,1578725	5,0756921	4,9173243	4,7665	6
7	6,728195	6,8927009	5,7863734	5,5823814	5,3893	7
8	7,651675	7,5958861	6,4632128	6,2097938	5,9713	8
9	8,566017	8,2687905	7,1078217	6,8016923	6,5152	9
10	9,471307	9,127182	7,7217349	7,3600871	7,0236	10
11	10,367623	10,5289169	8,3064142	7,8868746	7,4987	11
12	11,255071	11,185808	8,8632516	8,3838439	7,9427	12
13	12,133749	12,6828524	9,3935730	8,8526830	8,3577	13
14	13,003702	13,2228253	9,8986409	9,2949839	8,7455	14
15	13,865057	13,7395457	10,3796580	9,7122490	9,1079	15
16	14,717872	14,2340150	10,8377696	10,1058953	9,4466	16
17	15,562257	15,7071914	11,2740662	10,4772597	9,7632	17
18	16,398201	16,1599918	11,6895869	10,8276035	10,0591	18
19	17,226005	17,5932936	12,0853209	11,1581165	10,3356	19
20	18,045555	18,0079365	12,4622103	11,4699212	10,5940	20
21	18,856984	18,4047239	12,8211527	11,7640766	10,8355	21
22	19,660377	19,7844248	13,1630026	12,0415817	11,0612	22
23	20,455821	20,1477749	13,4885739	12,3033790	11,2722	23
24	21,243384	21,4954784	13,7986418	12,5503575	11,4693	24
25	22,023158	22,8282090	14,0939446	12,7833562	11,6536	25
26	22,795201	23,1466114	14,3751853	13,0031662	11,8258	26
27	23,559604	23,4513028	14,6430336	13,2105341	11,9867	27
28	24,316447	24,28735	14,8981273	13,4061643	12,1371	28
29	25,065780	25,0218885	15,1410736	13,5907210	12,2777	29
30	25,807702	25,2888885	15,3724510	13,7648312	12,4090	30
31	26,542285	26,5443910	15,5928105	13,9290860	12,5318	31
32	27,269587	27,7888909	15,8026767	14,0840434	12,6466	32
33	27,989690	28,0228621	16,0025492	14,2302296	12,7538	33
34	28,702662	28,2467580	16,1929040	14,3681411	12,8540	34
35	29,408584	29,4610124	16,3741943	14,4982464	12,9477	35
36	30,107506	30,6660406	16,5468517	14,6209871	13,0352	36
37	30,799508	30,8622398	16,7112873	14,7367803	13,1170	37
38	31,484660	31,0499902	16,8678927	14,8460192	13,1935	38
39	32,163032	32,2296557	17,0170407	14,9490747	13,2649	39
40	32,834684	32,4015844	17,1590864	15,0462969	13,3317	40
41	33,499685	33,5661095	17,2943680	15,1380159	13,3941	41
42	34,158107	34,7235498	17,4232076	15,2245433	13,4524	42
43	34,810008	34,8742103	17,5459120	15,3061729	13,5070	43
44	35,455450	35,0183831	17,6627733	15,3831820	13,5579	44
45	36,094501	36,1563474	17,7740698	15,4558321	13,6055	45
46	36,727232	36,2883707	17,8800665	15,5243699	13,6500	46
47	37,353694	37,4147088	17,9810157	15,5890282	13,6916	47
48	37,973955	37,5356065	18,0771578	15,6500266	13,7305	48
49	38,588076	38,6512981	18,1687217	15,7075723	13,7668	49
50	39,196117	39,7620078	18,2559255	15,7618606	13,8007	50

Table	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o
1	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	1.0703391	1.0703391	1.0703391	1.0703391	1.0703391
3	2.0406782	2.0406782	2.0406782	2.0406782	2.0406782
4	3.0110173	3.0110173	3.0110173	3.0110173	3.0110173
5	4.0213564	4.0213564	4.0213564	4.0213564	4.0213564
6	5.0316955	5.0316955	5.0316955	5.0316955	5.0316955
7	6.0420346	6.0420346	6.0420346	6.0420346	6.0420346
8	7.0523737	7.0523737	7.0523737	7.0523737	7.0523737
9	8.0627128	8.0627128	8.0627128	8.0627128	8.0627128
10	9.0730519	9.0730519	9.0730519	9.0730519	9.0730519
11	10.0833910	10.0833910	10.0833910	10.0833910	10.0833910
12	11.0937301	11.0937301	11.0937301	11.0937301	11.0937301
13	12.1040692	12.1040692	12.1040692	12.1040692	12.1040692
14	13.1144083	13.1144083	13.1144083	13.1144083	13.1144083
15	14.1247474	14.1247474	14.1247474	14.1247474	14.1247474
16	15.1350865	15.1350865	15.1350865	15.1350865	15.1350865
17	16.1454256	16.1454256	16.1454256	16.1454256	16.1454256
18	17.1557647	17.1557647	17.1557647	17.1557647	17.1557647
19	18.1661038	18.1661038	18.1661038	18.1661038	18.1661038
20	19.1764429	19.1764429	19.1764429	19.1764429	19.1764429
21	20.1867820	20.1867820	20.1867820	20.1867820	20.1867820
22	21.1971211	21.1971211	21.1971211	21.1971211	21.1971211
23	22.2074602	22.2074602	22.2074602	22.2074602	22.2074602
24	23.2177993	23.2177993	23.2177993	23.2177993	23.2177993
25	24.2281384	24.2281384	24.2281384	24.2281384	24.2281384
26	25.2384775	25.2384775	25.2384775	25.2384775	25.2384775
27	26.2488166	26.2488166	26.2488166	26.2488166	26.2488166
28	27.2591557	27.2591557	27.2591557	27.2591557	27.2591557
29	28.2694948	28.2694948	28.2694948	28.2694948	28.2694948
30	29.2798339	29.2798339	29.2798339	29.2798339	29.2798339
31	30.2901730	30.2901730	30.2901730	30.2901730	30.2901730
32	31.3005121	31.3005121	31.3005121	31.3005121	31.3005121
33	32.3108512	32.3108512	32.3108512	32.3108512	32.3108512
34	33.3211903	33.3211903	33.3211903	33.3211903	33.3211903
35	34.3315294	34.3315294	34.3315294	34.3315294	34.3315294
36	35.3418685	35.3418685	35.3418685	35.3418685	35.3418685
37	36.3522076	36.3522076	36.3522076	36.3522076	36.3522076
38	37.3625467	37.3625467	37.3625467	37.3625467	37.3625467
39	38.3728858	38.3728858	38.3728858	38.3728858	38.3728858
40	39.3832249	39.3832249	39.3832249	39.3832249	39.3832249
41	40.3935640	40.3935640	40.3935640	40.3935640	40.3935640
42	41.4039031	41.4039031	41.4039031	41.4039031	41.4039031
43	42.4142422	42.4142422	42.4142422	42.4142422	42.4142422
44	43.4245813	43.4245813	43.4245813	43.4245813	43.4245813
45	44.4349204	44.4349204	44.4349204	44.4349204	44.4349204
46	45.4452595	45.4452595	45.4452595	45.4452595	45.4452595
47	46.4555986	46.4555986	46.4555986	46.4555986	46.4555986
48	47.4659377	47.4659377	47.4659377	47.4659377	47.4659377
49	48.4762768	48.4762768	48.4762768	48.4762768	48.4762768
50	49.4866159	49.4866159	49.4866159	49.4866159	49.4866159

Jahre.	1 %	4½ %	5 %	6 %	7 %	Jahre.
51	39,79819	8679500	18,3389766	15,8130761	13,8325	51
52	40,39419	9693302	18,4180730	15,8613925	13,8621	52
53	40,98439	0663447	18,4934028	15,9069741	13,8898	53
54	41,56869	1591815	18,5651456	15,9499755	13,9157	54
55	42,14719	2480206	18,6334720	15,9905430	13,9399	55
56	42,71999	3330340	18,6985447	16,0288141	13,9626	56
57	43,28719	4143866	18,7605188	16,0649190	13,9837	57
58	43,84869	4922360	18,8195417	16,0989802	14,0035	58
59	44,40459	5667330	18,8757540	16,1311134	14,0219	59
60	44,95509	6380220	18,9292895	16,1614277	14,0392	60
61	45,50009	7062412	18,9802757	16,1900261	14,0553	61
62	46,03969	7715227	19,0288340	16,2170058	14,0704	62
63	46,57399	8339930	19,0750800	16,2424583	14,0845	63
64	47,10289	8937732	19,1191238	16,2664701	14,0976	64
65	47,62669	9509791	19,1610703	16,2891227	14,1099	65
66	48,14519	0057217	19,2010194	16,3104931	14,1214	66
67	48,65859	0581068	19,2390661	16,3306539	14,1322	67
68	49,16699	1082362	19,2753010	16,3496735	14,1422	68
69	49,67019	1562069	19,3098105	16,3676165	14,1516	69
70	50,16859	2021119	19,3426766	16,3845439	14,1604	70
71	50,66189	2460401	19,3739778	16,4005131	14,1686	71
72	51,15039	2880766	19,4037883	16,4155784	14,1763	72
73	51,63409	3283030	19,4321794	16,4297909	14,1834	73
74	52,11299	3667971	19,4592185	16,4431990	14,1901	74
75	52,58709	4036336	19,4849700	16,4558481	14,1964	75
76	53,05649	4388838	19,5094952	16,4677812	14,2022	76
77	53,52129	4726161	19,5328526	16,4790389	14,2077	77
78	53,98149	5048958	19,5550977	16,4896593	14,2128	78
79	54,43709	5357854	19,5762835	16,4996786	14,2175	79
80	54,88829	5653449	19,5964605	16,5091308	14,2220	80
81	55,33489	5936315	19,6156767	16,5180479	14,2262	81
82	55,77709	6207000	19,6339778	16,5264603	14,2301	82
83	56,21499	6466029	19,6514074	16,5343965	14,2337	83
84	56,64849	6713903	19,6680070	16,5418835	14,2371	84
85	57,07769	6951103	19,6838162	16,5489467	14,2403	85
86	57,50269	7178089	19,6988726	16,5556101	14,2433	86
87	57,92349	7395301	19,7132120	16,5618963	14,2460	87
88	58,34009	7603159	19,7268686	16,5678267	14,2486	88
89	58,75249	7802066	19,7398748	16,5734214	14,2511	89
90	59,16089	7992407	19,7522617	16,5786994	14,2533	90
91	59,56529	8174553	19,7640588	16,5836787	14,2554	91
92	59,96559	8348854	19,7752941	16,5883762	14,2574	92
93	60,36199	8515650	19,7859944	16,5928077	14,2593	93
94	60,75449	8675263	19,7961851	16,5969884	14,2610	94
95	61,14299	8828003	19,8058906	16,6009324	14,2626	95
96	61,52779	8974166	19,8151339	16,6046532	14,2641	96
97	61,90869	9114034	19,8239370	16,6081634	14,2655	97
98	62,28579	9247879	19,8323210	16,6114749	14,2669	98
99	62,65919	9375961	19,8403057	16,6145990	14,2681	99
100	63,02889	9498527	19,8479102	16,6175462	14,2693	100

Table.	1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o
100	63,0288788	43,0088716	36,6141053	33,9510733	31,548735
99	62,9201678	42,9003187	36,5060187	33,8465751	31,4400752
98	62,8114562	42,7918152	36,4010730	33,7381152	31,3315152
97	62,7027454	42,6833117	36,2961273	33,6296552	31,2229552
96	62,5940346	42,5748082	36,1911816	33,5211952	31,1143952
95	62,4853238	42,4663047	36,0862359	33,4127352	31,0058352
94	62,3766130	42,3578012	35,9812902	33,3042752	30,8972752
93	62,2679022	42,2492977	35,8763445	33,1958152	30,7887152
92	62,1591914	42,1407942	35,7713988	33,0873552	30,6801552
91	62,0504806	42,0322907	35,6664531	32,9788952	30,5715952
90	61,9417698	41,9237872	35,5575074	32,8704352	30,4630352
89	61,8330590	41,8152837	35,4485617	32,7619752	30,3544752
88	61,7243482	41,7067802	35,3396160	32,6535152	30,2459152
87	61,6156374	41,5982767	35,2306703	32,5450552	30,1373552
86	61,5069266	41,4897732	35,1217246	32,4365952	30,0287952
85	61,3982158	41,3812697	35,0127789	32,3281352	29,9202352
84	61,2895050	41,2727662	34,9038332	32,2196752	29,8116752
83	61,1807942	41,1642627	34,7948875	32,1112152	29,7031152
82	61,0720834	41,0557592	34,6859418	32,0027552	29,5945552
81	60,9633726	40,9472557	34,5769961	31,8942952	29,4859952
80	60,8546618	40,8387522	34,4680504	31,7858352	29,3774352
79	60,7459510	40,7302487	34,3591047	31,6773752	29,2688752
78	60,6372402	40,6217452	34,2501590	31,5689152	29,1603152
77	60,5285294	40,5132417	34,1412133	31,4604552	29,0517552
76	60,4198186	40,4047382	34,0322676	31,3519952	28,9431952
75	60,3111078	40,2962347	33,9233219	31,2435352	28,8346352
74	60,2023970	40,1877312	33,8143762	31,1350752	28,7260752
73	60,0936862	40,0792277	33,7054305	31,0266152	28,6175152
72	59,9849754	39,9707242	33,5964848	30,9181552	28,5089552
71	59,8762646	39,8622207	33,4875391	30,8096952	28,4003952
70	59,7675538	39,7537172	33,3785934	30,7012352	28,2918352
69	59,6588430	39,6452137	33,2696477	30,5927752	28,1832752
68	59,5501322	39,5367102	33,1607020	30,4843152	28,0747152
67	59,4414214	39,4282067	33,0517563	30,3758552	27,9661552
66	59,3327106	39,3197032	32,9428106	30,2673952	27,8575952
65	59,2240000	39,2111997	32,8338649	30,1589352	27,7490352
64	59,1152892	39,1026962	32,7249192	30,0504752	27,6404752
63	59,0065784	38,9941927	32,6159735	29,9420152	27,5319152
62	58,8978676	38,8856892	32,5070278	29,8335552	27,4233552
61	58,7891568	38,7771857	32,3980821	29,7250952	27,3147952
60	58,6804460	38,6686822	32,2891364	29,6166352	27,2062352
59	58,5717352	38,5601787	32,1801907	29,5081752	27,0976752
58	58,4630244	38,4516752	32,0712450	29,4000152	26,9891152
57	58,3543136	38,3431717	31,9622993	29,2915552	26,8805552
56	58,2456028	38,2346682	31,8533536	29,1830952	26,7719952
55	58,1368920	38,1261647	31,7444079	29,0746352	26,6634352
54	58,0281812	38,0176612	31,6354622	28,9661752	26,5548752
53	57,9194704	37,9091577	31,5265165	28,8577152	26,4463152
52	57,8107596	37,8006542	31,4175708	28,7492552	26,3377552
51	57,7020488	37,6921507	31,3086251	28,6407952	26,2291952
50	57,5933380	37,5836472	31,1996794	28,5323352	26,1206352
49	57,4846272	37,4751437	31,0907337	28,4238752	26,0120752
48	57,3759164	37,3666402	30,9817880	28,3154152	25,9035152
47	57,2672056	37,2581367	30,8728423	28,2069552	25,7949552
46	57,1584948	37,1496332	30,7638966	28,0984952	25,6863952
45	57,0497840	37,0411297	30,6549509	27,9900352	25,5778352
44	56,9410732	36,9326262	30,5460052	27,8815752	25,4692752
43	56,8323624	36,8241227	30,4370595	27,7731152	25,3607152
42	56,7236516	36,7156192	30,3281138	27,6646552	25,2521552
41	56,6149408	36,6071157	30,2191681	27,5561952	25,1435952
40	56,5062300	36,4986122	30,1102224	27,4477352	25,0350352
39	56,3975192	36,3901087	30,0012767	27,3392752	24,9264752
38	56,2888084	36,2816052	29,8923310	27,2308152	24,8179152
37	56,1800976	36,1731017	29,7833853	27,1223552	24,7093552
36	56,0713868	36,0645982	29,6744396	27,0138952	24,6007952
35	55,9626760	35,9560947	29,5654939	26,9054352	24,4922352
34	55,8539652	35,8475912	29,4565482	26,7969752	24,3836752
33	55,7452544	35,7390877	29,3476025	26,6885152	24,2751152
32	55,6365436	35,6305842	29,2386568	26,5800552	24,1665552
31	55,5278328	35,5220807	29,1297111	26,4715952	24,0579952
30	55,4191220	35,4135772	29,0207654	26,3631352	23,9494352
29	55,3104112	35,3050737	28,9118197	26,2546752	23,8408752
28	55,2017004	35,1965702	28,8028740	26,1462152	23,7323152
27	55,0929896	35,0880667	28,6939283	26,0377552	23,6237552
26	54,9842788	34,9795632	28,5849826	25,9292952	23,5151952
25	54,8755680	34,8710597	28,4760369	25,8208352	23,4066352
24	54,7668572	34,7625562	28,3670912	25,7123752	23,2980752
23	54,6581464	34,6540527	28,2581455	25,6039152	23,1895152
22	54,5494356	34,5455492	28,1491998	25,4954552	23,0809552
21	54,4407248	34,4370457	28,0402541	25,3869952	22,9723952
20	54,3320140	34,3285422	27,9313084	25,2785352	22,8638352
19	54,2233032	34,2200387	27,8223627	25,1700752	22,7552752
18	54,1145924	34,1115352	27,7134170	25,0616152	22,6467152
17	54,0058816	34,0030317	27,6044713	24,9531552	22,5381552
16	53,8971708	33,8945282	27,4955256	24,8446952	22,4295952
15	53,7884600	33,7860247	27,3865799	24,7362352	22,3210352
14	53,6797492	33,6775212	27,2776342	24,6277752	22,2124752
13	53,5710384	33,5690177	27,1686885	24,5193152	22,1039152
12	53,4623276	33,4605142	27,0597428	24,4108552	21,9953552
11	53,3536168	33,3520107	26,9507971	24,3023952	21,8867952
10	53,2449060	33,2435072	26,8418514	24,1939352	21,7782352
9	53,1361952	33,1350037	26,7329057	24,0854752	21,6696752
8	53,0274844	33,0265002	26,6239600	23,9770152	21,5611152
7	52,9187736	32,9179967	26,5150143	23,8685552	21,4525552
6	52,8100628	32,8094932	26,4060686	23,7600952	21,3439952
5	52,7013520	32,7009897	26,2971229	23,6516352	21,2354352
4	52,5926412	32,5924862	26,1881772	23,5431752	21,1268752
3	52,4839304	32,4839827	26,0792315	23,4347152	21,0183152
2	52,3752196	32,3754792	25,9702858	23,3262552	20,9097552
1	52,2665088	32,2669757	25,8613401	23,2177952	20,8011952

Alter.	Süssmil Bauma
	Lebende.
0	1000
1	750
2	661
3	618
4	593
5	579
6	567
7	556
8	547
9	539
10	532
11	527
12	523
13	519
14	515
15	511
16	507
17	503
18	499
19	495
20	491
21	486
22	481
23	476
24	471
25	466
26	461
27	456
28	451
29	445
30	439
31	433
32	427
33	421
34	415
35	409
36	402
37	395
38	388
39	381
40	374
41	367
42	360
43	353
44	346
45	339
46	332
47	324
48	316

	9	D. 1.
6	474	0,8
3	551	0,8
9	627	0,8
4	701	0,8
7	774	0,8
9	846	0,7
0	917	0,7
0	987	0,6
8	*055	0,7
5	122	0,7
2	189	0,6
8	254	0,7
2	319	0,6
5	382	0,6
9	445	0,6
0	506	0,7
	567	0,6
	627	0,6
	686	0,6
	745	0,6
	802	0,6
	859	0,6
	915	0,6
	971	0,5
	*025	0,6
	079	0,6
	133	0,5
	186	0,5
	238	0,5
	289	0,5
	340	0,5
	390	0,5
	440	0,5
	489	0,5
	538	0,4
	586	0,4
	633	0,5
	680	0,5
	727	0,4
	773	0,4
	818	0,5
	863	0,5
	908	0,4
	952	0,4
	996	0,4
	9	D. 1.

N.	0		3	4	5	6	7	8	9	D. 1.
10	0	00	427	435	443	451	459	466	474	0,8
11	0	41	505	513	520	528	536	543	551	0,8
12	0	79	582	589	597	604	612	619	627	0,8
13	1	13	657	664	672	679	686	694	701	0,8
14	1	40	731	738	745	752	760	767	774	0,8
15	1	70	803	810	818	825	832	839	846	0,7
16	2	04	875	882	889	896	903	910	917	0,7
17	2	30	945	952	959	966	973	980	987	0,6
18	2	58	*014	*021	*028	*035	*041	*048	*055	0,7
19	2	78	082	089	096	102	109	116	122	0,7
20	3	01	149	156	162	169	176	182	189	0,6
21	3	29	215	222	228	235	241	248	254	0,7
22	3	48	280	287	293	299	306	312	319	0,6
23	3	67	344	351	357	363	370	376	382	0,6
24	3	86	407	414	420	426	432	439	445	0,6
25	3	95	470	476	482	488	494	500	506	0,7
26	4	14	531	537	543	549	555	561	567	0,6
27	4	33	591	597	603	609	615	621	627	0,6
28	4	42	651	657	663	669	675	681	686	0,6
29	4	61	710	716	722	727	733	739	745	0,6
30	4	70	768	774	779	785	791	797	802	0,6
31	4	89	825	831	837	842	848	854	859	0,6
32	5	08	882	887	893	899	904	910	915	0,6
33	5	17	938	943	949	954	960	965	971	0,5
34	5	36	993	998	*004	*009	*015	*020	*025	0,6
35	5	45	047	053	058	063	069	074	079	0,6
36	5	54	101	106	112	117	122	128	133	0,5
37	5	63	154	159	165	170	175	180	186	0,5
38	5	72	206	212	217	222	227	232	238	0,5
39	5	81	258	263	269	274	279	284	289	0,5
40	6	00	309	315	320	325	330	335	340	0,5
41	6	19	360	365	370	375	380	385	390	0,5
42	6	28	410	415	420	425	430	435	440	0,5
43	6	37	460	465	469	474	479	484	489	0,5
44	6	46	509	513	518	523	528	533	538	0,4
45	6	55	557	562	566	571	576	581	586	0,4
46	6	64	605	609	614	619	624	628	633	0,5
47	6	73	652	657	661	666	671	675	680	0,5
48	6	82	699	703	708	713	717	722	727	0,4
49	6	91	745	750	754	759	763	768	773	0,4
50	6	00	791	795	800	805	809	814	818	0,5
51	7	09	836	841	845	850	854	859	863	0,5
52	7	18	881	886	890	894	899	903	908	0,4
53	7	27	926	930	934	939	943	948	952	0,4
54	7	36	969	974	978	983	987	991	996	0,4
	0		3	4	5	6	7	8	9	D. 1.

Wiegand, August,

Die höheren bürgerlichen Rechnungsarten

Halle 1850

Math.p. 637 hh

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10083094-8